


Surgery (Ancient)

23. A. 418



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

Joh: Bon



HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN,

AANGETEKEND

IN HET

KONINGLYKE HOSPITAAL

TE STOCKHOLM,

En op bevel van deszelfs Directeuren uit het Dag-
register by een verzameld en uitgegeeven,

DOOR DEN HEERE

O L A U S A C R E L,

*Hoogleeraar der Heelkunde, Eerste Heelmeeſter in het Koning-
lyke Hospitaal te Stockholm, Lid van de Koninglyke Aca-
demie der Weetenſchappen aldaar, als ook van die
der Heelkunde in Parys.*

Uit het Sweedsch vertaalt, met eenige andere Waar-
neemingen van den Schryver, en verſcheide
[Byvoegſelen vermeerderd,

D O O R

E D U A R D S A N D I F O R T,

MEDICINÆ DOCTOR.



In 's GRAVENHAGE,
By P I E T E R V A N C L E E F,
M. D C C. L X X I.

HEELKUNDE

WAARNEMINGEN

AANGEKOMEN

IN HET


KONINGLIJKE HOSPITAAL

TE STOKHOLM

En op bevel van deszelfs Directie en het Dag-
regter by een verband en ingesloten

DOOR DEN HEER

O. L. A. R. E. L.



En op bevel van deszelfs Directie en het Dag-
regter by een verband en ingesloten


DOOR

EDUARD SANDSTRÖM

MEDICINISCH DOCTOR



BY P. L. E. A. N. A. G. E.
M. D. C. C. L. X. X. I.



VOORREDEN.

Eindelyk verfchynt de lang beloofde, en lang verwagte, Vertaaling, deezer uitmuntende Verzameling van Heelkundige Waarneemingen, by een gebragt door eenen Geleerden, die ten regte eene voornaame plaats onder de eerfte Heelkundigen verdiend. De veelvuldige bezigheden, aan myn beroep verknogt, zouden my byna hebben doen besluiten, dezelve te ftaaken, had het verzoek van veelen, en de overweeging der voordeelen, welke myne Landgenooten uit dezelve zouden trekken, vooral daar het werk in geene andere, dan alleen in de Sweedfche taal, voor zoo verre my bewuft is, het licht gezien heeft, my niet aangeftoord, om daar mede voort te gaan.

Van de waarde van het werk iets te willen zeggen, zoude eene gansch overbodige zaak zyn, andere, op wier beoordeeling men volkomen ftaat kan maaken, hebben dit voor my gedaan, en fy, die behaagen in het leezen fcheppen,

hebben den Schryver voor langen tyd op eene gunstige wyze gekend. Alleenlyk moet ik den Leezer onderregten, hoe ik met hetzelfde ben te werk gegaan. Onnoodig oordeelende, des Schryvers eenvoudige manier van voorstellen te veranderen, heb ik syne waarneemingen niet opgehelderd door foortgelyke uit andere daar by te voegen, het geen my, had ik zulks raadzaam geoordeeld, niet moeyelyk zoude geweest zyn, doch de voornaamste der waarneemingen, welke Hy zelve begeerde, dat men nasloeg, heb ik gemeent onder den text te moeten plaatsen, en deeze is ook de rede geweest, dat ik agter het werk gevoegd heb eenige stukken, door den Hoogleeraar onder de Verhandelingen van de Koninglyke Sweedsche Academie der Weetenfchappen geplaatst. Eerst was myn voorneemen ook geweest, om deeze Uitgaave nog te vermeerderen met de Redenvoering, den 15 July 1767 door den Schryver gehouden, over de noodzakelykheid en de voordeelen van het verkorten der Heelkundige handbewerkingen,

gen, doch dewyl ik dezelve breedvoerig medegedeeld heb in myne Natuur- en Genees-kundige Bibliotheek V.D. 1. St. pag. 131., en dit werk in veeler handen is, heb ik gemeent, den Leezer gevoegelyk daar na toe te kunnen wyzen.

De Voorreden heb ik ook geheel agterwegen gelaaten, dewyl daar in alleenlyk word gesproken van de oprigting van het Hospitaal in Stockholm, en de moeyelykheden, daar in voorgekomen, eene zaak voor Sweeden zelve toen ter tyd nuttig, doch voor ons niet van een zoo groot belang, meenende te kunnen voldoen met den Leezer alleenlyk het volgende mede te deelen.

Het Hospitaal wierd opgeregt in 1752, en, daar in den beginne slegts agt zieken te gelyk daar in konden genomen worden, is het getal der bedden naderhand tot agt- en dertig vermeerderd, waar van de helft voor mans- en de andere helft voor vrouws- perfoonen geschikt is, een gedeelte voor inwendige ziekten, en een ander voor uitwendige gebreeken, terwyl 'er twee bedsteden voor arme kraamvrouwen over-

blyven. Het oogmerk van dit Hospitaal is, den Leerlingen bekwaame gelegenheid te verschaffen, om allerhande ziekten te leeren kennen, en te behandelen, en daarom moeten alle, die zich op de Heelkunde toeleggen, ook zes maanden zelve in het Hospitaal dienst doen, onder het opzicht der Hoogleeraaren, over hetzelfde gesteld, voor dat sy tot het *examen* kunnen worden toegelaaten.

Zal nu het Leeraar-ampt, welk ik eerstdaags op Leidens Hooge School staa te bekleeden, my in het vervolg beletten, door voortgelyke werken, als dit is, uit te geeven, mynen Landgenooten dienst te doen, ik hoop egter met denzelfden yver voort te vaaren met myne Natuur- en Genees-kundige Bibliotheek, die my reeds veele jaaren eene aangenaame en nuttige uitspanning van myne meêr gewigtige bezigheden verschaft heeft.

E. SANDIFORT.

's Gravenhage
den 14 November
1770.

I N-

I N H O U D.

HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN AANGETEET-
KEND IN HET KONINGLYKE HOSPITAAL
IN STOCKHOLM.

EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN HET HOOFD EN DEN HALS.

I. *Fractura cranii insignis, cum deperdi-
tione substantiæ cerebri.*
Eene breuk van het bekkeneel met verlies van
een gedeelte der hersenen. 5

II. *Fractura & depressio cranii.*
Eene breuk en neêrdrukking van het bekkeneel. 6

III. *Fractura & depressio cranii.*
Eene breuk en neêrdrukking van het bekkeneel. 9

IV. *Eccope & Diacope Cranii.*
Een diepe houw met eene byl in het bekkeneel. 14

V. *Suturarum cranii solutio violenta.*
Eene geweldige vaneenscheiding der naaden
van het bekkeneel. 17

VI. *Fractura Cranii comminuta.*
Eene opening in het bekkeneel en dikke hers-
sen vlies tot in de mergagtige zelfstan-
dig. * 4

digheid der heffenen door een' boots-haak
veroorzaakt.

22

VII. *Labium leporinum insulatum.*

Een dubbele haazen-mond.

24

VIII. *Cancer labii inferioris.*

Eene kankeragtige zweer in de ondersta lip. 31

IX. *Trichiasis & Distichiasis.*

Eene omkeering der hairen van het oog
in een of meer reyen.

39

X. *Ectropium & Lagophthalmos.*

Eene omkeering en verkorting der oog-
leden.

46

XI. *Ancyloblepharum cum Trichiasi.*

Eene samengroeiing der oogleden met eene
omkeering der hairen naar de oogen.

56

XII. *Tumor scirrhuso-adiposus in or-
bita.*

Een verhard, vet, gezwel in de ooghol-
te, welk het oog uit syne plaats dreef.

59

XIII. *Cancer oculi sinistri.*

Het linker oog in een kankeragtig ge-
zwel veranderd.

63

XIV.

- XIV. *Pterygium, Pannus oculi.*
Eene vleeschagtige huid over het oog. 66
- XV. *Spina ventosa orbitæ dextræ.*
Een wind-doorn rondom de regter oog-
holte. 71
- XVI. *Cataracta.*
De Staar. 73
- XVII. *Hypopyon.*
Een Etter-oog. 98
- XVIII. *Hæmatops.*
Een bloed-oog.
- XIX. *Polypus Narium.*
Een Vleesch-gewas in den neus. 106
- XX. *Uvula relaxata.*
Eene verlenging van het lilletje in de
Keel. 113
- XXI. *Caries maxillæ inferioris.*
Eene Beenbederving in de onderste Kaak. 116
- XXII. *Caries maxillæ superioris.*
Eene Beenbederving in de bovenste
Kaak. 120
- XXXIII. * 5

- XXIII. *Calculus in ductu Salivari War-*
thoniano.
 Een steen in een der kwyl - buisen on-
 der de tong. 123
- XXIV. *Glandula Parotis scirrhusa.*
 Eene knoestagtige zwelling van de
 oorklier. 126
- XXV. *Fistula Meatus Auditorii cum*
carie.
 Eene pypzweer in den gehoor-weg met
 eene beenbederving. 129
- XXVI. *Vermes in meatu Auditorio.*
 Wormen in den Gehoorweg. 133
- XXVII. *Fistula meatus auditorii.*
 Eene pyp - zweer aan den hals met
 eene opening in den gehoorweg. 137
- XXVIII. *Fistula colli complicata.*
 Eene samengestelde pyp - zweer aan
 den hals. 140
- XIX. *Vulnera colli & asperæ ar-*
teriæ.
 Wonden van den hals en lugt - pyp. 151

XXX. *Tumores inclusiui seu melicerides colli.*

Zakgezwollen aan den bals.

155

TWEEDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE AAN DE BORST
EN DESZELFS ZYDELYKE DEELLEN VOOR-
KOMEN.

I. *Scirrbi & indurationes mamma-
rum.*

Knoest-gezwollen en Verhardingen der
borsten.

162

II. *Empyemata & Abscessus in tho-
race.*

Verzamelingen van etter in de holigheid
van de borst.

173

III. *Scirrbus sub axilla sinistra.*

Een knoest-gezwel onder de linker oxel.

185

IV. *Collectiones seroso-purulentæ abs-
que prægressa inflammatione.*

Verzamelingen van etter zonder vooraf-
gaande ontsteeking.

190

V. *Atheroma in meliceridem conver-
sum.*

Een groot versmolten Zakgezwel.

106

DER-

DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN DEN BUIK, RUGGE, EN DE TEEL-
DEELEN.

- I. *Paracenthesis Abdominis in Ascite.*
*De buiks - doorbooring in eene Buik-wa-
terzugt.* 205
- II. *Abscessus in convexa parte hepatis.*
*Eene verzweering in het bolle gedeelte
van de lever.* 208
- III. *Herniæ Inguinales & Scrotales.*
Liesch- en Balzaks - breuken. 211
- IV. *Fistulæ Perinæi urinose.*
*Pypzweeren in den bilnaad , waar door
de pis ontlast word.* 241
- V. *Fistula inguinalis complicata.*
Eene samengestelde pypzweer in de liesch. 259
- VI. *Sarcocele.*
Eene Vleesch - breuk. 263
- VII. *Hydrocele.*
Eene Waterbreuk. 280

- VIII. *Fistula scroti.*
Eene pypzweer in den balzak. 289
- IX. *Calculus vesicæ urinariæ.*
Een steen in de blaas. 294
- X. *Calculi Urethræ.*
Steenen in de Pisbuis. 306
- XI. *Retentio urinæ ex fungo caseoso.*
Eene opstopping van water, veroorzaakt
door een fungus gezwel in de blaas. 808
- XII. *Ascarides urina ejectæ.*
Kleine wormen met de pis geloosd. 314
- XIII. *Vesica retentione lotii distenta &*
casu disrupta, eventu lethali.
Eene toevallige openbersting van de blaas
by eene pis-opstopping met een doode-
lyk gevolg. 316

VIERDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
 AAN DE BOVENSTE LEDEN.

- I. *Spina ventosa cum Pædarthrocace.*
Een Wind-doorn. 320

- II. *Caries humeri exfoliatione curata.*
 Eene beenbederving aan het opperarm-been door eene afschilfering geneezen. 332
- III. *Fractura humeri insanabilis vel Pseudarticulata.*
 Eene valsche geleding na eene ongeneeslyke beenbreuk. 344
- IV. *Fractura humeri syphilitica.*
 Eene breuk van het opperarm-been uit eene venerische oorzaak. 347
- V. *Fractura ulnæ & radii comminuta.*
 Eene beenbreuk van den onderarm met verbryfeling. 350
- VI. *Fractura ossium metacarpi & carpi*
 Eene breuk der beenderen van de hand. 352
- VII. *Fractura phalangium & ossium metacarpi digiti annularis & medii.*
 Eene breuk van den middensten en ringvinger met de beenderen van den metacarpus. 354
- VIII.

- VIII. *Aneurysma spurium.*
Eene valsche Slagaderbreuk. 356
- IX. *Atheroma ad Carpum.*
Een zakgezwel aan de voorhand. 361
- X. *Abscessus occultus supra muscu-
lum pronatorem quadratum pro-
pe carpum.*
Eene verborge verzweering boven den
musc. pronat. quadr. digt by den car-
pus. 368
- XI. *Ganglion tendineum.*
Een Pees-Knoop. 373
- XII. *Paronychia arida non inflam-
mata.*
Eene bysondere soort van Vyt zonder ont-
steeking. 383
- XIII. *Erysipelas phlegmonodes suppu-
rans.*
Eene roosagtige ontsteeking en verette-
ring. 398
- XIV. *Oedema erisipelatodes chroni-
cum, manuum & digitorum.*
Eene langduurige roosagtige zwelling
aan banden en vingers. 402

XV. *Oedema manuum scirrhomodes cum impetigine (Plinii) cutis.*

Eene verharde zwelling aan de handen
met eenen uitslag op de huid.

407

VYFDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN DE ONDERSTE LEDEN.

I. *Oedema pedum, crurumque scirrhomodes & lividum.*

Eene koude, harde, en paersche zwelling
der handen en voeten.

411

II. *Fistulae lumbares, coxales, cotyloideæ, & femorales.*

Pypzweeren in de lendenen, de heupen,
in de holigheid van de geleeding, en
het dey-been.

414

III. *Caries ossis femoris.*

Eene bederving van het dey-been.

424

IV. *Caries articuli ossis femoris & tibiae.*

Eene beenbederving in het gewrigt van de
knie.

431

V.

- V. *Caries tibiæ scorbutica.*
Eene bederving van het scheen-been door
de scheurbuik ontstaan. 438
- VI. *Caries tibiæ & fibulæ.*
Eene bederving in het scheen- en kuit-
been. 441
- VII. *Caries ossium tarfi, metatarsi &
phalangum digitorum pedis.*
Eene bederving der beenderen, welke tot
de hand, de voorhand, en de vingers
behooren. 460
- VIII. *Fracturæ ossium femoris, tibiæ,
& fibulæ.*
Breuken van het dey- scheen- en kuit-
been. 467
- IX. *Fungus & Anchylosis genu.*
Eene spongieuse zwelling en samengroei-
jing van de knie. 480
- X. *Ruptura tendinis Achillis sini-
stri.*
Eene breuk van de linker pees van Achil-
les. 492
- XI. *Exfoliatio tendinis Achillis.*
Eene afschilfering van de Pees van Achil-
les. 499

ZESDE HOOFDSTUK.

VAN EENIGE BYZONDERE VET- GEZWELLEN.

I. *Tumor adiposus enormis ad nates lateris sinistri.*

Een groot vet-gezwel agter op de linker
bil.

505

II. *Tumor adiposus insignis ad clunes, lateris dextri & interfoemineum.*

Een groot vet-gezwel op de regter bil en
tusschen de deyen.

508

III. *Tumor adiposus insignis & conge- nitus in mala dextra.*

Een groot aangebooren vet-gezwel op de
regter kaak.

513

De meeste Artykelen, in deezen Inhoud gemeld, hebben verscheide onderdeelen, doch, dewyl agter deeze Vertaaling een Register gevoegd is, welk in de Sweedsche uitgaave ontbreekt, heeft men onnoodig geoordeeld, dezelve alle in den inhoud te plaatsen.




HEEL- EN ONTLEED-KUNDIGE WAARNEEMINGEN, OVERGENOMEN UIT DE VERHANDELINGEN VAN DE KONINGLYKE SWEEDSCHE ACADEMIE DER WEETENSCHAPPEN.

- I. *Aanmerking over Critifche verzweringen, na eene zwaare algemeen heerschende koorts, welke den dood veroorzaakt hebben, als men dezelve geopend heeft, doch door buikzuiverende middelen moesten verdreeven worden.* 519
- II. *Aanmerking over een eerstgebooren kind, welk, onaangezien eenen zwaaren stoot op het hoofd, dien het, nog in 's moeders lyf zynde, kreeg, op den behoorlyken tyd ter waereld kwam, en drie weeken na de geboorte leefde.* 525
- III. *Proeven en Aanmerkingen over den gespleeten ruggegraat.* 529
- IV. *Proeven omtrent het nut van een seton tegen eene blindheid, die op eene anderendaagsche koorts volgde.* 542
- V. *Beschryving van eenen Boer, die met een been ter waereld is gekomen.* 551
- VI. *Waarneeming van eene aanmerkelyke verzwering zonder voorafgaande ontsteeking.* 553

- VII. *Waarneeming van eenige ongeneeslyke
beenbedervingen.* 556
- VIII. *Beschryving van eene dubbele baarmoeder.* 559
- IX. *Waarneeming omtrent den steen.* 565







HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN HET HOOFD EN DEN HALS.



*Fractura cranii insignis, cum deperditione
substantiæ Cerebri.*

*Eene breuk van het bekkeneel met verlies van een
gedeelte der hersenen.*

§ EN jongen, veertien jaaren oud,
(E) klein van postuur, maar van eene
§ goede gezondheid, was beezig op
een' zolder met een pak op te heis-
fen van de straat, waar toe gebruikt wierd een
gewoon wind-as met vier armen.



Wanneer hy, zoo veel fyne kragten toelieten, het pak een weinig van den grond poogde op te ligten, wierd hy moede, de zwaarte kreeg de overwigt, en maakte, door den fchielyken val, dat de eene arm van het wind-as den jongen omdraaide, terwyl de andere daarop hem floeg op het hoofd, boven het linker oor, waar door hy voor dood op den zolder viel. Een ander bediende, die tegenwoordig was, nam hem op, maar, verschrïkt zynde op het zien van de gevaarlyke wonde, en de uitpui-ling der herffenen, liet hy hem op de plaats.

In drie dagen wierd niets tot fyne hulp aangewend, dan eene aderlating op den arm.

Hy kwam in het Hospitaal in February 1754., zynde buiten kennis, en vermogen om te spreken, fomtyds sterk zugtende en steunende. Syne oogen waren gesflooten door het bloed, welk in de oogleden uitgestort was; de pols was langzaam en gespannen, de linker zyde van het hoofd bedekt met eene harde korst van het hair, gedroogd bloed, herffenen, en been-schilfers; het lighaam onbeweegelyk; de natuurlyke ontlastingen geschieden buiten syn weten.

Nadat de genoemde korst was los gemaakt en wechgenomen, vertoonde zich eene gekneusde wonde in de bekleetselen van het hoofd, waar door men zonder moeite met den vinger kon komen tot by de herffenen; de bekleetselen

len wierden wechgenomen, en, wanneer het bekkeneel, vier duimen in een ongelyk vierkant, ontbloot was, vondt men, vooreerst, dat de laagste hoek van het opperhoofds-been, boven het linker oor, ter grootte van een Ryksdaaler, losgeslaagen was, maar aan het dikke hersenvlies vasthong; ten tweeden, dat in de *futura lambdoidea* drie *ossa triquetra* waren, die zeer los zaten, zoo dat sy aanstonds konden wechgenomen worden; ten derden, dat het bovenste gedeelte van het *pars squamosa ossis temporalis*, ter breedte van eenen duim, was omgekeerd, en als eene spaa door het dikke hersenvlies in de hersenen gedrongen was; ten vierden, dat de hersenen over dit gedeelte van het been geduurig uitpuilden.

De gelyke legging der gebrooke beenderen had in dit geval geen trepaan vereischt, dewyl zoo wel het groote stuk, als de *ossa triquetra*, gemakkelyk konden opgeligt, en het omgebogen gedeelte van het slaap-been naar boven gekeerd worden; maar de hoop, dat deeze losse beenderen wederom zouden vastgroeijen, maakte, dat ik liever hetzelfde spaarde, en een trepaan stelde op het onbeschadigde gedeelte van het opperhoofdsbeen, digt by het ingedrukte been; dit wierd dus opgeligt, en daar by ging een groot gedeelte van de opgezwole en ontbloote hersenen verlooren: twee van de *ossa triquetra*, die 't meest los waren,

wierden wechgenomen , en toen ontlaste zich nog eenig uitgestort en verrot bloed.

Eenige beenschilfers kwamen ook uit het verrotte gedeelte der hersenen, welke door den slag in dezelve gedreeven waren. Het bekkeneel werd verbonden met droog plukfel, en de randen der wonden met gelyke deelen *ung. basil. citr. & bals. arcai*, waar onder eenige droppelen van het *ol. cera* gemengt wierden; zakjes met verdelende kruiden, gekookt in azyn en dun bier, wierden, na behooren uitgedrukt, over het geheele hoofd gelegd. Twee dagen na het stellen van de trepaan, werd de pols weeker, en eenigzins rasser; het lighaam warm, welk tot hier toe onnatuurlyk koud geweest was. Drie weken gingen voorby op deeze wyze, zonder dat de zieke kon spreken, of zich zelve in het allerminste helpen. Het bekkeneel werd verbonden met plukfel, bevogtigd met den *bals. Fioraventi*, en de kanten met het genoemde ettermakend middel.

De gebrooke en afgescheide deelen in de *futura lambdoidea*, als ook in de *squammosa*, en de spleet rondom het groote stuk van het been, in het opperhoofds-been, welk niet wechgenomen was, veretterden alle wel, en vertoonden overal versich uitspruitende vleeschdeeltjes. In de vierde week begon hy te geeven eenige tekenen van kennis en ook langzamerhand te spree-

fpreeken. In de vyfde week fchilferde de kring af van de opening, door de trepaan gemaakt.

In de zevende week waren de randen van het been in de naaden, te gelyk met het opgeligte ftuk van de *portio squamofa offis temporum*, losgegaan; in de tiende had het groote ftuk van het been zich vaftgemaakt in de rondte, door het aangegroeide weer en de veranderde vleefchdeeltjes in been.

Hy begon in de twaalfde week te gaan, te leezen, te fchryven, en te cyferen; in de zestiende was het geheele ongemak geneezen, en met eene gelyke roof bedekt, waar toe het ftuk van het been, welk op de plaats gelaten was, niet weinig hielp, en hy ging volkomen gezond uit het Hospitaal.



II.

*Fractura & depressio Cranii.**Eene breuk en neêrdrukking van het bekkeneel.*

Een Timmerman, werkende aan het Koninglyke Paleys Drottningholm, zoude op de gewoone wyze met een katrol en touw opheiffen balken tot een dak, by een nieuw gebouw.

Terwyl hy hier mede bezig was, sprong de metaale schyf uit de katrol, en viel hem loodregt op het hoofd. Hy was wel een groot, gezond, vlug en sterk, man, doch viel door den slag aanstonds op den grond; hy verloor noch syn verstand noch syne kennis, maar het vermogen om op de beenen te staan of te gaan; aanstonds wierd eene aderlating op den arm verrigt, en eene verdeelende stooving gelegd over het ongemak op het hoofd.

Op hoog bevel kwam hy in het Hospitaal in Augustus 1754. des avonds ten tien uuren. Zoo- dra ik daar van kennis gekreegen had, begaf ik my aanstonds naar hetzelfde.

De zieke wierd gevonden in de beschreeve omstandigheid, by syn volkomen verstand, en hy verhaalde al 't geen by het toeval was gebeurt; maar hy kon niet staan op de beenen.

Mid-

Midden op de kruin van het hoofd was eene middelmaatige en eenigzins harde kneufing, en in dezelve eene opening, welke de sonde vry diep tot in het bekkeneel doorliet.

De grond was egter hard, en strekte tot een teken, dat dezelve niet doordrong tot in de hersenen. Het bekkeneel wierd, zoo ver als noodig was, bloot gemaakt, en toen ontdekte men eene neêrdrukking in hetzelfde, digt by en aan de linker zyde van de *futura sagittalis*, zoo breed, als het eerste lid van den duim, en in gedaante overeenkomende met een omgekeerde kegel.

Beide de tafels van het been en de *diploë* waren te samen naar binnen gedrukt. Van dit putje ging eene spleet ter lengtte van eenen halven duim zydewaarts naar het linker opperhoofds-been. De pols was vol, langzaam, en gespannen, en daarom wierd eene tweede aderlating verrigt. Tegen den nacht wierden voorgeschreeven poeders uit salpeter en kampher met eene verkoelende amandelmelk. Zakjes met verdeelende kruiden, in azyn en dun bier gekookt, wierden tot eene stooving gebruikt. Twee clysteeren wierden binnen twaalf uren gezet. Hy was nu bereid om den volgenden dag getrepaneerd te worden.

De gesteldheid van het geval deed my in twyfel staan, of het trepaneren noodig was, dan
A 4
niet.

niet. Syn verftand en kennis toonden , dat noch de vliezen noch de herffenen door het bekkeneel of het uitgestorte bloed gedrukt wierden.

Het onvermogen , om de beenen te gebruiken , kon veroorzaakt worden door de fchudding der herffenen en aanhoudende verlamming. Het gezicht van de neêrdrukking deed twyflen , of de *lamina vitrea* waarlyk was ingebogen (zynde het bekkeneel op die plaats omtrent een' overdwarfchen vinger dik) , wanneer in andere gevallen de trepaan onnoodig zoude zyn.

Derhalven wierd beflooten , om met een breed *perforatif-trepaan* te booren rondom het putje ; dit gefchiedde met verfcheide gaten door de *diploe* , en zoo lang , als eene afmeeting van den grond van het putje toeliet ; elk gat gaf veel bloed , en bragt dit nut aan , dat de lyder aanftonds na de operatie beter in het hoofd wierd , en de beenen begon op te ligten. Het verband was hetzelfde , als in het eerfte geval.

De volgende dagen kon hy ftaan op de beenen ; op den agtften dag ging hy uit de kamer , en verlangde naar werk. Den dertienden dag fchilferde het geheele putje met de gaatjes af , gelyk een omgekeerde vergietteft.

Den veertienden dag begon hy in dagloon te werken , om het Hofpitaal te repareeren. Binnen eene maand was het ongemak volkomen geneezen , en de lyder gefchrapt uit de lyft van het Hofpitaal.



III.

Fractura & depressio Cranii.

Eene breuk en neêrdrukking van het bekkeneel.

En tapper , drie- en dertig jaaren oud , gezond en sterk , werd met eenen steen geslaagen boven het linker oog tegen den slaap van het hoofd , waar op hy aanstonds tegen den grond viel , syne zinnen en spraak verloor , als ook de kragten van te gaan en te staan op syne beenen ; hy werd daar op aanstonds adergelaten op den arm en de wonde met droog pluksel en pleisters bedekt. Vier dagen gingen voorby zonder andere hulp.

In het begin van Mey 1758, vyf dagen na de ontvange wonden , werd hy in het Hospitaal genomen.

Twée vinger - breed boven de linker wenkbrauw vertoonde zich eene gekneusde wonde , waar door de breuk van het bekkeneel zonder moeite gevoeld werd. Hy kon toen noch spreken noch op syne voeten staan , en kermde zeer sterk , vooral by het onderzoeken der wonde.

Het bekkeneel wierd ontbloot, en op de genoemde plaats in stukken gebrooken gevonden, zoo dat de *apophysis angularis sinistra* & *externa offis frontis*, op de plaats, alwaar dit been zich buigt, om vereenigt te worden met het *os zygomaticum* en de *apophysis temporalis offis sphenoidei*, onder de voorste vereeniging van de slaapspier, stukswyze neêrgedrukt was ter grootte van een' gulden; waar van eenige kleine spleeten gingen door den grooten vleugel van het genoemde *os sphenoides*.

In het byzonder was nu dat deel van het uiteinde van het voorhoofds-been, welk zich vereenigt met het *os sphenoides*, dieper neêrgedrukt, en uit de naaden gedwongen, drukkende het dikke herssen-vlies en de herssenen zelve, te gelyk met de aanmerkelyke quantiteit bloed, welke onder de geheele wonde uitgestort was. Den volgenden dag wierd de zieke getrepaneerd even boven de wonde; een trepaan was niet genoeg, om daar by te komen, en aan het *levatorium* genoeg steunfel te geeven, ten einde het neêrgedrukte been kon opgeligt worden; daarna wierd nog een trepaan gesteld, een' halven overdwarschen duim van de andere, nederwaarts naar de linder-zyde, welke de helft van de wonde innam; het stuk tusschen beide de openingen wierd uitgeboord, en alle kanten vervolgens wechgenomen.

Nu konden de neêrgedrukte deelen ook gemak-

makkelijk opgeligt worden. Onder het booren van het bekkeneel, drong veel dun bloed door deszelfs *pori* en *diploë*, tot een teken, dat hetzelve onder de breuk was uitgestort.

Uit de openingen, door de trepaan gemaakt, kwam eenig geronnen bloed, voornamentlyk by de uitademing (*). Het dikke herssen-vlies was onbeschadigt, maar van het bekkeneel afgescheiden, zoo dat daar tusschen wel een vinger kon gelegd worden. De wonde wierd op de gewoone wyze verbonden; het dikke herssen-vlies met een mengsel uit de *Essent. mastichis. unc. ß. Spir. vin. gall. unc. jß.* en *mell. rosar. unc. j*, het bekkeneel droog, en de bekleetselen met het bovengenoemde ettermaakend middel uit *basil. citr. bals. arcæi, ℥ ol. ceræ.* Zakjes met verdeelende kruiden, en een warme wollen muts, wierden op het hoofd gedraagen.

De Trepaan wierd op den middag gezet; tegen den nacht van denzelfden dag, begon hy fyne zinnen weder te krygen, en te spreken, zoo dat hy den volgenden morgen met weinige, doch duidelyke, woorden zich te gelyk kon beklagen en troosten in deezen veranderden toestand

(*) De oorzaken, waar door de herssen en het dikke herssen-vlies onder de uitademing opzwellen en onder de inademing neêrzakken, zyn duidelyk verklaard, in *Hallers Diff. sur l'irritabilité. pag. 27. &c.*



stand na de operatie: zes weeken gingen voorby onder dagelyksche beterschap.

Het uitgestorte en geronnen bloed onder het bekkeneel was ontbonden, en wierd geduurig rykelyk ontlast; de randen van de openingen, in het been gemaakt, en de overige kanten schilferden af, en de wonde wierd gevuld met vleesch van het dikke hersenvlies, en van alle zyden.

Doch de eerste uitstorting van bloed en deszelfs verzameling had, gelyk boven gezegd is, het dikke hersen-vlies tegen de hersenen aangedrukt, waar door het dunne bloed aanstonds en vervolgens, wanneer hetzelve ontbonden wierd, onverhinderd op den grond van het bekkeneel boven de holligheden der ooggen kon neêrzakken: van daar kon de etter niet genoegzaam ontlast worden, noch door den hoeft, het niezen, het optrekken met eene spuit, of spons, noch door soortgelyke middelen. De lyder was voor het overige zeer gezond, ging en wandelde op de plaats byna geheele dagen.

De etter begon eenen kwaaden reuk te krygen, wierd dun en vermeerderde zich dagelyks. De borst-fonde, waar mede dit ongemak onderzocht wierd, toonde met vergelyking der uitwendige deelen, zonder dat men het met het oog duidelyk zien kon, dat de etter lag boven de holligheden van het

het linker oog, zoo dat men met gemak kon komen rondom de halfronde van de voorste lobbe der hersenen. Negen weken verliepen onder allerhande proeven, om deeze verzameling van etter op te droogen, doch vrugtelooz.

De uitkomst kon eindelyk niet anders, dan doodelyk, zyn, door de toeneemende verrotting.

De kloekmoedige lyder gaf syne toestemming tot het stellen van de derde trepaan, welke gezet wierd een of twee lynen van den bovensten rand van de oog-holte, en maakte eene opening in het bekkeneel met de twee voorgaande, welke ten naaften by geneezen waren. Deeze opening nu was gemaakt horizontaal met de verzameling van etter, en liet vervolgens toe, dat dezelve zonder konst kon wechloopen. Daar op volgde dagelyks eene goede opgroeiing van vleesch, eerst op den grond van het ongemak, en vervolgens ook gelyk met de wonde, welke in de dertiende week meestendeels geneezen was, wanneer hy in eene goede gezondheid het Hospitaal verliet.





I V.

Eccope & Diacope Cranii.

Een diepe houw met eene byl in het bekkeneel.

Een burger, ruim veertig jaaren oud, van eene gezonde lighaams-gesteldheid, doch onrustig van gemoed, wilde in eene dwaaze haastigheid zich zelve om het leeven brengen.

Dat dit kwaade besluit niet lange bedagt was, kan begreepen worden uit het werktuig, welk hy daar toe gebruikte. Eene byl was 't digst by de hand, hy vatte den steel, keerde het scherpe gedeelte naar het aangezicht, en gaf zich daar mede drie houwen, den eersten midden over het voorhoofds-been, lang $\frac{2}{3}$ van een' vinger door de bovenste tafel, de *diploë*, en in de onderste tafel van het bekkeneel; den tweeden over het linker jukbeen, en deeze drong niet verder door, dan tot op het beenvlies; den derden, met een' schuinschen slag, in den bovensten rand van de regter oogholte, zeer digt by de *incisura superciliaris*, waar mede een stuk van het been twee overdwarsche vingers breed, en ter dikte van het geheele bekkeneel, los geslagen, en gedreeven was twee duim, breed onder het bek-

bekkenneel by de naaden, welke het *os zygomaticum*, *sphenoidium*, en *bregmatis* met het *os frontis* aan de regter zyde vereenigen.

Den daar aan volgenden dag wierd hy in het Hospitaal genomen; hy was deels kwaad, deels benauwt, en ylhoofdig, gelyk men meende van den brandewyn; al 't welk door aderlatingen, clysteeren, eene strenge levenswyze, en eene ernstige vermaaning, in het kort verdween.

Wanneer het beschreeven stuk van het been, door de derde wonde los gemaakt, tegen de regter slaap opgeligt wierd, bleek het dikke herffen-vlies op de voorste lobbe van de herffenen en den oog - bol insgelyks bloot te zyn. Het was noodig, het meeste van dit stuk te behouden, en daarom wierd alleenlyk van den omtrek der wonde een gedeelte van de bekleetfelen, een' halven overdwarschen vinger lang, wechgenomen. Vervolgens wierd het geheele stuk doorboord, zoo diep, als geschieden kon; op dezelfde wyze wierd behandeld de eerste houw midden over het voorhoofds-been; het verband was vervolgens even eens, als by de eerste hoofdwonde.

De affschilfering geschiedde in de zesde week, te gelyk met de doorbooring van het stuk van het been in den derden houw; het overige maakte zich vast, wierd gevuld en geneezen: alle beweegingen en werkingen van het oog bleef-

bleeven onbeschadigt , schoon het eerste aanzien daar toe weinig hoope gaf.

Het bovenste oog-lid behield fyne kragt, schoon een groot gedeelte van de *musculus orbicularis* wechgenomen was, tot een bewys, dat deszelfs *musculus levator proprius* niets geleden had. Op het einde van de zevende week ging hy, geneezen en gezond , uit het Hospitaal.



V.

Suturarum cranii solutio violenta.

Eene geweldige vaneenscheiding der naaden van het bekkeneel.

In Augustus 1743. zoude een Fransch soldaat van het Regiment *Nivernois*, nadat hy in het Veld-Hospitaal in Landau hersteld was, met eenige van syne makkers, zich vervoegen by het Regiment in den Opper-Elzas.

Hy had onlangs eenig geld gekreegen, welk gezonden was van syne geboorte-plaats, en vrienden; syne makkers beslooten, om hem hetzelfde af te neemen, en hem dan dood te slaan. Met de kolf van de snaphaan kneusden sy syn hoofd, naamen den buid, en lieten hem een weinig van den grooten weg in een bosch leggen.

Hy bleef op de plaats leggen agt dagen, zonder kennis, hulpmiddelen of voedsel; eindelijk ontwaakte hy, ging eene meil ver te rug, naar Landau, en wierd op nieuw in het Hospitaal genomen. Door den slag had hy verlooren

B

sy-



fyne spraak , en een groot deel van fyn verstand.

Noch bloed , noch blauwe plekken , noch iet anders wierd op fyn lighaam gezien. De pols was klein , langzaam en gespannen geweest. De Geneesheer , die niet wist , wat hem ware overkomen , geloofde , dat hy op nieuw op den weg ziek geworden was van de eerste koorts (*febris nervosa*) , en eene verplaatfing der ziekte naar het hoofd gekregen had ; waar tegen ook de gewoone middelen gebruikt wierden. Veertien dagen waren vrugteloos voorby gegaan , en de toestand was dezelfde gebleeven , wanneer hy een middel vondt , om te gaan uit het hospitaal en de Fortres zelve , met fyn ranfel en wapenen.

Hy ging daar mede naar *Lauterbourg* , kwam aan afgemad , en leide zich , als een doode , by de Stads-poort neder. Aanftonds wierd hy in het Hospitaal gebragt , en aangezien voor iemand , die vermoeid , en door eene heete ziekte uitgemergeld was. Na agt dagen wierd my gezegd , dat het hoofd van deezen man zeer week was , en even als fchommelde.

Zonder de minfte kennis van het geen hem was overkomen , wierd aanftonds eene opening gemaakt langs den pylnaad , wanneer eene halve ftoop geele etter daar uit ftoomde ; met den vinger voelde ik , niet zonder verwondering , dat

de

de geheele pylnaad van het voorhoofds- tot het agterhoofds-been open en van een gescheiden was, zoo dat het einde van den vinger daar in kon gestookt worden. De etter kwam zoo van buiten als van binnen van het bekkeneel; het dikke herffen-vlies, het bekkeneel, en de wonde wierden op de gewoone wyze verbonden.

De zieke, welke in eene maand niet sprak, begon naderhand de spraak weder te krygen, en verhaalde het bovengemelde. Het verstand en de kragten namen toe; de etter was meestendeels ontlast, maar de naad was na vyf dagen niet meer tot een gekomen, dan in den beginne. Den zesden dag na de eerste opening, ontdekte men wederom eene schommeling van vogt op het agterhoofds-been; de opening werd overdwars gemaakt, maar had geene gemeenschap met de eerste; 'er liep wederom veel etter uit, het bekkeneel was bloot, de *futura lambdoidea* gaapte, en was met deszelfs *ossâ triquetra sive wormiana* los, van welke een aan beide zyden aanstonds zonder moeite opgeligt en wechgenomen werd, om eenen vryen uitgang te verschaffen aan de etter, welke hier scheen te leggen op het *tentorium cerebelli*.

De lyder behield wel syne zinnen, maar begon wederom kragteloos te worden voor eenige dagen. Na agt dagen vertoonde zich wederom tot myne groote becommernis, eene



nieuwe schommeling, dwars op de *futura coronalis* digt aan het regter oor. Hier wierd alleenlyk eene opening gemaakt van drie overdwarsche vingers naast aan het slaap-been, wanneer veel etter te voorschyn kwam; het bekeneel was bloot, en de kroon-naad open, gelyk de voorgaande.

In deeze wanhoopige omstandigheid wierd het gewoone verband aangelegd, omtrent volgens de manier, in het eerste geval opgegeeven. Na agt weeken van de eerste insnyding, en negen van den, hem toegedagten, moord, was de etter merkelyk verminderd, de kragten vermeerderden, de tanden der naaden waren los gegaan, nieuw vleesch kwam van het dikke hersensvlies op, met een woord, alles beloofde eene gelukkige uitkomst.

Hy wandelde door de zaal, en vertelde aan andere zieken syn voorval.

In de elfde week kreeg hy door den omme-gang met veele zieken eenen zwaaren loop. Syne nieuwe kragten verdweenen wederom schielyk, en, wanneer hy in den nagt het gemak zoude zoeken by de deur, struikelde hy, stoote het hoofd tegen een ander bed, en viel half dood op den grond. De oppasser haaste zich, om hem te helpen, en leide hem in syn bed, alwaar hy na weinige minuten stierf. Indien hy met dezelfde nauwkeurigheid tot op het einde

de was opgepast, als in den beginne na de operatie, zoude dit niet voorgevallen zyn, en syn leven zoude na alle waarschyndelykheid zyn behouden.

Het hoofd wierd geopend. Het bekkeneel was vry van etter; het dikke hersenvlies nog eenigzins ongelyk, en hier en daar even als ontveld. De naaden waren met vleesch gevuld, de kroon-naad uitgezonderd, welke geene opening in het bekkeneel maakte. Deeze waren, gelyk boven gezegd is, alle zonder twyffel van een gescheiden door den eersten slag, doch hadden zich vervolgens door het uitgestorte bloed, en de etter, welke het bekkeneel en deszelfs bekleetselen uitzette, meêr van een verwyderd.

Het bloed was zekerlyk uitgestort uit de vele geborstte bloedvaten, welke door de naaden en het bekkeneel onderhouden gemeenschap met de boesems (*sinus*) van het dikke hersenvlies en de uitwendige bekleetselen. De laatste dodelyke val had niet veel veranderd de plaatsing der beenderen en derzelver vereeniging, maar de schudding der hersenen in deeze zwakke gesteldheid, zonder dat het dikke hersenvlies met de naaden vereenigt was, schynt 't meest toe gebragt te hebben tot den dood, welke men langen tyd had afgeweert.



V I.

Fractura Cranii comminuta.

Eene opening in het bekkeneel en dikke hersenvlies tot in de mergagtige zelfstandigheid der hersenen door een' boots-haak veroorzaakt.

In 1740. ontstondt 'er schielyk een geschil tusschen twee zee-lieden uit Finland, by de brug van deeze Stad. In de eerste haastigheid sloeg de een met den yzeren punt van den boots-haak den anderen in het hoofd.


De gekwetste viel aanstonds op den grond, en bloedde sterk uit het hoofd. Kortten tyd daar na stondt hy egter op, en ging in de Stad, om zich te laten onderzoeken en verbinden. Hy had boven op het regter opperhoofds-been, een' dwarschen vinger van den pylnaad, eene kleine ronde en gekneusde wonde.

Wanneer de haren waren afgeschooren, wilde ik met de sonde onderzoeken de diepte, en vondt met verwondering, dat dezelve, zonder aan het been te raaken, vier of meêr dwarsche vingeren diep, in de hersenen ging. De lyder zakte daar by van de stoel, en scheen flauw

flauw te zullen worden , doch kwam aanftonds tot zich zelve , wanneer de fonde daar uit gehaald was. De wonde wierd verbonden. Syn makker wierd geraaden , te zoeken een goed kwartier en bekwaame hulp , dewyl anders weinig goeds kon verwacht worden in eene zoo gevaarlyke hoofdwonde.

Maar alles wierd verzuimd zoo aan de zyde van den doodflager , als van den gekwetsten ; en daar door wierd veroorzaakt , dat de verrotting in de herffenen toenam , zoo dat de lyder den agtften dag ftierf.

De opening van het hoofd na den dood toonde , dat de yzere punt van den boots-haak , als een fpyker , het bekkeneel doorboord , en verfcheide fchilfers van het been gedreeven had in beide zelfftandigheden der herffenen van het regter halffrond tot in het eeltagtig lighaam (*corpus callosum*) ; daarenboven had het bekkeneel twee fpleeten van deeze opening komende ; het dikke herffenvlies was zwart en verftorven ; de oppervlakte der herffenen ontbonden in eene rotagtige ftoffe ; het was te beklagen , dat de lyder niet wierd getrepaneerd , wanneer de verrotting waarfchynelyk niet zoo fchielyk zoude zyn toegenomen , fchoon de zeer diep ingedronge beenshilfers egter eindelyk eene doodelyke verrotting zouden hebben konnen verwekken.



V I I.

Labium leporinum insulatum.

Een dubbele haazen-mond.

Negen perſoonen met aangebooren haazen-monden zyn in het Hospitaal geopereerd en geneezen, van deszelfs opregting af; drie daar van zyn zeer eenvoudig geweest, en op de gewoone wyze, zonder daar in eenige verandering te maaken, geneezen; drie waren wel enkelvoudig in de lip, namentlyk de bovenſte, maar egter zoo, dat daar by niet alleen het beenagtige verhemelte, maar ook het vleefchige geſpleeten was,

Deeze zyn ook, door de gewoone operatie op de uitwendige deelen te verrigten, geneezen. Drie hadden eenen dubbelen haazen-mond op onderſcheide manieren, by welker geneezing de eene of andere afwyking van den gewoonen weg noodzakelyk was: deeze laaſte gevallen zal ik kortelyk beſchryven.

I.

Een halfwaſſen knecht van *Södermanland* kwam in het Hospitaal in de maand Mey 1755. Met
moei-

moeite kon men verstaan een eenig woord van die, welke hy met geweld uitblies.

De bovenste lip was gespleeten aan beide zyden; het middenste gedeelte onder den neus was eenen duim breed, aan de benedenste hoeken rond, en tamelyk hard. De spleeten hadden gemeenschap met de holligheid van den neus, en van daar was het, dat de neusvleugels wyd gaapten, en de buitenste hoeken van de bovenlip ter breette van eenen kleinen vinger afstonden van beide hoeken van den mond; de lyder zag 'er zeer leelyk uit, en kwam genoegzaam overeen, zoo hy niet slimmer was, met de aftekening, door den Heere LA FAYE gegeven in *Mem. de l'Acad. de Chir. Tom. I. Part. III. Tab. 1. fig. 2.* Het geheele verhemelte was gespleeten van de bovenste openingen in de lippen af.

Drie groote snytanden staken een groot gedeelte uit, onder het genoemde middenste en heele gedeelte van de lippen, uitpuilende schuins van daar naar beneden, gelyk dezelfde tanden doen in een schaaps-bek. Van twee bekende manieren van opereeren moest de eene boven de andere met verstand verkoozen worden.

De eerste manier bestaat daar in, dat 1°. de vooruitstaande tanden worden uitgetrokken: 2°. beide zyden van het middenste stuk der lippen en deszelfs buitenste hoeken worden rauw gemaakt: 3°. dezelve met de omgewonde heg-



ting vereenigd; en 4°. dat de operatie verrigt worde op twee tyden; eerst aan de eene zyde, en vervolgens aan de andere, wanneer de eerste volkomen geneezen is.

De tweede manier word verrigt, 1°. door de uitpuilende tanden, en 2°. het middenste stuk van de lip wech te neemen, 3°. het inwendige vlies van den mond los te maaken van het eene jukbeen tot het andere, onder den neus. 4°. de buitenste hoeken van de lip met het mes tot in eenen scherpen hoek, zoo veel de kortheid der lippen wil toelaaten, rauw te maaken; en 5°. beide deelen door de omgewonde hegting te vereenigen.

De eerste manier word meer aangepreezen, en schynt, op het eerste inzien, grooter voordeelen te hebben, ten opzichte van de herstelling van het middenste deel, by de vereeniging. Doch, men moet bedenken, dat dit eilandje, welk hier vry groot was, 1°. meestendeels hard en onbekwaam is, tot eene schielyke geneezing. 2°. dat van eene breette van agt lynen moeten verlooren gaan by het rauw maaken twee lynen aan elke zyde, zoo dat 'er maar vier overig blyven, waar door 3°. het uitgespaarde van weinig beduidenis is; 4°. dat de lippen zich op eene aanmerkelyke wyze laten uitrekken; en 5°. dat de wanstaltigheid van twee litteekens, in plaats van een, vermyd word.

Om deeze redenen, verrigtte ik de operatie volkomen op de laatste manier, na dat de lyder door aderlatingen, buikzuiverende middelen, en eene goede levensregeling volgens noodzakelykheid voorbereid was.

Wanneer het eilandje en de randen van den buitensten kant der lippen met het mes wechgenomen waren, was ten naaften by in het geheel geene lip meêr te zien, of ten minsten $\frac{2}{3}$ deelen daar van wechgenomen. Des niet te min wierd de vereeniging te weeg gebragt met drie omwonde goude naalden, ondersteund met het gewoone verband.

Op den agtsten dag waren alle naalden wechgenomen, de lippen samen gegroeid, en voor een goed derde deel verlengd. In de vierde week was de wonde van binnen en van buiten geneezen, de lippen tot $\frac{2}{3}$ deelen verlengd, wanneer de lyder met een eenig litteeken, en duidelyke spraak, het Hospitaal verliet.

2.

Een jongen van West-Götland, vyftien jaaren oud, kwam in den maand Mey 1756. in het Hospitaal. Hy was gebooren met eene spleet in de bovenste lip, aan de regter zyde van de fleuf, die in dezelve is. De bovenste kaak en het verhemelte waren insgelyks gespleeten, byna tot aan het lelletje, maar niet ge-



geheel en al door het vleeschige verhemelte. De gaaping was breeder van agteren dan by de voorste tanden, want de kaaken waren hier ter plaatse wel drie lynen over elkander geschooten; de linker en onderste had syne gewoone halfronde gedaante, maar geene tanden; de regter stond naar vooren in een geboogen driekant, in welkers onderste rand vyf tanden waren.

Na dat de zieke bereid was, wierd de operatie verrigt; vier van de meest uitsteekende tanden wierden wechgenomen. Den twaalfden Mey wierd het driekante gedeelte van de bovenste kaak afgeknipt, en den negentienden de eigentlyke operatie en vereeniging met drie goude naalden verrigt, enz. Op den vyfden dag waren de naalden daar uit getrokken, en de lippen hadden zich samen vereenigd: op den veertienden was de wonde zoo wel van binnen, als van buiten geneezen.

3.

De Dogter van een Artillerist, agt jaaren oud, was gebooren met eenen haazen-mond, doch met eene dubbele spleet; sy kwam in de maand October van het jaar 1756. in het Hospitaal. De eerste spleet was midden onder den neus, ging tusschen door de twee voorste snytanden tot op de helft van het verhemelte, en was tamelyk breed; de genoemde twee tanden stonden schuins voor uit door de opening van
de

de lippen. Aan de linker zyde, eene kleine vinger-breette van de eerste spleet, was de andere, welke alleenlyk de breette van de lip verdeelde, tot $\frac{2}{3}$ deelen van onderen naar boven: dit halve eilandje was rond aan de drie losse hoeken, en dus had men weinig nut te hoopen van de vereeniging der lippen. Het kind bereid zynde, wierden de twee genoemde voorstetanden wechgenomen, den vierden October.

Den zesden werd de operatie verrigt: de kanten wierden tot in eenen scherpen hoek rauw gemaakt, waar in het halve eilandje aan de linker zyde begreepen was, en te gelyk wechgenomen wierd. Het overige geschiede, even als in de twee voorgaande gevallen, en gelyk in het algemeen gebruikelijk is. Den elfden wierden de drie naalden daar uit gehaald, de lip was samen-gegroeit en met een litteeken geslooten den agttienden.

Om de kanten vast te houden heb ik altyd gebruikt eene steevige kooren-tang, bewonden met eenen fynen gewaften draad. Om de randen af te snyden, dan een mesje, dan eene schaar, altyd met even goed gevolg: het mesje is egter ontegenzeggelyk beter, dewyl het minder kneuft, en de sneede regter maakt; doch zoo de sneede schielyk moest geschieden, gelyk by vreesagtige kinderen, dan is eene uitgezogte, scherpe, en gelyk-snydende schaar, beeter. Deeze operatie vereischt in het byzonder een

waar-

vaardig man , die even gemakkelyk kan knippen en snyden met de linker , dan met de rechter hand. Op de wonden , en de steeken der naalden , wierd gebruikt de *bals. de mecca* : binnen tegen de lip is het beeter niets te gebruiken , dewyl zulks de wonde prikkelt. De lyder moet gewaarschouwt worden , dat hy met de tong daar van afblyve. Zoo de lippen vastgroeiden aan de kaaken , of aan het vlies , welk het tandvleesch bedekt , dan spuit daar uit meer nut , dan nadeel voort.

Indien het vuur daar by kwam , en een stuk van de geopereerde lip wechviel , word dit gemakkelyk hersteld en geholpen , indien men met den genoemden balsem , 's morgens en 's avonds de wonde vult , gelyk ik by een zieke-lyk meisje na deeze operatie in het Hospitaal met voordeeb ondervonden heb.





Na eene voorafgaande voorbereiding wierd het kankeragtig gezwel en de verharding met het mes wechgenomen in een' puntigen hoek tot op de kin, en de wonde met vier naalden op de gewoone wyze tot elkander gevoegd.

Op den agtsten dag wierden de naalden wechgenomen, de wonde wierd bestreken met den *bals. de mecca*, en tegen den zestienden dag tot eene volkome geneezing gebragt: de linker onderkaaks-klier begon toen te zwellen, en wierd binnen vier- en twintig uren zoo groot als een muscaat-noot: een zakje van verdelende kruiden, als *Fl. Sambuci*, *Chamomillæ R.*, *Summitat. absinth. sem. cumini*, wierd gegeven, om daar op gedraagen te worden. Hy begaf zich vergenoegd naar syne geboorte-plaats, doch waarschynelyk zal het kwaad, op eene slimmere wyze, onder de kin zich wederom geopenbaard hebben.

2.

Een Boer uit Dalekarlien, agt-en veertig jaaren oud, kwam in 1756. in het Hospitaal. Hy had eene harde en open kanker in den linker hoek van den mond, welke zich eenen goeden overdwarschen duim uitstreckte tot aan het kaak-been, en even ver over de onderste lip tot aan de kin; de bovenste lip was niet vry, maar omtrent de helft minder aangedaan, dan de onderste: de onderkaaks-klieren aan de linker zyde waren reeds kenbaar, en de kwyklieren in den mond

mond aan dezelfde zyde knobbelagtig, als kleine erweten en linsen onder elkander. Deeze omftandigheden waren genoegzaam, om de operatie af te raaden, en den lyder aan te zetten, dat hy, fyn noodlot afwagtende, zich te rug zoude begeeven naar Dalekarlien, doch hy begeerde het Hofpitaal niet te verlaaten, voor dat het uiterfte zoude beproeft zyn, en hy was evenwel te vreedden, of hy daar, dan op eene andere plaats, zoude fterven.

Het wechneemen van de kanker fcheen zoo volkomen onzeker, dat zulks ten minften moest uitgesteld worden, zoo lang als men andere midelen konde beproeven.

De bladen van de *Belladonna* waren door de aanpryzyng van den Hooggel. Heere LAMBERGEN in naam gekomen, en geroemt tegen de kanker. Deeze wierden gebruikt in een aftrekfel van twee tot tien greinen in den tyd van agt weeken. Het ongemak wierd verbonden uitwendig met *ung. diapompholygos, de nihilo, ää unc. iv. Plumbi usti amalgamati, mercurii ää unc. j. facchari saturni. dr. ij.*, welk op linnen gefmeerd, en op hetzelfde gelegd wierd.

Hier op volgde geene verandering, de lyder begeerde dagelyks, dat het ongemak zoude uitgefneeden worden, het zy dit fynen dood verhaaften zoude of niet.

Na eene goede aanleiding, wilde ik nu beproeven het fap van de *Phytolacca Americana*, beroemd tegen kankeragtige zweeren. Het ongemak wierd daar mede omtrent veertien dagen verbonden, en daar over plukfel gelegd, maar het wierd dagelyks loffer, en bloedde meêr, waarom ik daar mede ophield. Uit eenen brief van den Regiments-Heelmeeſter C. F. PHEIFFER, die zich toen in Berlin ophield, vernam ik, dat het *alumen uſtum*, met merkelyk voordeel, aldaar in het Hofpitaal *de la charité* in de kanker aan de lippen gebruikt wierd, en ik beproefde dit middel ook aanſtonds in het Hofpitaal. Dit is zeker, dat de gebrande aluin, eens's daags in de open zweer geſtrooid, het weelderige vleefch verteerde, den grond van dezelve vaſt maakte, en de geneezing bevorderde, maar eene nieuwe verharding en zweer kwam ſchielyk in de kanten by de plaats, welke ſcheen te geneezen. Eindelyk wierd de operatie verrigt, waar over hy zich niet meêr beklaagde, dan of ik in ſyne kleederen geſneeden en geſtooken had.

Eerſt maakte ik eene ſneede, die met den mond evenwydig was, door den hoek van den monden het kankeragtig gezwel tot eenen overdwarfchen duim agter hetzelve op het kaakbeen, de tweede inſnyding begon midden op de onderſte lip, bevatte het gezwel van onderen, en wierd gemaakt in eene halve kring tot het einde van de eerſte inſnyding; de derde begon

gon midden op de bovenste lip, en na eene gelyke inrigting met de onderste, hield dezelve op by het einde van de eerste op het kaakbeen.

De opening had de gedaante van een langwerpig eirond, door het welke beide reyen der tanden gezien wierden: vervolgens werd eene hegting gemaakt met de *futura nuda*, om eenen nieuwen hoek van den mond te maaken. Een' overdwarschen vinger daar van daan werd eene naalde gestookten, en dus telkens op denzelfden afstand, tot dat 'er drie ingebracht waren. Op den agtsten dag wierden de naalden daar uit getrokken en de wonde was vereenigd. Alles schikte zich wel met de nieuwe wonde; doch de klieren onder de kin en den mond begonnen zoo schieelyk en zoo geweldig op te zetten, dat zoo wel de ademhaaling, als de vrye loop van het bloed naar en van het hoofd, langzamerhand belet wierden, tot dat hy in de vierde week na de operatie stierf.

3.

Eene Koesters-vrouw van *Ubleao*, vier- en zestig jaaren oud, kwam hier in 1753., om geneezen te worden van een byna soortgelyk kankeragtig ongemak in de onderste lip.

Haare ouderdom, en de slegten toestand van het ongemak, welke geene beterschap beloofde,

de, kon haar besluit niet veranderen, om door de operatie hulp te zoeken, dezelve geschiedde met de noodige veranderingen na de omstandigheden. De naalden konden den agtsten dag daar uit gehaalt worden, schoon byna de geheele onderste lip in een' hoek was uitgesneden. De wonde werd geneezen binnen drie weken, de lippen waren van de zyden hersteld, maar in de vierde week begonnen de klieren onder de tong en kaak schielyk te zwellen en zoodanig in grootte toe te neemen, dat sy binnen negen weken na de operatie haar als verstikten, en haar leven eindigden.

4.

Een arme boer uit het Kerfspel *Dandry* in *Roslagen* kwam in het Hospitaal in February 1758; hy had eene ope kankeragtige zwelling by den regter hoek van den mond, welke de gedaante had van een dik gedraaid touw, en rykelyk een' duim lang was; de einden strekten zich uit tot aan de onderste en bovenste lippen; het middenste en dikste gedeelte tot aan het kaak-been in den hoek van den mond: dus was het omtrent hetzelfde geval, als onder N. 2. van dit artikel beschreeven is: de verhardingen in de onderste lip hadden insgelyks eene harde uitzetting, eenen duim dik, welke ging tot op de kaak. Voor het overige schein deeze man gezond en vrolyk te zyn.

Na eene goede voorbereiding wierd de operatie op de volgende wyze verrigt.

1°. wierd de kanker in de onderste lip in eenen bekwaamen hoek wechgenomen tot op de kaak; de uiteindens van den hoek of der insnydingen begonnen by den hoek van den mond; 2°. wierd gemaakt een andere en puntige hoek evenwydig met den mond, deszelfs onderste voet begon aan den hoek van den mond en ging schuin sch tot aan het kaak-been, de andere begon op de bovenste lip voorby de hardheid, en ging regt naar vooren om zich te vereenigen met de uiteinden van de voorige op het kaak-been.

Dus wierden de verhardingen daar in bevat en wechgesneeden. De mond had nu drie van elkander leggende hoeken, welke gebragt moesten worden tot twee en digter by elkander. Tot dit einde wierd eerst eene *futura nodosa* gemaakt in de voorige mond-hoeken, welke duidelyk bepaalde de lengtte van den mond, en de samenvoeging der insnyding. Deeze hegting wierd ondersteund met twee goude naalden in elke insnyding, welke omwonden wierden, als in de *futura involuta*. De hegtpleister en het overige verband wierden volgens omstandigheden aangelegd.

Deeze lyder, anders altyd ongemeen geduldig, was daar by zeer begeerig om te spre-

spreeken zoo wel onder , als na de operatie. Noch herinneringen , noch waarschuwingen , konden hem beletten zagties te praaten , meestendeels met zich zelve.

Op den tienden dag wierden alle naalden uitgetrokken , en de hegting in den hoek van den mond los gemaakt. De deelen zaten wel te samen , maar nog niet genoeg , om eenig geweld uit te staan. Tusschen den twaalfden en der tienden dag , wanneer de geneezing nog daags te vooren als onfeilbaar voorgekomen was , moest ik den volgenden dag den ondersten hoek voor de helft zien open gaan.

Hy was moede , langer te drinken en synen dorst te lesschen met eenen lepel , maar hy wilde drinken uit een kan , en toen berste de half geslooten wonde wederom open ; de kanten wierden geneezen in weinige dagen en rekten zich genoegzaam uit , zoo dat hy egter kon beletten , dat de kwyl tegen den wil uit den mond liep.

Ik behield hem nog veertien dagen na de geneezing in het Hospitaal , om te zien of eenig nieuw kwaad zich zoude opdoen ; maar dit geschiede niet , en ik heb kortlings vernomen , dat hy nog welvarende is.





I X.

Trichiasis & Distichiasis.

*Eene omkeering der hairen van het oog in een of
meêr reyen.*

Dit is dikwils voorgevallen in het Hospitaal. Sommige van deeze lyders zyn zoo ver gekomen, dat fy zonder kaars de voorwerpen niet konden onderscheiden, of alleen den weg vinden.

De onderrigtingen omtrent den oorsprong van derzelver ongemak stemden alle daar in overeen, dat langduurige zinkingen en traanende oogen voor af gegaan waren, tot dat de oogleden begonnen te zwellen in de midden, en de *tarsus* met de hairen zich te keeren naar het oog, wanneer derzelver geduurige prikkeling den toevloed der vogten vermeerderde, de ontsteeking van de *adnata* verwekte, het heldere hoornvlies wond maakte, verduisterde, en met een' roof deed bedekken.

Doch ik herinner my geen' een', die door de operatie niet geholpen wierd, waar by andere hulpmiddelen, als een seton in den nek, spaansche vliegen, mostert-pappen, buikzuiverende



middelen en eene goede levensregeling veel bygebragt hebben, om de zinkingen en den toevloed der vogten van de oogen af te leiden.

I.

Eene Boerin van Dalekarlien, zes- en dertig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1754. Sy was blind door eene *Distichiasis*. De hairen van de oogen waren in twee of wel drie reyen uitgesprooten, en gekeerd naar het regter oog; de oogleden waren eenigzins gezwollen; de oogbol was verminderd en in gevallen, het doorschynende hoorn-vlies ongelyk en duister, zoo dat men noch den oogappel, noch den regenboog zien kon.

Het linker oog was eenigzins, maar weinig beter; de hairen waren in orde gegroeit, en stonden naar het oog gekeerd, het hoornvlies was ongelyk, ruuw, eenigzins verduisterd, en het oog in fyne natuurlyke grootte. De huid boven de oogleden was zeer slap tot daar het hair begint, en had eenige losse rimpels, welke gemakkelyk met den vinger naar boven en naar onderen konden bewoogen worden.

Na eene voorbereiding, wierd eerst het regter oog geopereerd. 1. Wierden $\frac{3}{4}$ deelen van de opperhuid en huid op het bovenste ooglid in de gedaante van eene halve maan wechgesneden, en gehegt. 2. wierd met het onderste ooglid even eens voortgegaan na vereisch der omstandigheden. 3. Behandelde men de oogleden aan het
lin

linker oog even eens ; besmeerde de wonden met *bals. de mecca* ; ondersteunde de hegtingen met hegt - pleisters en een dienstig verband. Op den vierden dag wierden de hegtingen los gesneden en wechgenomen.

Het linker oog was bevryd van de prikkeling der haren , maar het regter even als voor de operatie. Na agt dagen waren de insnydingen geneezen.

Het vel op het voorhoofd was , gelyk gezegd is, ongemeen slap, hong laag neder , en maakte, dat de operatie by het regter oog mislukte. Het oog-lid was meestendeels wechgenomen, en de wenkbrauw hong over het oog.

Volgens den raad en de proeven van den Heere MORAND in dit geval , wierd met het mes wechgenomen een nieuw stuk van de huid in de gedaante van eene halve maan , anderhalven overdwarschen duim breed, omtrent twee overdwarsche vingers boven de wenkbrauwen, gaande de snede door de opperhuid, het celagtig weeffsel, de voorhoofds - spier, en ook waarschy-nelyk door het peesagtige uitspanfel van het hoofd, welke wonde vervolgens op de gewoone wyze samengehegt en geneezen wierd: deeze operatie maakte , dat de wenkbrauw opgeligt , en de rand van den *tarfus* eenigzins van de oogen gekeerd wierd; het onderste ooglid was niet of niet genoegzaam verbeeterd door de eer-

ste operatie ; de huid van het aangezicht was zoo los, als of 'er geen celagtig weeffel onder geweest was.

De ontoerykelykheid van de gewoone infnydingen in de gedaante van eene halve maan, voor zoo verre fy zich meerendeels voegen na de gewoone vouwen en rimpels in de huid, het welk ik verscheide reifen te vooren by deeze operatie in acht genomen heb, maakte, dat ik besloot, eerst door eene vierkante opening in de huid, en vervolgens door het vereenigen der bovenste en onderste hoeken, genoegzaam op te ligten de oogleden, en de prikkeling der hairen ten eenenmaale wech te neemen. Dit geschiedde zoo by het onderste als by het bovenste ooglid van het regter oog.

De losse huid wierd opgeligt met den duim en voorsten vinger van de linker hand, en met eene schar schuinsch ingesneeden ; de schar wierd toen in de linker hand genomen, en het ingesneede gedeelte door den regter duim en voorsten vinger gevat, waar na eene soortgelyke infnyding gemaakt wierd van de linker zyde, om zich te vereenigen met de onderste deelen van de eerste ; op deeze wyze wierd een vierkant stuk wechgenomen, de wenkbrauw daar onder begreepen, hebbende eene middenlyn van een' goeden overdwarschen duim: dit vierkant stond met eenen hoek over den *tarfus*. Deeze hoek en de bovenste wierden te samen gehegt door de *sutu-*

sa nodosa, de wonde wierd bestreeken met den *bals. de mecca*, de noodige hegt-pleisters en het verband wierden aangelegd. Hetzelfde wierd in het werk gesteld met het onderste ooglid. Het oog was nu volkomen bevryd van de beleiding der hairen. De lydereffe zag heel wel met het linker oog; deeze laatste insnyding was geneezen op den agtsten dag.

Dewyl fy veel geleden had, wierd fy veertien dagen in het Hospitaal gehouden; in welken tyd het regter oog dagelyks meêr helder wierd, en het gezicht toenam, zoo dat de regenboog en oog-appel kenbaar wierden, en fy, die by de hand geleid wierd in het Hospitaal, zonder hulp daar uit kon gaan.

Zederd dien tyd heb ik in voortgelyke gevallen aanstonds de operatie verrigt met een vierkant stuk uit de huid te neemen, welk om de gemakkelykheid gevat wierd met een tangetje. De voordeelen zyn groot, de pyn is dezelfde, zoo niet minder, daarenboven word 'er maar eene hegting vereischt, en het litteken maakt weinig onderscheid.

2.

Eene gezonde Boerin uit Oost-Bottnien kwam in het Hospitaal in 1755. met eene *Distichiasis*. Sy zag, en kon zelve den weg vinden vooral met het linker oog, welk 't minst aangedaan was.
Het

Het regter was ſterk ontſtooken , en uit hetzelfde liep veel vogt ; het doorſchynende hoornvlies was zoo rood als de *conjunctiva* , de *adnata* was gezwollen , en opgezet ; met een woord, ſy was blind aan dat oog, 't welk inſgelyks weinig hoop tot herſtelling gaf.

Na dat ſy voorbereid was, wierd een vierkant ſtuk uit de huid geſneeden, en de hoeken ſamengehegt aan het bovenſte en onderſte ooglid van de regter zyde. Het linker oog wierd tot op eenen anderen dag gelaaten. De wonde was geneezen in agt dagen ; ſy had wel veel verligting , maar de traaning en roodheid van het oog verminderden niet genoegzaam , de *tarsus* en hairen van het oog waren regt geſteld. Inwendige en uitwendige afleidende middelen wierden naaſtig gebruikt.

By eene nauwkeurige onderſoeking , wierden verſcheide kleine hairtjes gevonden binnen den *tarsus* van het benedenſte ooglid ; en door de prikkeling van deeze wierden de toevallen tegen gewoonte onderhouden. Sy lieten zich wel gemakkelyk met een tangetje uittrekken, en toen kreeg het oog ruſt en wierd beter, maar ſy kwamen na eenige dagen wederom , wanneer de toevallen vernieuwt wierden. De langduurige ontlaſting van het vogt had de buitenſte deelen van het oog ontveld, voornamentlyk by den inwendigen hoek ; de *caruncula lacrymalis* , het *punctum lacrymale inferius* , de *emiffaria*
glan-

glandular. sebacear. Meibonii waren zeer flets, en de *caruncula* met andere plaatsfen op de genoemde deelen, tegen de natuur, met hair begroeid.

Het uittrekken der hairen met de wortels, het gebruik van den *lapis infernalis* en van een gloeiend yzertje, was in den beginne niet in staat, om te beletten, dat dezelve wederom opgroeiden; de deelen wierden egter meêr en meêr droog, en de hairtjes kwamen niet zoo gemakkelyk en fchielyk wederom.

De opgezwolle *adnata* was nu vlakker geworden, en bleek; het doorschynende hoorn-vlies werd van tyd tot tyd meêr helder. Eindelyk werd het hairige deel agter en beneden om het onderste traapftip bevogtigd met eene wateragtige ontbinding van den *lapis infernalis*, waar by een poeder van *aloë* en campher gedaan was.

Het ongemak werd van tyd tot tyd beeter, het linker ooglid werd intuffchen geholpen met een gedeelte van de huid in de gedaante van eene halve maan wech te neemen, en, na verloop van zeven weeken, was fy eindelyk bevryd van de ongemakken, en reisde naar huis.





X.

*Ectropium & Lagophthalmus.**Eene omkeering en verkorting van de oogleden.*

Twee lyders met zoogenaamde haazen-oogen hebben in het Hospitaal hulp gezocht en zyn geneezen.

I.

Eene meid van dertig jaaren uit Upland, fris en gezond, kwam in den zomer van 1755. in het Hospitaal. Vier jaaren oud zynde, was sy by ongeluk gevallen met het aangezicht op een koolen-vuur, waar uit sy zich zelve niet kon ophelpen; en, voordat iemand tot hulp kwam, had sy op eene jammerlyke wyze het aangezicht gebrand, zoo egter; dat de oogen onbescha digd gebleeven waren.

Alle gebrande wonden laten groote en diepe litteekens na, wanneer de verstorve deelen daar uit vallen. Sy moest meêr schaade daar van lyden, dewyl sy, behalven de bystand van de natuur, weinige of niet genoegzaame hulp kreeg. Sy had derhalven hooge en ook diepe litteekens overal in het aangezicht.

Voor.

Voornamentlyk was op de regter kaak een groot driekant en diep litteeken met daar van afgaande takken, welke, even als banden, den regter hoek van den mond en het onderste ooglid optrokken regt streeks tegen de vrywillige beweeging der spieren. Een kleiner litteeken, welk egter ook de gedaante van een touw had, ging ook van het linker onderste ooglid tot den hoek van den mond aan dezelfde zyde. Het voorhoofd was geheel en al met een gelyk en dun litteeken bedekt. Van deeze gingen harde litteekens tot beide bovenste oogleden, maar voornamentlyk tot het regter.

Wanneer de meid de kringswyze spieren van den mond en de oogleden met vlyt wilde famentrekken, kon fy met behulp van de vingers, by het onderste regter ooglid, de oogen eenigzins sluiten. Integendeel, als fy op eene andere wyze zagties de oogen wilde sluiten, konden de oogleden niet digter tot elkander komen, dan tot op de helft van den oogbol, en nog minder, wanneer fy fliep.

De gewoone plaatfing der oogleden, wanneer fy niet in beweeging waren, was zoodanig, dat fy voor de helft waren omgekeerd aan de regter en een weinig minder aan de linker zyde: de regter hoek van den mond was altyd opgetrokken tot het onderste regter ooglid.

Indien fy den mond opende, om fpys of
drank

drank te gebruiken, te geeuwen, of om eenige andere rede, wierden alle koordagtige litteekens in beweging gezet, waar door het aangezicht eene deerniswaardige gedaante kreeg: de hoeken van den mond wierden getrokken naar boven, de oogleden buitenwaarts gekeerd, en dan vertoonde zich de gezwolle en vleeschige *adnata* over de *tarfi* der oogleden, even als een stuk rood vleesch rondom de oogen. Tot betterfchap van dit ongemak wierden allerhande middelen beproeft.

1°. Wierden de litteekens tusschen de hoeken van den mond en de onderste oogleden los gemaakt, terwyl de hardste deelen daar van in de diepte wechgenomen wierden: aan de bovenste oogleden geschiedde hetzelfde; de oogleden wierden met pleisters tot elkander gehouden, de wonden droog verbonden; en de weder opwasschende litteekens met den *lapis infernalis* wech gebeeten. Na verloop van drie weeken waren de litteekens wederom aangegroeit, en even groot, als te vooren, zoo dat de operatie vrugteloos was.

2°. Wierd eene andere proef in het werk gesteld. Het bovengenoemde driekante en diepe litteeken op de regter kaak, welk als een vast punt gaf aan de koordagtige litteekens om de deelen te kunnen trekken, moest wechgenomen worden. Ik zonderde hetzelfde te gelyk met de digste litteekens op de nauwkeurigste
wyze

wyze af; vervolgens wierden de oogleden los gemaakt door eene halvemaanswyze insnyding; de wonde werd bestreeken met *bals. de mecca*; de *tarfi* omgekeerd; de oogleden samen vereenigt door hegt-pleisters. Deeze insnydingen, welke de meid kloekmoedig uitstond, scheenen op het einde van de derde week veel uitgerigt te hebben, maar de litteekens begonnen wederom op nieuw langzamerhand op te groeijen, zich te verheffen, hard te worden, en dezelfde ongemakken voort te brengen, als in den beginne. Ik zoude haar nu graag hebben laten gaan, als ongeneeslyk, maar sy drong sterk daar op aan, dat men de geneezing verder beproeven zoude.

3°. Het groote litteeken op de regter kaak moest wechgenomen worden, zoude men anders eenige verandering kunnen hoopen. Het wechsnijden met het mes, het uitvreeten met brandende middelen, den *lapis infernalis* het *butyrum antimonii*, waren zonder voordeel beproeft, eindelijk stak ik zoo diep, als ik kon, onder het litteeken tot tegen de *musculus buccinator* of de *membrana interna oris*, met eene naalde een gewaften draad, in gedagten om door de afbinding dit deel in het vuur te doen overgaan. Het litteeken werd verdeeld in verscheide deelen door verscheide afbindingen: Deeze wierden dagelijks togetrokken; op den vyfden en zesden dag was het geheele litteeken en een gedeelte van de losse huid in den omtrek in verrotting. De wonde werd verbonden met eene ettermaaken-

de zalf uit *Balf. de Mecca dr. IJ, ol. amygd. dulc. unc. J, ol. ceræ. gtt. xv.*

Na veertien dagen was de wonde zuiver; ik vondt met vergenoegen, dat de gewoone hardigheden op den grond verdweenen waren; de geneezing geschiedde zonder een hard litteeken in de huid. Na deeze proef, wierden alle de overige koordagtige litteekens afgebonden, welke de oogleden en den linker hoek van den mond in disorder bragten. Hetzelfde goede gevolg kwam daar op, namentlyk een zagt litteeken. De mond was nu in order, en kon geopend worden, zonder dat de oogleden getrokken of omgekeerd wierden; maar de zwakheid van derzelver randen, en het vleeschagtig uitwas van de *adnata* belette, dat de oogleden zich tot elkander konden sluiten. De Meid wilde geene pyn gespaard hebben, om ook te overwinnen dit laatste en kwaadste ongemak.

4°. Het vleeschagtig uitwas van de *adnata* wierd *gescarificeerd*, en bestrooid met *pulv. sacchar. candi gr. xvj, alum. crud. gr. ij.* Door dit alle drie dagen te herhaalen, wierd hetzelfde omtrent veertien dagen in eene gestadige zweering gehouden, en het wierd nu dunner.

Zoodra de ontsteeking zich verminderd had na deeze wonden, wierden uit alle vier de oogleden gesneden halvcmaanswyze stukken, gelyk in de *Trichiasis*; de middenste deelen van de
oog-

leden ruim eene lyn van den bovensten rand van den *tarfus* wierden doorftookten met eene fyne naalde en eenen dubbelen rooden zyden, met was bestreeken, draad, die vervolgens toe geknoopt werd.

Dit geschiede aan beide oogen; de wonden wierden bestreeken met den *bals. de Mecca* en amandel-oly, en over dezelve gelegd linnen compresen bevogtigd met gelyke deelen water en Franschen brandewyn. Na agt dagen waren de oogen op deeze wyze toegeslooten. Daar kwam geene ontsteeking by tot een bewys, dat de spieren, zonder zwaare gevolgen, doorgesneden, en aangetast konnen worden. De zyde draad in het regter en onderste ooglid had zich zelve los gemaakt op den vyfden dag, en dus te vroeg; de openingen wierden bestreeken met *bals. de Mecca* en een nieuwe ligatuur aangelegd by de voorste. Eindelyk begonnen de overige ligatuuren los te gaan, en wierden wechgenomen. De wonden wierden alle geneezen na zefstien dagen.

De oogleden bleeven staan, als de mond geopend werd, zonder zich om te keeren. Na agttien weeken was deeze kloekmoedige Meid meestendeels geholpen van de genoemde wanstaltigheden.

De wydloopigheid van dit verhaal dient by voorkomende gelegenheden van soortgelyke ge-

neezing, om aanstonds te verkiezen die manier, welke hier 't best schynt gelukt te zyn.

Om de harde litteekens in het aangezicht wech te neemen na de pokjes, geloof ik, dat insgelijks zulke onderscheppingen en afbindingen de beste zyn, 't geen ik ook uit eige proeven bevestigen kan.

2.

Eene Boerin uit *Nerike*, twee- en veertig jaaren oud, kwam in den zomer van den jaare 1756. in het Hospitaal. Sy had een *Ectropium* aan beide de onderste oogleden, maar vooral aan het regter.

Eene langduurige zinking en aanhouderide ontlasting der traanen hadden de oogleden zoo zeer verslapt, dat de bovenste als in eene *phalangosis* neêrhongen over de helft van het midden van den oog-appel, en door de omkeering der hairen het doorschynende hoorn-vlies begonnen te prikkelen.

De onderste waren omgekeerd buitenwaerds, niet geheel en al van den eenen oog-hoek tot den anderen, maar alleenlyk het halve ooglid van den inwendigen hoek af, en de *tarsus* was in de midden uitgeweeken: de onderste traan-stippen waren dus op de kaaken en deden geen dienst.

De bovenste stippen waren door de verlamming der oogleden gevallen over en voorby de *caruncula lacrymalis*, en konden by gevolg de traanen niet optrekken, welke hier rykelyk afscheiden wierden, en zonder tegenstand over de kaaken liepen. Sy was niet blind, maar door de opgegeeven omftandigheden zeer geplaagd, en het vrye gebruik van het oog belet.

Na eene voorbereiding van eenige dagen wierd de operatie op de volgende wyze verrigt.

Een vierkant stukje wierd gefneeden uit het regter bovenste ooglid en een halve maanswyze uit het bovenste van de linker zyde. Beide wierden fy gehegt en geneezen, als boven in de *Trichiasis* befchreeven is,

Na verloop van zeffien dagen wierd by het regter oog in de buitenfte huid gemaakt eene infnyding van vier lynen, evenwydig aan de *commiffura interna musc. orbicul.*, boven de pees van deeze fpier, eenigzins fchuinfch naar de *apophysis naf. offis frontis*. Vervolgens wierden van beide randen voor de traanstippen omtrent twee lynen afgefneeden, doch iets meêr van de onderfte; en dus wierd de infnyding volkomen ovaal: deeze wierd famengehegt in den binnenften hoek door de *futura nodofa*, en geneezen als in de *Trichiasis*: eene andere wierd gemaakt door de beide *tarfi*, twee lynen aan de andere

zyde van de traanstippen, en samengebonden met een strik. Deeze wierd op den zevenden dag wechgenomen, en had dat wenschelyk nut te weeg gebragt, dat de *tarsus* oprees, en in de natuurlyke plaatsing bleef.

De ontlasting der traanen over de kaaken verminderde duidelyk, schoon de *carunculæ lacrymales* onder de nieuwe vereeniging der oogleden bedekt, en onzichtbaar waren. Het linker oog wierd vervolgens onderhanden genomen, en geneezen op dezelfde wyze. Na verloop van eene maand was sy gezond, en ging geneezen uit het Hospitaal.



*****:*****

X I.

Ancyloblepharum cum Trichiasi.

*Eene famengroeijing der oogleden met eene omkeering
der hairen naar de oogen.*

I.

Een afgedankte soldaat van *Södermanland*, zes en vyftig jaaren oud, had na eene traaning der oogen, welke veele jaaren geduurd had, dat toeval gekreegen, dat de oogleden famengegroeit waren, en hem beletten te zien, en den weg te vinden: hy kwam in het Hospitaal in 1756.

De oogen waren klein en ingevallen; de oogleden famengegroeid aan beide de hoeken, lattend in de midden eene opening, nauwelyks van drie lynen; hier uit liepen de traanen, dewyl de traanstippen toegegroeit waren; de traanen hadden den rand van den *tarsus* van het onderste ooglid aangevreeten; ook waren de hairen op deeze plaats uitgevallen, maar zaten nog van buiten langs de famenvereening. De oogleden waren van onderen vry en niet vereenigt met de *adnata* van het oog. De operatie wierd verrigt op de volgende manier.

Op eene holle sonde wierden de oogleden tusschen de hairen naar den binnensten en naar den buitensten hoek geopend, en by den binnensten zelfs voorby de traanstippen. Uit de oogleden werd een stuk van de huid in de gedaante van eene halve maan gesneden, de wonde gehegt, en geneezen, als in de *Trichiasis*. De kanten van de insnyding of de randen der oogleden wierden bestreeken met eene ontbinding van den *lapis infernalis*. Tegen den tienden dag was alles geneezen.

De bovenste traanstippen waren onbeschaaidig, en begonnen waarschyndelyk dienst te doen, dewyl de ontlasting der traanen over de kaak verminderde en vervolgens ophield, wanneer hy na drie weeken met opene en zuivere oogen het Hospitaal verliet.

2.

Eene vrouw van *Westmanland*, vier en dertig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in de maand Augustus van het jaar 1758: sy had aan beide oogen eene *Distichiasis*, en de oogleden waren aan den buitensten hoek samengegroeit, dat is, de hairen van het oog waren in twee of drie ongelyke reijen uitgekomen, en naar het oog gekeerd, als ook de oogleden ter lengtte van zes lynen te samen gegroeit aan den buitenhoek van het oog.

Het linker oog was meer toegegroeit, dan
het

het regter. Eene langduure vogtige en roosagtige oogontftecking (*ophthalmia humida* & *erisypelatoses*) met eene daar op volgende *psorophthalmia* had by haar grootendeels den grond daar toe gelegd. Na dat de oogen veele jaaren getraant hadden, waren de randen van de *tarfi* ontvelt, verzworeen, en wierden allenskens famengelymd. De oog-hairen waren deels binnen, deels buiten de famengroeijing geplaatst, en de eerste veroorzaakten, door de prikkeling, de zwaarste pijn. De overige haitjes op de vrye deelen van de *tarfi* sleepten, als penfeelen, over de oogen. De oogen waren onklaar, en de vaten van de *adnata* sterk uitgezet. Sy kon ter nauwernood den weg vinden.

Na eene goede voorbereiding wierden de oogleden geopend met een mesje, langs eene fyne en holle sonde, tusschen de twee *tarfi*; de insnyding werd verlengt tot buiten de grensen van den buitensten oog-hoek, ten minsten twee lynen verder, als de rand van de oogholte, op dat de geneezing niet te schielyk zoude geschieden, en de oogleden zouden worden omgekeerd door de operatie van de *Trichiasis*.

Deeze werd gemaakt met vierkante uitsnydingen, zich uitstrekkende, volgens noodzaakelykheid, tot de buitenste hoeken van de oogleden, en elk met de *futura nodosa* gehegt. Deeze zoo wel, als de overdwarsche insnyding,

wierd bestreken met den *bals. de Mecca*, by het eerste verband.

Na vyf dagen, en, wanneer de oogleden met de haitjes naar behooren gekeerd waren, wierden de draaden daar uit getrokken; de zweertjes van de kliertjes van *Meiboom* en de zwelling van de *adnata* wierden geneezen en verdeeld door eene oog-zalf, bestaande uit *ung. de tutia dr. ij. axung. viper. r. dr. j. pulv. camphor gr. ij.* De oogleden wierden opgeligt en onbelemmerd bewogen tegen elkander, schoon de buitenste vereeniging der oogleden in de dwarsche insnyding doorgesneeden was. Eenige haitjes onder en binnen de *tarfi* prikkelden de oogen. Deeze wierden uitgetrokken, en de plaats bestreken met eene wateragtige ontbinding van den *lapis infernalis*, waar door belet werd, dat sy wederom konden aangroeijen. Na verloop van drie weeken verliet sy het Hospitaal, dagelyks meêr en meêr in gezondheid toeneemende.





gelyk was uitgerekt, en flap, bedekte twee derde deelen van het oog, en kon niet opgeligt worden, om het oog bloot te maaken, zonder hulp van de handen. Het onderste ooglid was integendeel omgekeerd, gelykende een *Ectropium*, 't geen insgelyks veroorzaakt was door de grootte van het gezwel, welk de *adnata* van het ooglid uitzette, en deed zwellen, en deszelfs kraakbeenige gedeelte neêrdruchte.

Eene zoo moeyelyke plaatsing vereischte eene oplettende operatie, op dat het oog niets zoude lyden in het maakfel en de werking, of het aangezicht door een groot litteeken wanfstaltig zoude worden; twee omftandigheden, beide noodig, tot de gelukkige geneezing van den zieken.

De Hooggeleerde Heer ACREL verrigtte de operatie: 1°. wierd eene halvemaanswyze insnyding gemaakt, na den loop der vezelen van de kringswyze spier (*) over de hoogte van het
ge

(*) HEISTER, van het *Ectropium* spreekende, raad de insnyding op dezelfde wyze te maaken, geloovende, dat anders de spieren te veel in haare werking zouden lyden. Maar de Hooggel. Hr. PLATNER is van andere gedagten, wanneer hy raad de insnyding geheel en al anders te maaken, bewyzende daar mede, dat dit niets heeft te beduiden. Dit geval toont duidelyk, dat het verlies van eenige flappe vezelen hier niets ter zaake doet, zoo maar de spier ontzien word by den binnensten hoek van het oog, alwaar dezelve zich vasthegt. Is het nu om het even, op welke wyze de insnyding gemaakt worde, dan
dunkt

gezwel, onder den *tarsus* van het onderste ooglid, 2°. wierd het gezwel aan alle zyden met het mes van de bekleetselen afgescheiden. Het gezwel wierd opgeligt met kleine haakjes, en van den benedensten grond van de oogholte losgemaakt, en de agterkant van de *adnata* van het onderste ooglid, met een driekant mesje, een myrten-blad genoemd, volkomen, zoo van de zenuw en spieren, als het verharde vet, zeer diep uit den grond van de oogholte. De gezicht-zenuw kon onder de operatie duide-lyk gezien worden, en diende voor eenen ze-keren wechwyzer. De bovengenoemde *fissura spheno-maxillaris* kon insgelyks met de vingers zeer wel bemerkt en gezien worden, wanneer het gezwel was wechgenomen, 3°. Na dat het-zelve wechgenomen was, wierden de randen der wonde door de *futura nodosa* vereenigt; twee hegtingen wierden gemaakt met eene naald en draad midden op de wonde, en deeze wierden ondersteund door hegt-pleisters; beide einden van de wonde wierden opengelaaten, om aan de stoffe eenen uitgang te verschaffen; in den beginnen wierd dezelve verbonden met de gewoone ettermaakende zalf, *bals. arcæi*, vervolgens met roozen-honig, *tinct. Aloës & Myr-rhæ*,

dunkt het my natuurlyker wyze beter te zyn, te spaaren 't geen gespaard kan worden, dan onnodiger wyze te be-schaadigen, 't geen de mensch niet zonder weezenlyk nut gekreegen heeft.




rhæ, en eindelyk met droog plukfel en eene opdroogende zalf.

Het uitpuilende oog zakte allengskens neer, deels van zich zelve, deels wierd het voorzichtig neêgedrukt, door trapswyze comprefsen, die, over het oog gelegd, met den ronden band vaftgehouden wierden. Hier door wierd het oogmerk berykt, het gezwel was wechgenomen, het oog kreeg langzamerhand fyne natuurlyke legging, beweeging, en gezicht wederom; de oogleden kreegen ook hunne vorige gedaante en beweeging; de wonde wierd genêezen, en liet na een litteeken, welk weinig gezien wierd.

Dit alles viel voor binnen den tyd van vyf weeken, wanneer hy naar fyne geboorte-plaats terug keerde.





X I I I.

Cancer oculi sinistri.

Het linker oog in een kankeragtig gezwel veranderd.

Van Christ. L. Ramstroem.

Een kleine jongen van vier jaaren wierd in den voorleden zomer in het Hospitaal genomen. Deszelfs linker oog was in een kankeragtig gezwel veranderd, en had de grootte van eenen grooten renet-appel, zittende buiten de oog-holte. Het gezwel was bruin van kleur, open en gespannen, en toonde geen blyk van het veranderde oog.

Hetzelve had anderhalf jaar in grootte toegenomen; na dat hetzelve oog eenige reifen te voren was ontstooken geweest, vervolgens getraant en etter van zich gegeven had, waren eindelyk de oogleden ook gezwollen en samenvereenigt.

Uit onverstand of eene nadeelige kleinmoedigheid had de moeder het oog in deezen toestand, onaangeroert en ongewasschen, gelaaten. Eindelyk had sy, door deszelfs ontaarting verschrikt zynde, hetzelve ten eenenmaale aan het noodlot overgelaaten. Na dat de moeder zich lang bedagt had op het voorstel, dat het kind
niet

niet kon geholpen worden, zonder dat het oog uitgepelt wierd, gaf fy daartoe haare toestemming, en de operatie geschiedde op de volgende wyze.

Eerst wierd de huid geopend eenen overdwarschen duim van den buitensten hoek van het oog, om de oogleden van elkander af te zonderen: met een tweefnydend mesje wierd het bovenste en onderste ooglid van het gezwel naar den binnensten hoek en beneden om den bovensten rand van de oog-holte losgemaakt. Met eene kromme naalde wierd vervolgens een sterke en dubbelde gewaste draad door het oog van den buitensten tot den binnensten hoek gestooken: het oog wierd daar mede voorzigtig opgeligt, en tot op den grond van de holte uitgeschilt. De gezicht-zenuw en de spieren van het oog wierden van hetzelfde losgemaakt, en het gezwel wechgenomen.

Het kind was tegen verwagting stil en wel te vreedden, terwyl de operatie verrigt wierd; behalven eene geringe koorts volgden geene zwaare toevallen. De oog-holte wierd gevuld met los en droog plukfel; daar over wierden gelegd zachte compressen, gedoopt in warmen wyn en Franschen brandewyn; vervolgens een zakje met hoofd-kruiden, gekookt in bier en azyn; en inwendig wierden gegeeyen poeders met salpeter en kampher, als ook een verkoelende drank.

Het

Het volgende verband wierd gebruikt; in den grond wierd gelegd droog plukfel, en rondom de zyden van de oogholte kleine wicken, be-
 smeerd met het *ung. digestivum* uit de *bals. de mecca. dr. j. ol. amygd. d. unc. ß. vit. ov. N. j. pulv. myrrhæ scr. ß.*; dezelve wierd gevuld met goed en vast vleesch; eindelyk wierd het plukfel bevogtigt met de *Ess. balsamica* uit de *bals. Fioraventi unc. ß. Tinct. myrrh. ℥ aloës ana dr. ß. mell. rosar. dr. ij.* In de vyfde week kon het kind uit het Hospitaal gaan.

In het uitgepelde gezwel kon geen blyk van het oog gevonden worden, en het zelve had ten eenenmaale de gewoone gedaante van een open kanker.



X I V.

*Pterygium , Pannus oculi.**Eene vleeschagtige huid over het oog.*

Verscheide zulke gevallen zyn in het Hospitaal voorgekomen doch, dewyl alle byzonder aangetekende gevallen deeze ondernoomte verzameling al te wydloopig zouden maken, zal ik volgens myne begonne gewoonte alleenlyk opgeeven een of twee waarneemingen van elke ziekte, die 't moeyelykft te geneezen waren, dewyl de geneeswyze genoegzaam daarna kan ingerigt worden.

I.

Een Finlandsch meisje uit het District *Abo*, agt- en twintig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1754., blind, zoo dat fy zonder hulp den weg niet vinden kon.

Eene langduurige vogtige oog-ontfteeking aan beide oogen, had wegens den onverhinderden toevloed van vogten, en het beletfel in de buitenste vliesen van de oogen, derzelver buisen en aderen zoo verwyderd, dat fy nu niet alleen zeer sterk gezwollen, maar insgelyks verstopt,

samenegroeid, en veranderd waren in eene vleeschagtige substantie, welke het doorschynende hoornvlies bedekte, en van alle zyden daar over gemeenschap had met zwaare aderen, waar in reeds kleine gezwelletjes en verzweringen gezien wierden.

Dit toeval zoude, aan zich zelve overgelaaten zynde, ongetwyfeld en in korten tyd alle hoop, om het gezicht weder te krygen, wechgenomen hebben. Aderlatingen op den voet, buikzuiverende middelen, en eene verkoelende levensregeling wierden agt dagen lang gebruikt, om het ligchaam te bereiden.

Ik wist door de proeven van andere en myne eige veelvuldige ondervinding, hoe weinig de *scarificationes* of *ophthalmoxyses*, van WOOLHUISEN uitgedagt, in een' minderen graad hielpen; en besloot daarom in dit geval eenen meer zekeren weg in te slaan. De *adnata* van den oogbol moest worden wechgenomen; maar derzelver meer vaste vereeniging met de *sclerotica*, dan natuurlyk is, de loop der vaten over dezelfde, en derzelver gemeenschap met de vaten van de *Choroidea* beletten, dat sy met de *acus uncata* kon opgeligt, en gemakkelyk wech gesneden worden.

Met de gewoone naalde wierd egter de gezwolle *adnata* gevat, en toen maakte ik met een bekwaam lancet daar in eene opening tot op

de *sclerotica*. Onaangezien deeze vastigheid, was egter de zwaarigheid even groot, om eenig stuk daar van af te snyden. Ik wierd derhalven genoodzaakt, dan met een geboogen haakje, dan met een fyn tangetje, de kanten vast te houden, en met een fyn mesje, even als een lancet, dan wederom met eene fyne schaar, de insnyding in de *adnata* te volbrengen rondom het doorschy-nende hoornvlies.

De gezwolle vaten waren dus overdwars doorgefneeden, en gaven veel bloed van zich; de randen van het kringwyze uitgefneede vleeschagtig vlies scheiden zich nauwelyks eene lyn van elkander, het welk vertoonde als een witte ring van de *sclerotica*. Op de oogen wierd gelegd eene stooving van warmen wyn geduurende de twee of drie eerste dagen. Het meisje voelde zich zeer verligt in de oogen, en geloofde, dat sy beter zag.

Na negen of tien dagen begon de witte ring of insnyding, rood te worden, en de van een gescheide kanten van de *adnata* begonnen zich te vereenigen. Dezelve was na de eerste insnyding bleeker en dunner gebleeven, waar uit ik zonder verdere proeven, beterschap hoopte. Maar na dat de nieuwe en lelyke gedaante denzelfden toestand voorspelde, als voorheen, ligte ik, tot eene proef, de *adnata* wederom op met de meergemelde haaks-wyze naalde, en toen zag zich met vergenoegen, dat dezelve op-

opgeligt wierd, zoo wel tegen de *zona ciliaris* als van onderen by het ooglid; daar op wierd dezelve by stukken wechgesneden rondom het oog.

De sterke bloedstorting maakte, dat zulks niet op eenen dag kon volbragt worden; de geringe ontsteeking, welke volgde op elke insnyding, vereischte volkomen agt dagen, om verdeeld te kunnen worden. Beide oogen waren even eens gesteld, en dit maakte, dat de geneezing tot in de veertiende week duurde, maar te gelyk zoo gelukkig afliep, dat haare oogen niet alleen bevryd wierden van de tegenwoordige verzweringen en gevreesde *leucomata*, maar haar ook bevryden van de langduurige traaning, terwyl sy haar gezicht volkomen had wedergekreegen. Onder de geneezing wierd een seton in den nek, en een fontanel op den arm, gezet, waar van de laatste behouden wierd, wanneer sy met een goed gezicht uit het Hospitaal ging.

2.

Eene Boerin uit *Westmanland* bezocht het Hospitaal in 1755. Sy had op het regter oog een dubbeld *Pterygium*, of twee driekantige *panni*; midden op het hoorn-vlies was een klein zweertje, tusschen deszelfs bovenste lagen: van dit gingen twee draaden, of opgezwolle verstopte bloedvaten, een naar elken hoek; deeze waren omtrent anderhalve lyn lang, en breidden zich

uit in de driekantige vleeschagtige vliefen, welker grondstukken gekeerd waren naar de ooghoeken, en ophielden by de breede banden van den *tarsus*: de *conjunctiva* van de oogleden was vry, en het binnenste van het oog onbeschaadigd.

De operatie wierd gemakkelyk en gelukkig verrigt. De bovengenoemde draaden wierden opgeligt met eene haaks-wyze naalde, en teffens met de vleeschagtige vliefen los gemaakt, onder de vereeniging der oogleden, met eene fyne schaar, en doorgesneeden: het bloed wierd afgewasschen, het oog verbonden, en op hetzelfde wierden gelegd compressen, bevochtigd met gelyke deelen water en Franschen brandewyn. Zes dagen daar na wierd het zweertje geopend met eene verticale sneede in de laagen van het hoornvlies. (Dit kan beter begreepen worden uit de behandeling, dan uit de beschryving). Het oog wierd bevochtigd met *Aq. rosar. unc. ij. mucilag. sem. Psylli dr. j. Camphoræ a. solut. gr. j. Vitriol. albi gr. ß.* Het zweertje droogde op, en liet na een dun en bleek litteeken; de vrouw zag wel, en ging heen.





X V.

Spina ventosa orbitæ dextræ.

Eene wind-doorn rondom de regter oog-holte.

In 1753. kwam een arme boer uit *Herjedalen*, in hoop van hulp te zullen vinden in het Hospitaal tegen syn zwaar ongemak.

De beenderen, welke de regter oog-holte uitmaaken, voornamentlyk het voorhoofds-been en de bovenste kaak, waren zeer uitgezet, en hadden de gedaante van eenen afgebrooken kegel; zynde vier overdwarsche vingers hoog en by den grond even breed, gelykende voornamentlyk na eenen omgekeerden beker, in wiens grond of nu naar boven gekeerde einde het oog gelegen was. Dit was niet ten eenenmaale gezond en helder, als ook iets kleiner, dan het linker, maar had beweegelyke oogleden, en andere uitwendige daar toe behoorende deelen, ook kon het oog tamelyk wel groote voorwerpen onderschyden.

De Lyfartz Bäck, en de Heer *Affessor* ELF, welke met my deezen zieken zagen, vonden denzelfen ten eenenmaale ongeneeslyk.



In 1756- heeft een andere arme Boer uit *Blekingen*, en in 1758. een foortgelyke uit *Dal-land* zich in het Hospitaal vertoont, welke ins-gelyks geplaagt waren met zulke wind-doorns aan het bekkeneel en de regter oogholte, met de eene of andere verandering, doch altyd on-geneeslyk. Geen wel denkend mensch zoude aan de bestiering van het Hospitaal, kunnen verwytten de onbehulpzaamheid, om dat zulke zieken naar hunne geboorte-plaats geweezen worden, wanneer 'er geene de minste hoop is van beterschap.



X V I.

Cataracta.

De Staar.

Van alle uitwendige gebreeken, die eene heekkundige handwerking vereifchen, is de ftaar 't meest voorgekomen. Het zoude derhalven zoo wel overvloedig, als voor de nauwe paalen van dit werk ondienftig, zyn, te fpreeken van alle lyders, welke in het Hofpitaal geopereerd, en geholpen zyn. Een uittrekfel van eenige gevallen zal aan het oogmerk voldoen, waar in de byzondere foort van den ftaar, de toevallen na de operatie, en de uitkomst merkwaerdig waren.

Ik heb my altyd bediend van de zoogenaamde manier van St. Yves, met de eene of andere verandering naar vereifch der omftandigheden. De oorzaaken, waarom ik meen, dat dezelve in het vervolg boven de andere den voorkeur moet hebben, zyn door my in de verhandelingen van de Koninglyke Sweedfche Academie der Weetenfchappen voor den jaare 1757. aangeroert, by-

gelegenheid, dat ik de gebruikelijke manieren met elkander vergeleeken heb (*).

Vier menschen, met den staar geboren, zyn, op onderscheide tyden, ziende gemaakt door de operatie in het Hospitaal, 't geen het grootste getal is van zulke blinden, welke ooit eenig Waarneemer, voor zoo ver ik weet, heeft aangetekend; zy zullen omstandiger en byzonder hier na beschreeven worden.

I.

In 1754. kwam een Boeren-knecht uit Oost-Gothland in het Hospitaal, zynde aan beide oogen blind door den staar. Na eene behoorlyke voorbereiding door eene aderlating op den arm, twee buikzuiverende middelen, en eene verkoelende levenswyze, wierd de operatie verrigt.

Wanneer ik de naalde in het crystallyne vogt bragt, midden voor den oogappel, by het register oog, wierd de gewoone tegenstand van het crystallyn niet bemerkt.

De punt en platte zyden van de naalde scheenen duidelyk, wanneer zy omgedraaid wierden,

ag-

(*) Deeze Verhandeling is in het jaar 1766 ook afzonderlyk met eenige andere, die deels daar tegen geschreeven waren, deels tot antwoorden op de tegenwerpingen dienden, in de Sweedsche taal in 't licht gegeven, en toen heb ik daar van gesproken in myne *Natuur- en Genees-kundige Bibliotheek V. D. 2. St. pag. 367.*

agter de *lamina anterior capsæ* te zyn; de naalde wierd zonder verdere opening uitgehaalt, en ik wilde dit oog tot op eenen anderen tyd laten.

In het linker oog vindt ik het crystallyne vogt even week en de naalde zichtbaar door het kasje en den oog-appel; maar op dat ik de gesteldheid van het crystallyn zoude zien, maakte ik eene verticaale sneede in het onderste gedeelte van de voorste *lamina*; toen liep daar uit een melkagtig vogt, welk het wateragtige en het binnenste van het oog troebel maakte, wanneer de naald aanstonds wierd uitgetrokken.

Dit verdeelde zich binnen weinige dagen, zonder dat eene ontsteeking daar by kwam. De lyder was blind, als te vooren. Ik raadde hem naar huis te gaan, en na twee jaaren weder te komen.

In den voorleden zomer, juist na twee jaaren, kwam hy in het Hospitaal. Men begon wederom met het regter oog. Zoo dra de naalde by het crystallyn kwam, bemerkte ik aanstonds deszelfs vastigheid; het wierd schielyk neêrgedrukt, en de oogappel helder. Door de boven gemelde gemaakte opening in het kasje van het linker oog had hy meêr dan een jaar eenigzins gezien, gelyk hy ook nu zag den weg, den grond, fyne voeten, en alle voorwerpen, welke hem in deeze rigting voorgelegd wierden; ik

oor-

oordeelde daaarom, dat het cryftallyn was wechgelopen, en dat de *lamina anterior capsulae* uitmaakte een voorhangfel, welk nu belette, dat de licht - ftraalen vallen konden op het netvlies.

Om dit te ontdekken bragt ik voorzigtig en langzaam de naalde in het oog, minder, dan eene lyn van het *ligamentum ciliare*, tegen het vlies, om hetzelve los te maaken, op te ligten, of neêr te drukken, zoo als dit 't beft zoude kunnen gefchieden; maar uit oorzaake van deszelfs vereeniging met de *proceffus ciliaris* by den buitenften hoek, konden niet meêr, dan $\frac{2}{3}$ deelen daar van los gemaakt en neêr gedrukt worden. De lyder kreeg geen toevallen, zag wel, en ging naar huis.

2.

In hetzelfde jaar 1754. kwam een Boerenknecht uit het Kerfpel *Lerbeck* in *Nerike* in het Hofpitaal, zynde blind door den grauwen ftaar aan beide oogen. Volgens gewoonte wierd hy voorbereid en geopereerd: het regter oog wierd gelukkig herfteld, en kreeg het gezicht weder. Het linker wierd aangedaan door eene *inflammatio Rheumatica*, waar door het oog op het einde duifter wierd, eenigzins famenviel, en het gezicht verloor. Hy was ongemeen vergeenoegd, dat hy goed en wel zag met het eene oog en ging uit het Hofpitaal. Nauwelyks twee maanden daar na kwam hy wederom naar het Hofpi-

Hospitaal met fyne drie fusters , uit dezelfde plaats, die alle den ſtaar hadden, en blind waren.

Deeze knegt bleef zederd in Stockholm woenen , den koſt winnende met metzelen , hy kreeg na eene langduurige derdendaagſche koorts de waterzugt, wierd op nieuw genomen in het Hospitaal, en ſtierf na eenigen tyd. Ik onderzocht het goede oog , waar mede hy zoo wel na de operatie had gezien, en bevondt, dat het neêrgedrukte cryſtallyn volkomen ontbonden en verdweenen was. De *membrana Hyaloides* was eenigzins ongelyk, op de plaats van de *fovea cryſtallina*, maar helder.

Syne fusters wierden op eenen dag geopeerd, hadden zagte en melkagtige ſtaaren, welke dus moeyelyker waren neêr te drukken, dan de vaſte.

Op den dertienden dag na de operatie kreegen ſy toevalliger wyze, met verſcheide zieken, zwaare braakingen , welke duurden omtrent vier- en twintig uren: de zagte en neêrgedrukte ſtukken van het cryſtallyn, en de deelen van deſzelfs kaſje kwamen wederom naar boven, maar zakten weder binnen den zeventienden dag neder; de ontſteeking wierd daar door eenigzins vermeerderd, maar in de zesde week zagen ſy wel en verlieten het Hospitaal.

De vierde fuster kwam alhier in den zomer van 1757. insgelyks blind, fy wierd geope-reerd, kreeg haar gezicht weder en ging naar huis. Het is te verwonderen, dat deeze vyf kinderen dit ongemak gehad hebben, daar der-zelver ouders noch een zwak gezicht hadden gehad, noch ook blind waren geweest.

3.

Een Jongen uit Dalekarlien, vyftien jaaren oud, kwam in den zomer van 1754. in het Hospitaal, zynde blind aan beide oogen door den ftaar, waar mede hy geboren was. De ftaaren hadden eene kleur, als kryt, en in dezelveen vertoonden zich een en ander zwart ftreepje; fy hadden dus de tekenen, volgens welke oude Schryvers de operatie afraaden. De onmogelykheid, om het gezicht op eenige andere wyze weder te krygen, de hoop, dat de oogen van binnen wel gefield zouden zyn, dewyl hy het licht van de duifternis kon onderscheiden, en de pryzenswaardige oogmerken by de inrigting van het Hospitaal, moesten de proef toelaaten.

Behalven de ftaaren had deeze jongen geduurige trekkingen in de fpiere van het oog (*Strabismus oculorum habitualis*), en wanneer de oogen door eigen dwang of hulp zouden vast gezet worden, keerden fy zich liefst naar de linker zyde, het linker oog naar den buitenften en
het

het regter naar den binnensten hoek: van daar was het, dat het wit van het linker oog ten eenenmaale bedekt wierd onder de vereeniging der oogleden by den buitensten oog-hoek, alwaar de naalde moest ingebracht worden, daar integendeel het doorschynende hoornvlies zich in deszelfs plaats aanbod.

Het linker oog, welk het slegtste was, wierd 't eerst onder handen genomen, en na veel moeite bragt ik de naalde in, op de gewoone plaats anderhalve lyn van het *ligamentum ciliare*. Vervolgens kon het oog zoo gekeerd worden, dat de oogappel van vooren in de midden kwam, het crystallyn was hard, en liet de naalde met moeite in. Door de beweeging van de naalde met het crystallyn tegen de *lamina anterior capsulæ*, vond ik dezelve niet minder vast en vereenigt, zoo dat dezelve in het geheel niet kon gebroken worden; ik wierd derhalven genoodzaakt het crystallyn van den punt van de naalde te doen, en keerde den punt tegen het voorste gedeelte van deszelfs kasje. Dit was even hard, als het crystallyn, bood tegenstand aan den scherpen punt, en week door den oogappel inde voorste kamer, eer dat het openbrak. Vervolgens maakte ik daar in, als in taay pergament, inkervingen naar boven en beneden, en bragt het te rug in de agterste kamer. Door deeze openingen wierd vervolgens het crystallyn gevat, en in drie stukken vry gemakkelyk onder het glasagtig lighaam gebragt op de ge-

woone wyze en plaats. Eenige stukjes van het kasje volgden mede, de overige bleeven zitten, als een net; de operatie was langduurig, en pynelyk, en het oog wierd, met vrees van kwaade gevolgen, verbonden.

Het regter was gemakkelyker te opereeren, dewyl het wit van het oog zich geheel en al aanbod uit de bovengenoemde oorzaak. De vliessen waren wel dik, maar broffer by het openen, dan in het linker; het crystallyn wierd gemakkelyk neêrgedrukt, maar deszelfs vlies met meêr moeite. De jongen zag nu wel, en verlangde rust te hebben tot op eenen anderen dag. Noch ontfteeking noch andere gewoone toevallen volgden daar op.

Na verloop van vyf weeken was het net in het linker oog tamelyk wel wechgesmolten; in het regter bragt ik nog eens de naalde, en drukte een groot gedeelte van hetzelfde neder; waar door de jongen op eene weezentlyke wyze geholpen wierd, en naar huis vertrok.

4.

In 1757. kwam in het Hospitaal een Boer van Dalekarlien uit het Kerspel *Lexa* met twee syner zoonen. De vader had een' goeden en vasten staar op het linker oog, welke een jaar oud was, wierd derhalven gelukkig geopereerd, en kreeg syn gezicht weder; het crystallyn in het regter

oog fcheen ook door den ftaar aangedaan, doch dezelve was nog niet ryp en wierd ook niet aangeraakt.

De Zoonen waren blind gebooren ; hadden volkomen overeenkomstige ftaaren met den jongen in de voorgaande waarneeming befchreeven, doch de *Strabismus* of de ftuipagtige beweging in de oogen was egter by deezen fterker. Dezelfde bovengemelde rede noodzaakte my de mogelykheid van de operatie te beproeven.

De oogen van den oudften jongen wierden voornamentlyk van de linker naar de regter zyde getrokken. Het wit in den buitenften hoek van het regter verborg zich wederom onder de vereeniging der oogleden, na een weinig gewagt en opgepafst te hebben, trof ik de regte plaats aan, vondt het cryftallyn kaasagtig, en het kasje taay; maar niet zoo als by den eerften jongen. Het kasje brak en volgde met het cryftallyn naar beneden, zoo dat de oogappel helder wierd.

Een gedeelte van het cryftallyn kwam door den oogappel in de voorfte kamer, welk in den beginne een weinig drukte en ontftak het *ligamentum ciliare* aan den beneden kant, maar langzamerhand wechsmolt, zonder aan het gezicht te fchaaden. Het linker oog was voordeeliger geplaatft. Met de naalde ruim twee lynen van

het *ligamentum ciliare* in het oog gebragt, wierd het cryftallyn van dezelfde vaftheid gevonden, als het eerfte, maar het kasje was onbreekbaar. Het cryftallyn was tegen gewoonte groot in fynen omtrek. De naalde wierd naar agteren gebragt, en eene opening gemaakt in het agterfte gedeelte van het kasje volgens de manier van FERREIN; doch het cryftallyn was te groot, en wilde niet volgen. De agterfte kamer was hier zoo nauw, of zoo veel opgevuld, dat het cryftallyn by de minfte beweeging het druivenvlies naar vooren drukte, en den regenboog even als wilde doen oopen berften: Eindelyk gingen kleine ftukjes van het cryftallyn los in de voorfte kamer, en het overige als ook het kasje vereenigden zich met de *uvea*. Hier op volgde, zonder eene byzondere pyn, een *hypopyon* of etter-oog. De etter kwam uit hetzelfde door de gewoone infnyding, het oog wierd vervolgens beter, maar verloor het gezicht.

De oogen van den jongften zoon wierden op onderfcheide wyzen getrokken, hy was tien jaaren oud, fchrikkelyk bang, bevreesd voor menfchen, en niet volkomen by fyn verftand.

Het regter oog wierd onder de trekkingen voornamentlyk naar de regter zyde bewoogen, maar, fchoon by de eerfte operatien veele zwaa-righeden geweest waren, wierd deeze fchielyk en gelukkig verrigt: de oog-appel was zeer klaar,

hy

hy hilde zeer ſterk, en het oog was in eene onbegrypelyke beweeging.

Het linker oog wierd even eens getrokken, maar zette zich vaſt van booven naar beneden toe, en zoo onnatuurlyk, dat hetzelve het doorſchynende hoornvlies ten eenenmaale onder het benedenſte ooglid verborg, waar door men de inplanting van de gezicht-zenuw zien kon in den omgekeerden oog-bol. Dit alles raadde de operatie af, waarom hy naar huis ging, ziende alleenlyk met het regter oog.

Aanmerkingen.

In deeze gevallen had de manier van FERREIN niet kunnen gebruikt worden, voornamentlyk op de oogen, welke zich draaiden uit de buitenſte ooghoeken, en daarenboven wegens de hardheid der vliefen, welke veel moeite vereiſchte, eer de *axis viſus* gezuivert wierd. By het regter oog van het eerſte geval had het cryſtallyn door de *boutoniere* wel kunnen naar agteren gebragt en neêrgedrukt worden; doch het harde vlies zoude niet mede gevolgd zyn, maar vereiſcht hebben eene nieuwe operatie; zoo als ik gezegd heb.

Verſcheide zagte en melkagtige ſtaaren heb ik met weinig hoop moeten neêrdrukken, om te voldoen zulke zieken, welke uit de verafgelegenſte Provintien van het Ryk in het Hospitaal hulp kwamen zoeken.

De operatien hebben dan meêr of min volkomen kunnen volbragt worden, uit oorzaake van de deelen, en het melkagtig vogt, welk de oogen troebel maakte. De toevallen zyn dikwils zwaar geweest, ontfteekingen, pynen, die zich 'snagts verhieven, en een fteeking in de flaapen van het hoofd (*).

Van eene ftrengre levensregeling, aderlatingen op de armen en voeten, fpaanfche-vliegen, en kop-glafen in den nek, buikzuiverende, en uitwendige verdeelende middelen, heeft eene opening van de flagader aan den flap van het hoofd,

(*) Het is nog meêr verwonderenswaardig, dat op de neêrdrukking van den ftaar na deeze wyze, niet altyd zwaare toevallen volgen, indien men bedenkt, dat de *nervi ciliares* RUYSCHII in *Thef. Anat. Tom 2. pag. 5.* juist op die plaats zich 't meêft verdeelen, na dat fy uit de famenloopende takjes van het derde, vyfde, en zesde paar, met eenige takjes van de *intercostalis* opgekomen en verfterkt zyn. De Hr. PETIT heeft in *Act. Reg. Scient. Acad. 1727. p. 1.* beweefen, dat de *nervus intercostalis*, wêlke de *carotis* volgt binnen in het bekkeneel, zich verdeeld in veele takken, van welken een zich voegt by den *ramus ophthalmicus* van het vyfde paar. Deeze zenuwen gaan vervolgens in drie of vier onderscheide bondeltjes in de vliefen van het oog, twee of op 't hoogft drie lynen van den *nervus opticus* in de zelfftandigheid van de *sclerotica*; 't meêft onder de *musculus rectus externus* of *abducens*, tot omtrent vyf lynen van den rand van de *cornea*, van waar fy zich alle verfpreiden tot de *ligamenta ciliaria* en *uvea*, alwaar de ftaar-naalde voornamentlyk op en neêr bewoogen word tegen het kasje van het cryftallyn.

hoofd, altyd de meeste verligting en de fchielykfte verdeeling te weeg gebragt.

Onder de uitwendige middelen, die daar op gelegd zyn, heeft een mengfel van *Eau d'arquebusade unc. iij. spir. vini. Gall. unc. j. liq. anod. min. Hoffmanni dr. ij.* alleen, of met water verlengd, meer nut te weeg gebragt, dan *alb. ovor. e. alum. conquassat. of mucil. sem. Cydon. Psyllii cum croco & camphora*, welke ik by beurten gebruikte: meerendeels zyn de ftukjes van het voorfte gedeelte van het kasje van het cryftallyn gefmolten, en de blinde heeft fyn gezicht wederom gekreegen, ten minften aan een oog. Het verdient ook opgemerkt te worden, dat, als een harde ftaar neêrgedrukt word, dezelve veel gemakkeliker wederom naar boven fchiet, door fchokkingen van hoeften, niefen, braaken, of foortgelyke beweegingen, dan een vloeybaare ftaar, welke uit fyn kasje geloopt is.

5.

In 1754. befchaadigde zich een Boer uit Dalcarien, welke eenen berg deed fpringen, met eenen fchoot, zoo dat het regter oog het gezicht verloor; maar het linker geen ander ongemak kreeg, dan dat twee kruidkorreltjes zich in het onderfte gedeelte van het doorfchynende hoornvlies vafthegten; het cryftallyn wierd onduifter, en kreeg eenen ftaar, in de gedaante van eene omgekeerde halvemaan, welker bolle

zyde den geheelen *focus lentis* innam, tot volkomen drie vierde deelen van den oog-appel. Ik opereerde dit oog in het Hospitaal volgens de manier van St. Yves. Het crystallyn was zeer vast op de plaats, alwaar hetzelve ondoorfschynende was, maar voor een vierde gedeelte zag, en wierd gemakkelyk neêrgedrukt; de lyder zag aanstonds, en ziet nog wel.

6.

Een Boerenknecht, oud dertig jaaren, aan beide oogen blind, uit het Kerspel *Munktorp* in *Westmanland*, kwam in 1756. in het Hospitaal. Na eene behoorlyke voorbereiding wierd de operatie gemaakt. Beide crystallyne lighamen wierden zeer zagt gevonden, en hadden de kleur van wey. Eerst wierd het linker oog geopend; het ontbonde crystallyn vloeyde uit syn kasje, maakte het wateragtig vogt troebel, gelyk ook het binnenste van het oog. In deeze duisterheid kon geen verdere proef op het kasje zelve genomen worden. De naalde wierd daar uit getrokken, en het oog verbonden. Ik wilde onderzoeken, of de gesteldheid van het regter oog beter was.

De naalde wierd in hetzelve gebragt, aanstonds liep wederom soortgelyk weyagtig vogt of het ontbonde crystallyn daar uit. Het oog wierd troebel, en de naalde moest uit hetzelve gehaald worden, zonder dat men syn oogmerk be-

bereikt had. Op den arm wierd op nieuw eene aderlating verrigt. Op de oogen wierd het gewoone oog-water gelegd. Een mengfel, uit *Eau d'arquebuse* *unc. iij. Spir. vin. Gall. unc. jß. liq. anod. min. Hoffm. dr. ij.*, wierd alle drie uuren op de compressen gegooten. Daar volgden geene toevallen op.

Op den vierden dag was ik nieuwsgierig, om in het duistere de compressen opteligen, en den toestand van de oogen te zien. Sy scheenen zeer zuiver, helder en zonder ontsteeking te zyn. Dewyl my dit onwaarschynelyk voorkwam, wierd 'er meêr licht gemaakt, en men vondt toen waarlyk de oogen zoo zuiver, als of sy nooit den staar gehad hadden, of de operatie verrigt was. Sy wierden verbonden, en, zoo als te vooren, geduurende zeven dagen verzorgd, wanneer sy volgens gewoonte aan het licht gewoon gemaakt wierden. Na verloop van veertien dagen verliet hy het Hospitaal.

Het voorste gedeelte van het kasje van het crystallyn is in dit geval doorschynende en niet verduistert geweest; het uitgestorte crystallyne vogt is van de opflorpende vaten opgezoogen, en verdeeld. Verscheide soortgelyke voorbeelden zouden kunnen opgegeeven worden, doch geen een, welk in een' zoo korten tyd en zonder de minste gevolgen gebeurt is.

Een blind gebooren knecht, drie en veertig jaaren oud, van de Yzer-gietery *Oosterby* in Upland, kwam in het Hospitaal in 1758. De staar had de kleur van kryt, was in de midden eenigzins ingedrukt, en had een en andere paersche streep aan de voorste zyde.

De operatie wierd ondernomen, met eene zeer onzekere hoop van eenen gelukkigen uitgang, waar voor men by soortgelyke staaren vreeft.

Het linker oog wierd 't eerst geopereerd. Het crystallyn was zoo hard, als de korst van kaas (*), en wilde zonder eene sterke drukking de naalde niet inlaaten, hetzelve was daarenboven groot., drukte de *processus ciliares*, het druivenvlies, en den regenboog, tegen de voorste kamer, wanneer hetzelve door de naalde in beweeging gebragt wierd, of zoude neêrge-
drukt

(*) Zoodanig eene hardheid is ook gevonden by den eersten blind gebooren, waar van boven gesproken is, maar vooral in dien, welke ouder in jaaren was. Deeze hardheid was zeer na aan been, of als een hard kraakbeen. De Hr. DAVIEL, die zich bekend gemaakt heeft door eene nieuwe manier om den staar te geneezen, met het crystallyn uit het oog te neemen, heeft voor korten tyd aan de Koninglyke Sweedsche Academie der Weetenenschappen gezonden twee Waarneemingen, welke hem tot eer verstreken, en deeze operatie op eene aanmerkelyke wyze verryken: 1. heeft hy, by eene onzekere voorzegging, na syne eigen manier gelukkig geopereerd twee
aan-

drukt worden. En, dewyl het crystallyn met deszelfs voorste gedeelte voor de helft, als ware het, huisveste in het agterste gedeelte van den regenboog op den geheelen grond van het druivenvlies, kon deszelfs grootte en rondte duidelyk gezien worden door den regenboog aan den voorkant. Terwyl men moeite deed, om het crystallyn los te maaken, op te ligten, of neêr te drukken, wierd het *atramentum choroideum* losgemaakt, en verduisterde het oog, als een bruin koffy-water, doch zonk schielyk wederom op den grond, zoo dat de operatie kon voortgezet worden. Of dit *atramentum* op de *uvea* zat, dan of de zydelyke deelen van het crystallyn zich vereenigt hadden met het netvlies onder de *apices processuum ciliarium*, en onder de operatie het netvlies hadden opgescheurd, en het *atramentum* met zich gebragt hadden, kan ik niet zeggen met zekerheid.

Eindelyk gelukte het, het crystallyn neêr te druk-

aangewassen staaren; 2. Heeft hy in het onderste gedeelte van den regenboog gemaakt twee insnydingen, om het crystallyn beeter uit het oog te neemen; 3. Het crystallyn been-agtig gevonden; en 4. Het vergenoegen gehad, dat de lyder, die een schilder was, syn gezicht weder kreeg, en in syn beroep kon voortgaan, schoon de regenboog zich niet volkomen in de rondte sloot, of het vermogen had, om zich te openen en te sluiten. Men kan hier van eene uitvoerige beschryving vinden in de Verhandelingen van de genoemde Academie voor het jaar 1759.

drukken, en de oog-appel was helder. De lyder zag, en kon van blyfchap nauwelyks de traanen binnen houden. Ik wilde het regter oog onaangeroerd laten, welk volkomen even eens, zoo niet met kwaader tekenen verzeld, was. Maar hy bad hertelyk, dat deeze hulp niet zoude uitgefteft worden, dewyl hy de operatie zeer dragelyk vondt.

De naalde wierd ingebracht, en ontmoette aanftonds het harde, groote, en den regenboog drukkende, cryftallyn, welkers grootte en beweeging tegen de naalde duidelyk gezien wierd door den regenboog. Na eenige beproevingen ging hetzelve los; het *Atramentum choroideæ* wierd niet gezien, maar het cryftallyn drong zich zoo fterk naar de voorfte kamer door den oog-appel, dat het te vreezen was, dat de rand van den regenboog zoude openberften, en de ftaar in de voorfte kamer van het oog komen.

Het wateragtig vogt, welk anders aanftonds wechloopt, wanneer de naalde gebragt word agter de *zona ciliaris* in de agterfte kamer, kon hier niet uitkomen, dewyl het cryftallyn te dicht agter tegen den oog-appel geplaatft was, daarom wierd de fpanning des te zwaarer, dewyl het cryftallyn minder ruimte had zich te beweegen.

Ik befloot in haaft, volgens de manier van den
Hr.

Hr. PETIT, het doorschynende hoornvlies te openen, het wateragtig vogt te laten wechloopen, en zoo het mogelyk was, het crystallyn te brengen door den oog-appel in de voorste kamer, en vervolgens wech te neemen door de opening daar van: nauwelyks was het hoornvlies in deszelfs onderste halfmondte geopend met het lancet, of het wateragtig vogt liep wech, het crystallyn wierd los, en zakte naar agteren onder het glasagtig vogt met eene geringe hulp van de naalde, welke intusschen wech genomen was, doch op nieuw ingebracht wierd. Dus was ook dit oog helder.

De lyder wierd verbonden en opgepast op de gewoone manier, daar openbaarden zich geene zwaare toevallen, zelfs niet de geringste ontsteking op het wit van het oog.

Na verloop van zes dagen wierden de oogen geopend, en in eene donkere plaats onderzocht; $\frac{3}{4}$ gedeelte van beide neêrgedrukte crystallyne lighamen scheen half omgekeerd tegen de onderste kanten van de oog-appelen. Het overige was helder. De *Strabismus* en trillingen der oogen beletten hem, de voorwerpen aanstonds duidelyk te zien; want, wanneer hy naar den grond wilde zien, zag hy naar het dak, en, als hy meende regt uit te zien, zag hy naar de zyden. Hy kende de voorwerpen ook niet aanstonds op het gezicht, 't geen voor hem ongewoon was, maar
de

de groote deelen moest hy leeren, door dezelve aan te raaken.

Eindelyk na verloop van drie weeken, begon hy te zien, en wel te onderscheiden 't geen hen voorgesteld wierd. De opstaande kanten van de staaren smolten wech en verminderden.

8.

De broeder van den vorigen lyder, een smid, agt- en veertig jaaren oud, van dezelfde Yzergietry, was insgelyks blind. Het linker oog was voor twee jaaren door zinkingen opgezwollen, en wederom samengevallen; in het regter was een staar, en hetzelfde was ook ingezakt.

De operatie wierd ondernomen. Het crystallyn had geene gelyke hardheid, maar brak in stukken, die, het een na het ander, moesten neêrgedrukt worden. De oogappel bleef helder, het oog wierd verbonden, en op de gewoone wyze verzorgt. Den volgenden nagt moest hy drie of vier reifen braaken, doch dit toeval bedaarde; hy klaagde vervolgens over eene aanhoudende pyn in het oog geduurende veertien dagen.

Op den zesden dag na de operatie maakte 'ik het oog blood, om het zelve te bevryden van het scherpe slymerige vogt, welk zich 't meest
by

by deeze toevallen verzamelt, en om den toestand van den oog-appel te zien. Deeze was duister, maar niet zeer veel, en sterk verwyderd, als in de *mydriasis*, zynde buiten staat, om zich door de stralen van het licht samen te trekken.

Hy zag niet 't allerminste. Het oog werd verbonden, en behandeld als te vooren, nog drie dagen. Daarna werd een compres los voor de oogen gehangen met een groen doekje voor het voorhoofd, op dat het licht langzamerhand het netvlies en de zenuwen van den regenboog zoude kunnen aandoen, en maaken, dat de deelen zich samentrokken. In de derde week was alles even eens gesteld, behalven dat de pyn verminderde, of veranderde in eene ongemakelykheid, meest in de oogleden.

Het oog zag even eens uit, als in den helderen drop (*gutta serena*) of zwarten staar, met eene donker groene kleur in het glasagtige vogt. Hy keerde syn gezicht tegen eene sterke zonnen-schyn, zonder eenig licht of schynfel te zien, en zonder eene verandering in den regenboog. De slagader aan den slaap van het hoofd (*arteria temporalis*) werd geopend, en kort daarna eene ader op den voet, terwyl in tusschen, en na vereisch der zaaken, buikzuiverende middelen gegeven wierden.

In de vyfde week begon hy het daglicht te
on.

onderscheiden , en kort daar na fyne handen , enz.: de oogappel wierd van tyd tot tyd kleiner , en hy verliet het Hospitaal. Voor korten tyd ben ik door den Heelmeester STENMAN in eenen brief onderregt, dat ook deeze man de voorwerpen zien, en zonder hulp gaan kan, 't geen aangenaam was, en de verwagting na de operatie ver overtrof.

Men zoude nog drie voortgelyke gevallen van lyders , die in het Hospitaal van den staar geneezen zyn, kunnen bybrengen. Een oud man uit *Nya Kopparbergs Laen* ; een oude Schipper uit deeze Stad, en eene oude vrouw uit het Kerspel *Fasta* in *Roslagen* , welke na de operatie eenig, doch zwak, gezicht wederkreeg, uit hoofde van de genoemde omstandigheden.

9.

Een man van aanzien , uit de Yzer-gieterij *Loefsta* in Upland, vyf- en zestig jaaren oud, hebbende eenen staar, zederd drie jaaren, op beide oogen, kwam in 1758. in het Hospitaal, om syn gezicht weder te krygen. De staaren zagen 'er beeter uit, hadden eene ligt-geele kleur, stonden eenigzins rond naar vooren, en tamelyk ver af van de *uvea*. De regter staar had eene kleine streep, waar uit men ontdekte, dat dezelve vast zat aan een gedeelte van de *processus ciliares*, of dat eenig vat in het voorste gedeelte van het kasje van het crystallyn verstopt was.

Na dat het lighaam behoorlyk voorbereid was,
wierd

wierd eerst het linker oog geopereerd. Dit geschiedde schielijk en gelukkig; het crystallyn werd neêrgedrukt, het oog werd helder en hy zag myn aangezicht. Het crystallyn in het rechter oog werd even gemakkelyk neêrgedrukt; maar hetzelfde wilde niet blyven op de bestemde plaats: dit toonde duidelyk, dat het vast hong aan een' kleinen maar taayen draad, doch alzoo deeze van boven kwam, liet het crystallyn zich ook gemakkelyker boven dan onder het glasagtig lighaam brengen. Ik moest daar mede ophouden, en hetzelfde laten boven op het glasagtig lighaam, waar door de oogappel helder wierd. De oogen werden verbonden.

Den agtsten dag wierd het verband afgenomen. Het linker oog was gezond; in het rechter wierd gezien, hoe het crystallyn naar voren kwam, en dat hetzelfde schielijk zoude neêrzakken. Op den tienden dag, wanneer de lyder reedseenige dagen zeer goed had gezien, wierd het crystallyn in het rechter oog neêrgezakt gevonden, van de eene naar de andere zyde zich beweegende aan den beschreeven kleinen draad. Na verloop van eenige dagen begon dit hangende crystallyn kleiner te worden, zoo dat de lyder met dit oog de voorwerpen zag schuinseh en aan de zyden van den verminderenden staar. Ik wilde derhalven syne verandering afwagten, en niet op nieuw beproeven, om met de naalde den draad los te maaken, en den staar neêr te drukken.


In het begin van de derde week kreeg de lyder een ontflooken gezwelletje op het bovenste ooglid. Dit wierd verzorgd met de vereischte middelen, tot verettering gebragt, en schielyk geneezen, maar terwyl daar op een klein papje van saffraan gelegd wierd, bondt de zieke dit papje wat sterk tegen het oog, en had daar van het verlangde voordeel, dat op eenen nacht de draad afbrak, de staar neêrzakte, en zich zoo wel op den grond van de agterste kamer van het oog plaatste, dat men den volgenden morgen den oogappel zeer helder vondt, en geen het minste teken van het crystallyn of den staar zien kon.

Hy reisde naar huis, met een zoo volkomen gezicht, als hy anders na fyne jaaren kon hebben. Den 24. November laatstleden, bedankte hy my met eenen eigenhandigen brief, prees God, en wenschte het Hospitaal veel voorspoed.

Aanmerking.

Van een groot getal lyders, die den staar hadden, in het Hospitaal gekomen zyn, en de operatie ondergaan hebben, heb ik gevonden, gelyk dit ook van andere Schryvers aangetekend is, dat, wanneer de staaren veroorzaakt zyn door aanhoudende pynen en zinkingen op het hoofd (*Cephalæa Rheumatica*), als het aanzicht daar by was hoog-rood, met puisten bezet,

zet, meêr of min met de *gutta rosacea* aangedaan, de slagaderen aan de slaapen van het hoofd opgezeten waren, boven de huid uitpuilden, en duidelyk klopten, de lyders als dan ook na de operatie zwaarer toevallen gehad hebben, dan doorgaans gewoonlyk is, gelyk pyn in het hoofd en de oogen, eene opzwellling van de *adnata*, welke door inkervingen moest worden wechgenomen, eene traaning, en ontfteeking der binnenste vliesen, de *uvea* en *choroidea*; eene verzwearing binnen in het oog, een lang gemis van het gezicht, of verlooren hoop van hetzelfde weder te krygen, hoewel de staaren door de operatie schielyk en gelukkig waren neêrgedrukt.





X V I I.

*Hypopion.**Een Etter-oog.*

In- en uitwendige oorzaaken geeven daar toe aanleiding. De eerste zyn erger, en doorgaans ongeneeslyk met het verlies van het oog; de laatste zeer wisselvallig zoo voor het gezicht, als voor het oog.

I.

Een arme boer uit het Kerfspel *Ekeby* in *Roslagen*, zes- en veertig jaaren oud, kwam in 1751. in het Hospitaal. Hy was blind aan beide oogen: het linker oog was vol etter; het regter zwaar ontstooten, duister en byna met eene *chemosis* aangedaan. Dit ongemak was een gevolg van eene zwaare hoofdpyn, die vier jaaren lang geduurd, en zich meêr en meêr op de oogen bepaald had. Hy was kragteloos en altyd koortsig, zoo dat 'er weinig hoop was, om hem te helpen. Verkoelende, bloed- en buikzuiverende middelen, wierden, na vereisch der omstandigheden gebruikt. De koorts verminderde en hield op; een seton werd vervolgens in den nek gezet.

De vergaderde etter in het linker oog wierd ontlast door eene opening in het hoornvlies; het oog viel te samen, na dat de overige vogten wech geloopt waren. De etter in het rechter had zich, onaangezien de aflydende middelen naarstig gebruikt waren, na dat de lyder veertien dagen in het hospitaal geweest was, verzameld tot op de halve hoogte van den oogappel. Het oog was te veel ontstooten, om eene opening in het hoornvlies te maaken.

De *adnata*, welke, by synen aankomst, dik en rood was, wierd in den beginne wech genomen; doch, dewyl ook dit niet hielp, bleek het duidelyk, dat de ontsteeking haare voornaamste zitplaats had in de *choroidea*, *uvea* en *sclerotica*, en dat het oog te nauwernood zoude kunnen gered worden. Een mengfel uit *Ung. de tutia. unc. ℞. axungiae viperin. r. dr. j. pulv. camphoræ gr. ij.* wierd gegeven, om 's morgens en 's avonds gewreven te worden in de hoeken van het oog; daar over wierd gelegd een zakje met verdeelende hoofdkruiden (*species cephalicæ*). Hy verlangde naar huis, en reisde wech met eenen anderen boer uit het Kerfpel *Alunda*, die op beide oogen eenen staar gehad, doch door de operatie zyn gezicht wederom had gekreegen.

2.

Een arme Boer uit de Provincie *Jönköping* was van den staar geopereerd in het Hospitaal in

1755. Het linker oog was gelukkig geneezën; maar in het regter was de staar week, vast gegroeit, en ongemakkelyk neêr te drukken. Na verloop van zes dagen verzamelden zich de door de operatie verdeelde en neêrgedrukte deelen van den staar, even of sy niet waren aangeraakt, tot een blyk, dat het voorste gedeelte van het kasje van het crystallyn niet vernietigd was. Dewyl eene ontsteeking daar by kwam, wilde ik den tyd verkorten, en op den veertienden dag hem voor de tweede reis opeereen.

Zoodra de naalde kwam tegen het crystallyn, en de punt gekeerd wierd naar het voorste gedeelte van deszelfs kasje, wierd de staar gemakkelyk genoeg neêrgedrukt; maar een dikke bloed-rook klom op, welke met der haast beiden de holligheden van het oog vulde. De naalde wierd te rug gehaalt, en over het oog geslaagen een mengsel van twee oncen wyn-azyn en een once franschen brandewyn. Verscheide verdeelende middelen wierden te vergeefs gebruikt; daar kwam by eene ontsteeking, en na verloop van veertien dagen eene verettering. De etter wierd ontlast, doch het oog viel te samen en genas. Indien het bloed aanstonds door eene opening in het hoorn-vlies ontlast was, zoude het oog hebben kunnen behouden worden.

3.

Een afgedankte floeproeijs, zeven- en veertig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1758. Eene maand te vooren was een scherp lighaam in het linker oog gevallen, midden op den oogappel. Syn geheele oog was nu in volle zweering, zoo dat de oogbol zelve eens zoo groot was, dan de gezonde; het doorschynende hoornvlies pilde als een blaas vol etter voor uit.


Na eene toebereiding en weekmaaking van het oog door middel van kruim van tarwen brood met saffraan en melk, wierd de onderste halffrondte van het hoornvlies geopend: twee of drie droppelen etter kwamen te voorschyn, waar door het oog niet het allermiste slonk, een goud lepeltje wierd door den oogappel tegen het crystallyn en glasagtig lighaam aangebragt met hoop, om de etter ontlasting te bezorgen, maar 'er wierd geen etter gevonden. De genoemde pap wierd vermengt met de *mucil. sem. cydon.* en kampher geduurende drie weeken: het oog bleef in denzelfden toestand, zonder zweering.

Ik vreesde, dat het oog kankeragtig zoude worden. De opening in het hoornvlies was gesloten; de pyn door de prikkeling van het vreemde lighaam had in dit geval niet verwekt



eenige verzwearing, maar alleenlyk eene zwelling van alle de vlieden van het oog; ik dagt daarna, dat het geheele oog moest geopend worden, en dat men de lugt moest laten in-komen, om de verzwearing te bevorderen.

Het oog wierd kruiswyze geopend met een steeviger lancet; het crystallyn en glasagtig lig-haam liepen wech, de pap wierd verder aange-legd; het oog was in de volgende dagen voor de helft samen gevallen, en tot eene goede ver-ettering gekomen. De verzwearing wierd ver-bonden met *bals. Fioraventi, vitell. ovi en mel ro-sarum*. De pyn ging wech, en de verzwearing wierd geneezen in twaalf dagen.





X V I I I.

Hæmalops.

Een bloed-oog.

Het geval, in het tweede nommer van het voorgaande artykel, was een bloed-oog, van eene uitwendige oorzaak ontstaan, en van een kwaad gevolg. Daarentegen heb ik na de operatie van den staar; wanneer die door andere, of door my zelve, verrigt was, verscheide reifen bloed in het oog uitgestort gezien zonder zwaare gevolgen. Een eenig geval kan genoegzaam toonen, hoe het daar mede gaat.

Eene boeren-meid uit het Kerspel *Munktorp* in *Westmanland*, vier- en twintig jaaren oud, gezond en bloedryk, had een' staar op beide oogen, en kwam in 1756. in het Hospitaal. Na eene voorafgaande bereiding en aderlating wierd de operatie verrigt.

Het regter oog wierd 't eerst onder handen genomen: de naalde wierd op de gewoone wyze ingebracht; zoodra dezelve tot aan het crystallyn kwam, klom aanstonds een dikke bloed-rook op, even gelyk men het bloed ziet komen uit



eene ader, wanneer het deel in het water gehouden word: in de grootste haast, en terwyl het crystallyn nog kon gezien worden, gelukte het, dat hetzelfde met de naalde gevat, en zonder hinder neêrgedrukt wierd tot onder het glasagtig lighaam. Aanstonds wierd de naalde uitgehaald, wanneer het bloed reeds voor de helft de voorste kamer van het oog vulde; het oog wierd verbonden met compressen, gedoopt in twee deelen lauw water, en wyn-azyn benevens fransche brandewyn van elk een deel, 't geen om het andere uur veranderd wierd. Het andere oog wierd onaangeroert gelaaten tot op eenen anderen dag. Den volgenden dag wierd het ooglid opgeligt, om te zien, hoe het oog ware; het bloed was wech en het oog helder, maar een weinig ontflooken in de *adnata* rondom de opening.

Na verloop van agt dagen wierd het linker oog geopereerd; een voortgelyke bloed-rook vertoonde zich, en belette, dat de staar behoorlyk kon neêrgedrukt worden; in hoope, dat het even eens gaan zoude met het verdeelen van het bloed, gelyk by het regter oog, wierd hetzelfde verbonden met denzelfden omslag en op dezelfde wyze.

Den volgenden dag wilde ik wederom den toestand onderzoeken, en opende het ooglid. De *adnata* was nog ontflooken, de helft van de voorste kamer gevuld met bloed, welk

welk pyn veroorzaakte. Gelyke deelen Franschen wyn en water wierden tusschen het ooglid gedaan. Eene Aderlating op den arm, eene strenge levensregeling, en verkoelende amandelmelken wierden tot hulp genomen. Veertien dagen gingen voorby zonder verligting; de roodheid van het oog verdween eindelyk, maar het bloed lag op den grond van de voorste kamer onverdeeld; het crystallyn of de staar zat nog in syn kasje, maar verdeelt in twee deelen.

In de vierde week begon het bloed wit te worden, als etter, hetzelfde werd dunner en verdeeld. Sy zag zeer wel uit het regter oog, en dewyl ik voorzeker geloofde, dat de *Choroidea* en *uvea* hadden ongewoone bloedvaten op de plaats, alwaar de naalde moest ingebracht worden, dewyl deeze bloedstortingen zonder het minste geweld of beproeving waren ontstaan, raadde ik haar vergenoegt te zyn met het gezicht uit een oog, en naar huis te keeren.



X I X.

*Polypus Narium.**Een vleesch-gewas in den neus.*

I.

Een jong student uit *Gottland* zocht hulp tegen een' *Polypus* in beide de neusgaaten, en kwam alhier in 1755. De benedenste deelen van de neusbeentjes, en de neusvleugels waren sterk uitgezet. De neusgaten waren volkomen geslooten, en door dezelve kon geen lugt noch naar vooren noch naar agteren gaan. Eene langduurige hoofdpyn, die als nog aanhield, had deeze uitwassen veroorzaakt; derzelver buitenste deelen waren vliefig, en met slym opgevuld; de agterste deelen waren integendeel vleeschagtig, vast, en dezelve scheenen verscheide vereenigingen met het snotvlies op het *os spongiosum inferius*, de *laminæ ethmoidales* en *vomer*, te hebben.

Eene aderlating wierd agt dagen voor de operatie in het werk gesteld, en in deeze dagen eene buikzuivering, benevens eene verkoelende levensregeling, gebruikt.

De

De regte polypus-tang wierd horizontaal tegen het vleeschgewas in het linker neus-gat gebragt; na dat het voorste gedeelte daar van gevat, vastgedrukt, en omgedraaid was, viel het vleeschgewas in een, en gaf een weinig slymerig water van zich: de overgebleeve vliefen wierden voorzigtig met de tang uitgedraaid, te voorschyn gebragt, en afgebonden, waar door een vast gedeelte ter lengtte van eenen halven duim wech genomen wierd.

Het neusgat was nog even eens gevult; het lighaam of de buik van het vleeschgewas was nog niet aangeraakt; met de tang kon het niet gevat worden; ik beproefde derhalven, dan met eene borst-fonde, dan met andere bekwaame werktuigen, om deszelfs vasthegtingen tusschen het bovengenoemde been los te maaken. Dit lukte eindelyk na dikwils herhaalde pogingen, zoo dat de lyder ten laatsten met eene groote quantiteit bloed, door den neus en mond, het geheele gewas met stukken kwyt raakte. Het werk moest dikwils gestaakt worden, om het bloed te stuiten, 't geen geschiede met het inspuiten van warmen wyn-azyn.

Het regter neusgat kon in agt dagen niet aangeroert worden: de operatie trof aldaar dezelfde moeyelykheden aan, maar wierd eindelyk met soortgelyke middelen volbragt. Aluin-water en roosen-honig wierden gebruikt, om daar mede met penseelen de rauwe deelen in den neus

aan

aan te raaken: de lugt kon gemakkelyk door beide neusgaten gehaald worden; de lyder was voor het overige gezond en vergenoegd, maar kon voor fyne terug reise de hoofdpyn niet overwinnen.

Na verloop van anderhalf jaar, in het begin namentlyk van het jaar 1757, kwam hy wederom hier in Stokholm: het linker neusgat was volkomen vry en ledig; maar het regter eens geflooten door een *sarcoma polyposum*, als by de eerste operatie. Hy wilde graag nog eens ondergaan de moeyelyke behandeling, om daar van volkomen bevryd te worden.

Na eene voorbereiding van agt dagen wierd met de tang een dik en vleeschig stuk ter breedte van een' duim wechgenomen. Het overige was niet aan te raaken, en wilde niet volgen. Wederom wierd de borst-fonde met andere instrumenten gebruikt om hetzelfde los te maaken. Ik bemerkte welhaast, dat het been aangedaan en los was, en dat hetzelfde moest wechgenomen worden. Zoo dra de bloedstorting ophield, wierd een zilver pypje in den neus gebragt tegen de vasthegting van het vleeschgewas, en door hetzelfde eene sonde met fein plukzel aan het bovenste gedeelte, gedoopt in *butyrum Antimonii*. Dit geschiede twee of drie reifen, terwyl het pypje tegen verscheide plaatsen gebragt wierd. De lyder klaagde ongemeen sterk daar over. Naderhand wierd 'er warme melk

melk met roosen-water en *mucilago seminum lini* ingespooten. In de volgende dagen vielen de rooven af; het *os spongiosum superius* en andere beenfchilfers vielen wech.

Veertien dagen verlopen zynde, was de hoofdpyn verminderd; de ontlasting uit den neus gestuit, de neus zelve zuiver, en de lyder gereed, om naar huis te reifen.

2.

Een jong meisje uit *Roslagen* kwam in 1755. in het Hospitaal; fy had foortgelyke vleeschgewaffen in beide neusgaten; als in het voorgaande geval beschreeven zyn. Behalven de zwelling der neusbeentjes, en van het kraakbeenig gedeelte van den neus, waren de *canales nasales* in dit geval verftopt; zoo dat de traanzakken door de traanstippen met den vinger konden uitgedrukt worden. De neus was niet geheel en al geslooten; het voorste gedeelte van den linker *polypus* was zoo groot als een castanie; de regter een weinig minder. Beide hadden fy eene vleesch-kleur en waren vast, derzelver dikte belette my met zekerheid te konnen bepaalen derzelver vasthegting; maar uit hoofde van de toefluiting der *canales nasales*, geloofde ik, dat fy voornamentlyk hunnen oorsprong namen van het *os spongiosum inferius*, het middenshot der neus en het verhemelte.

Sy konden van weegen hunne dikte niet gevat worden met de tang; en wierden derhalven met groote haakjes, welke men by het ontleden gebruikt, naar vooren gehaalt; met een ligatuur verder te voorschyn gebragt, en eindelyk met eene regte tang uitgedraaid. De bloedstorting was sterk en wierd gestuit met warmen azyn. Het vleeschgewas in het linker neusgat was afgedraaid niet ver van syne vasthegting; van daar gebeurde het, dat hetzelfde binnen agt dagen oogenschynelyk opgroeide. Door een pypje van geel koper wierd, twee of drie maalen, het *butyrum antimonii* daar opgebracht; groote stukken van het slymvlies wierden van het vleeschgewas afgebeeten, en eindelyk viel een gedeelte van het *os spongiosum inferius* wech. Aluin-water met roosen-honig wierden gebruikt om de wonde te geneezen; de uitzetting der traan-zakken (*hernie lacrymales*) verdween, en de traanen kreegen den natuurlyken loop weder.

Zouden zoodanige harde en vleeschige *polypi* niet altyd hebben eene beenbederving tot oorsprong? dewyl deeze en veele bekende handelwyzen nooit afgeloopen zyn met eene bestendige genezing, dan wanneer het been te vooren afgeschilferd was; daar in tegendeel de *polypi membranaceo-pituitosi* noch by de uittrekking bloeden, noch naderhand zoo gemakkelyk wederom aangroeijen.

3.

Eene meid uit Oost-Gotland, zes en twintig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in den zomer van 1758. De neus was zeer sterk gezwollen, gevuld met polypeuse gewassen, ligt-geel van kleur, en vast op het aanraaken. Derzelver onderste deelen waren zoo groot en rond, dat de tang niet voorby dezelve kon gebragt worden; ik moest derhalven met haaken en een ligatuur dezelve uittrekken, zoo dat de tang plaats kreeg, en kon vatten: met de noodige draajingen, en nieuwe ligatuuren, wierd een zeer groot vleesch-gewas te voorschyn gebragt, eerst uit het linker neusgat, vervolgens een ander op dezelfde wyze uit het regter. Geen droppel bloed vertoonde zich. De neusgaten zakten in tot de natuurlyke wytte, en bleeven ledig. De neus wierd bestreken met rooden Franschen wyn en een poeder van Myrrhe. Na veertien dagen verliet sy het Hospitaal volkomen gezond, en trok wech.

Aanmerking.

De *Polypi* kunnen dus gebragt worden tot de drie volgende hoofd-soorten. 1. *Carnei* of de waare *Sarcomata*. Deeze kunnen zyn van beter of slegter aart, met of zonder beenbederving; het snot-vlies word dan veranderd in een spons- of vleeschagtig wezen, welk vervolgens opgroeid, en de neusgaten sluit. 2. *Membranacei*; wanneer het genoemde klieragtige vlies, welk
den



den neus, en de beenderen van het verhemelte inwendig bekleed, door opgehoopte slym zwelt, in dikte toeneemt, naar agteren tot in de keel, en naar vooren tot buiten de neusgaten tot eene ongelyke gedaante, vastheid en grootte, uitgezet word. 3: *Humorales* of *serosi*, gelyk de laatst aangehaalde. Deeze spruiten voort van stilstaand en opgehoopt *serum*, in de holligheden en *cellulae* der beenderen, die zich in de neus openen, en welk altyd van het bloed word afgezonderd: sy neemen vervolgens in grootte toe door de aankleaving der *pituita serosa*, welke tegen gewoonte in groote quantiteit te voorschyn komt 'op de plaatsfen, die door deeze vreemde lighamen gedrukt en geprikkeld worden. Ik geloof niet, dat eenig bloedvat voedzel aan dezelve ver-schaft, dewyl, by het uitdraaijen uit den neus, geen enkele droppel bloed zich ver-toont; daar in tegendeel de twee eerste zoo sterk bloeden, dat men op eene reis de operatie niet wel kan volbrengen. In kleur en vastigheid komen sy volkomen overeen met de slymproppen, die in het hart gevonden worden, en het schynt, dat, gelyk de slymproppen van het hart rondom de *trabes ventriculorum* geslingerd zyn, zoo ook deeze los hangen tusschen de *ossa anfractuosa na-rum* en in derzelve holligheden.



X X.

Uvula relaxata.

Eene verlenging van het lelletje in de Keel.

Het lelletje word in het algemeen gezegt verlengd te zyn; 1. wanneer hetzelve alleen, of met de amandelen en keel te samen ontstookken, droog word, in grootte toeneemt, neêrhangt op den wortel van de tong tot in de keel, en aldaar ongemak veroorzaakt. 2. Als hetzelve na verscheide kwaalyk verdeelde ontfteekingen, droog, dik en langer word, rood blyft, geduurig prikkeld, om te slikken, en dit te gelyk verhinderd. 3. Indien dit deel door eene aanhoudende inademing van koude lugt, op lange winter-reisen, te gelyk met het weeke verhemelte verkoud en verslapt word. 4. Als het na langduurige koude zinkingen in den mond en keel insgelyks de afgescheide slym aanneemt, en daar door verslapt, ja dikwils driemaal grooter word.

De twee eerste gevallen laten zich door verwarmende, verdeelende, versterkende en samen-trekkende middelen geneezen; maar de twee

H

laat-



laatste zeer bezwaarlyk, zonder een gedeelte van het lelletje af te snyden.

I.


In 1754. deed zich een Burger op uit de stad *Uleo*, met dit ongemak. Zederd drie jaaren had het lelletje by hem in de keel gehangen, en groot ongemak veroorzaakt. 's Zomers was dit ongemak hem dragelyker geweest, dan 's winters. Allerhande middelen waren vrugtelooſ gebruikt. Het lelletje was nu nog dik, bleekrood, en eens zoo lang, dan het behoorde te zyn. Hy was te vreedden, hetzelve te laten afknippen. De man werd gezet op een ſtoel tegen over den dag; een helper hield den mond open, en drukte de tong neder met een ſpatel. Het lelletje wierd van agteren gevat met een haakje, en te gelyk met eene regte ſchaar midden door geſneeden. Een of twee droppelen bloed kwamen te voorchyn, de keel wierd dikwils geſpoelt met *oxymel ſimplex*; hy genas na drie of vier dagen, en bleef in het vervolg van dit ongemak bevryd.

2.

De Kamerdienaar van een voornaam Heer had in 1754. hetzelfde ongemak. Hy kon niet beſluiten, om het lelletje te laten afknippen, en daarom moeſten eerſt allerhande middelen beproefd worden, als ſpaanſche vliegpleiſters

pleisters op de schouders, samentrekkende gorgeldranken; het sap van de vrugten van de sleedoorn, en de vrugten van de *berberis*, zelfs wierd de *lapis infernalis* eenige reizen daar tegen gehouden, zoo egter, dat het deel daarna met water wederom wierd afgespoelt; doch alles was vrugteloos. Dit kon ook niets baaten, om dat het lelietje driemaal zoo lang, als natuurlyk, bloed en gevoelloos, zonder prikkelbaarheid, was. Na dat hy zich lang bedagt had, wierden twee derde deelen met eene schar afgeknipt, 't geen gemakkelyk in het werk gesteld wierd, zonder dat men eenen dropel bloed zag. De lyder gebruikte, om te gorgelen, *oxymel simplex* met den *Syrupus berberum*; en daar mede was dit langduurig ongemak volkomen geneezen.





X X I.

Caries maxillæ inferioris.

Eene Beenbederving in de onderste Kaak.

De fcherpe vogten in ons lighaam, welke heete zinkingen en ophoopingten van bloed in het een of ander deel verwekken, krygen dikwils binnen korten tyd eene onbegrypelyke invreetende kragt, zoo dat fy, voornamentlyk als men dezelve met prikkelende middelen naar de eene of andere plaats trekt, fchietlyk, als het fterkfte brandmiddel (*causticum potentiale*), aantasten en vernietigen zoo wel de weeke als de vaste deelen. De volgende voorbeelden konnen daar van ten bewyze verftrekken.

I.

Van Joh. Gustaf. Acrel.

In 1753. kwam in het Hofpitaal een Broekenmaakers Knecht. De onderste kaak was aan de regter zyde tot op het midden los van het overige gedeelte; de tanden lagen fchuins naar vooren en over elkander. Eene fphaceleufe ftoffe en ftank kwam uit het gebrek. Hy was drie dagen zeer zwaar met tandpyn geplaagt geweest, wel-

welke hy met *oleum destillatum juniperi* had willen stillen, maar tot syn ongeluk wierd hy gestort in den kwaaden toestand, waar in hy zich nu bevondt. De mond wierd gespoelt met het volgende middel. *R. Infusi Fol. salviae aquosi unc. viij., vini rub. Gall. unc. ij. Tinct. Myrrhæ dr. ij.* Buiten op de kaak wierden gelegd zakjes met ontbindende aromatieke kruiden, gekookt in wyn en azyn.

Na drie dagen, of na zes, na het begin der ziekte, wierden zes losse tanden wechgenomen, en iets meêr, dan het middenste gedeelte van de kaak, welk los was van alle deelen, waar mede het anders vereenigt is; de wonde wierd verbonden met rooden Franschen wyn en roosfen-honig, tot gelyke deelen, door eene zagte kooking tot de dikte van eene zalf gebragt. De geneezing volgde spoedig, want na drie weeken was de holligheid in de kaak gevuld met vleesch, en toegelooopen, zoo dat hy het Hospitaal verliet.

2.

Van Joh. Gustaf. Acrel.

Een Student kreeg in 1756. tandpyn in twee der onderste kiezen aan de regter zyde; raad gevraagd hebbende, leide hy daar over een lapje, gedoopt in brandewyn met gember. De pyn wierd daar van zwaarer; maar in hoop van eenen goeden uitslag was hy ongemeen geduldig. Vier en twintig uren verliepen, en hy

bemerkte wezenlyk verzagting, maar te gelyk eene zwaarte, en doofheid in de kaak, onder de pynelyke kiezen; vier derzelven waren los, welke ik met een klein tangetje uittrok, bemerkende te gelyk, dat derzelver wortels waggelden in de kasjes, en naar binnen en buiten met een gedeelte van de kaak bewoogen wierden. De tanden wechgenomen zynde, wierd de bloote kaak duidelyk gezien. Het tandvleesch wierd geopend, en een gedeelte met vier kasjes, en de helft van de breedte der kaak opgeligt en wechgenomen. Vervolgens wierd de wonde geneezen in korten tyd met dezelfde middelen, die in het voorgaande geval aangehaald zyn.

3.

Van Christ. J. Ramström.

Een arm Student, uit het Landschap *Ooftgöta*, vyf en twintig jaaren oud, kwam in 1758. in het Hospitaal. De onderste kaak was aan de regter zyde in het midden gezwollen tot de grootte van een' middelmaatigen Renet-appel; grootendeels buiten uit de kaak, voor het overige binnen in den mond; de tanden waren los en waggelden. Voor twee jaaren had eene zware tandpyn deeze zwelling in de kaak nagelaaten. Vervolgens had dezelve zich eenige reifen tot eene verzwearing gezet, maar was nooit volkomen daar toe gekomen. De zwelling was nu zoo hard, als been, en bestondt waarlyk uit het buitenste deel van de

de kaak, waar tegen het binnenste uitmaakte een kleiner halfmond onder de tong. Het bovenste deel, welk kwam tot aan de kasjes der tanden, was ook in de rondte hooger, en bedekt met het klieragtig vlies van den mond en het tandvleesch. Het ongemak was dus een winddoorn, waar van de oorzaak onbekend, en de geneezing moeyelyk was. De lyder voorbereid zynde, wierden eerst alle losse tanden wechgenomen, boven het gezwel; vervolgens wierd het gezwel van de tandkasjes doorgesneeden of doorgebrooken, gelyk ook het tandvleesch los gemaakt wierd. De holligheid van het gezwel was evenredig aan de grootte, en bevatte een bruin stinkend vogt. Gloeyende yzers wierden op alle kanten binnen in dit gezwel gezet; en de holligheid met droog plukfel gevuld. Dit plukfel wierd den vierden dag daar uit gehaald; en nieuw, bevochtigd met *Balsam. Fioraventi unc. ij. Tinct. Aloës unc. ß.*, daar in gebragt. Op den negenden dag wierden de brandyzers wederom gebruikt, de holligheid met plukfel gevult, en op dezelfde wyze verbonden. Groote beenschilfers gingen los, en wierden vooral uit den grond en van den binnenkant genomen: de buitenste beenlaag was met opgewasschen vleesch bezet, welk by het branden afviel, en kleine beenschilfers met zich nam; maar het vleesch groeide schielyk wederom aan, en vereenigde zich met het overige vleesch, dat van alle zyden opkwam. Het gezwel was tot $\frac{3}{4}$ deelen verminderd en geneezen, wanneer hy, na zes weeken, het Hospitaal verliet.



X X I I.

Caries maxillæ superioris.

Eene beenbederving in de bovenste kaak.

Eene vrouw, in Stockholm woonende, zes en veertig jaaren oud, gewoon aan sterken arbeid, kwam in 1757. in het Hospitaal. De regter kaak was rood, hard, gezwollen, het ooglid *œdemateus* en geslooten. Een scherp stinkend vogt liep uit het regter neusgat; drie kiezen waren los; het tandvleesch was week en sponsagtig; de regter zyde van het verhemelte rood en ontstooken.

Na tandpyn, die niet geacht was, had dit ongemak, in eenige maanden, zoodanig toegenomen; eene ondragelyke hoofdpyn, en onvermogen om eenig vast voedsel te kauwen, dewyl haar dagt, dat de bovenste kaak daar by als waggelde, noodzaakten haar eindelyk hulp te zoeken. Alle omstandigheden toonden eene beenbederving in de bovenste kaak en derzelver holligheid, welke moeyelyk te geneezen zoude zyn.

Eerst wierden de drie losse kiezen wechgenomen;


men; 2. wierd een sonde door een der kasjes van deeze kiezen in de holligheid van de bovenkaak gebragt, terwyl een ander geboogen en door den neus in het *antrum Higmori* gebragt wierd: de weg was niet moeyelyk te vinden, dewyl de beenbederving aanmerkelyke stukken van de bovenkaak binnen den neus verteert had, welke reeds waren wechgevallen. De sonden wierden in de meergemelde holligheid bewoogen en weder uitgetrokken. 3. Spoot men dikwils in den neus een afkookfel van de *rad. Herb. Brit. unc. ij. Fol. salviae unc. j. cum aq. calcis prim. lib. iij. Spir. vin. Gall. unc. iij. mellis rosar. unc. iij. Tinct. aloës unc. ss.* 4. wierd een gloeyend, dun, brandyzer door de opene kasjes der kiezen in de holligheid gebragt; 't geen moeyelyk voor my en pynelyk voor de lydereffe was, waarom het niet meêr, dan tweemaal, kon geschieden. Vervolgens wierd door denzelfden weg gespootten *ol. vitrioli dr. j. Spir. vini Gallici unc. iv. Saponis liquidi unc. j.*; dit verwekte niet minder pyn, maar nam allen stank en verrotting wech, zoo uit den neus als mond. Na de inspuitingen moest de mond aanstonds worden uitgespoelt met koud water, dat uitgespoogen wierd. Sy had intusschen de anderendaagsche koorts, die door den koorts-bast gestuit wierd.

Agt weeken waren verlopen zederd het begin, wanneer het gedeelte van de bovenste kaak, welk het verhemelte maakt, zich geheel los vertoonde, en door eene insnyding wech



genomen wierd. Het gedeelte, dat de kasjes maakt, en tot aan de holligheid komt, wierd ook los en wech genomen, behalven veele dunne en half verrotte beenschilfers. Het onderste sponsagtig beentje en het halve middenschot van den neus (*vomer*) waren reeds voor eenigen tyd uitgevallen.

De afschilfering wierd bevorderd eerst met de *Solutio mercurii sublimati corrosivi spirituosæ* van den Hr. VAN SWIETEN, drie weeken lang, doch zonder vrugt, vervolgens met de *Panacea Mercurii* van Lemery, in kleine giften gegeven. In de veertiende week was de roodheid en stank wech genomen, de afschilfering wierd verder volbragt, de *sinus maxillaris* vergroeide en de wonde genas, zoo dat sy frisch en vergenoegd uit het Hospitaal ging.



X X I I I.

Calculus in ductu Salivali Warthoniano.

Een steen in een der kwyl-buizen onder de tong.

I.

Eene dienstmeid uit Upland, dertig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1756. Sy had een gezwel onder de tong aan de linker zyde, zoo groot, als eene muscaat-noot, waar van sy verlangde bevryd te zyn.

Langzamerhand was hetzelfde grooter geworden, en begon nu te verhinderen de beweeging van de tong; het was van dezelfde kleur met de overige huid in den mond, glad en hard, maar niet als een knoestgezwel. Ik zag het aan of voor een verhard kikvorsch-gezwel, ontstaan door eene verstopping in de kwyl-buizen, of voor eene opzetting van de onderkaaks-klier, terwijl de diepe legging tusschen de *musculus pterygoideus inferior*, en *hyoglossus* daar toe aanleiding gaf. Van welken aart het gezwel ook ware, moest het wechgenomen worden. Met een bekwaam haakje wierd hetzelfde gevat, terwijl ik met een *bistourie* aan beide zyden



den de verharding los maakte, dezelve opligte, en wech nam.

Onder de operatie wierd reeds bemerkt, wat daar onder verborgen lag, want de steen stootte tegen den punt van het lancet in den grond van het gezwel; de wonde gaf veel bloed, maar de *arteria ranina* was niet gekwetst. De bloedstorting wierd gestilt met overgehaalden azyn en plukfel; en de wonde geneezen met rooden Franschen wyn en roosen-honig, tot de dikte van eene zalf uitgewaassemt. De steen had de gedaante van eenen grooten steen uit eene olyf, eene ligt-geele kleur, en was uit korrels samen gesteld.

2.

In den voorigen zomer vertoonde zich ook in het Hospitaal een jonge knecht, met een gezwel onder de tong en begeerde hulp. Hier wierd de steen gezien door de huid in de gemelde kwyl-buis, en was gemakkelyk te krygen. Na dat hy te weeten was gekomen, wat het ongemak was, en men hem vryheid had gegeven, om den volgenden dag weder te komen, ten einde denzelven kwyt te raaken, was hy te vreedden, en heeft waarschynelyk door een' anderen, den steen laten wech neemen.

Aanmerking.

Ik heb eenige reisen gezien uitwassen van
het

het been, komende van den binnenkant van de onderkaak, welke op het eerste aanzien volkomen gelyk waren aan deeze steenen in de kwylbuis. Sy zyn mede ter waereld gebragt, als speelingen en veranderingen in den gewoonen aanwas van het been, zonder ander ongemak, dan dat derzelver bovenste of hoogste gedeelte ligtelyk bloot en open wierd by zinkingen, en scherpte, uit de maag en keel opkomende, en dan hebben sy eerst ongemak veroorzaakt, wordende wederom schielyk door het vlies van den mond bedekt, zoo dra de genoemde toevallen ophielden. Sy worden onderscheiden van de steenen. 1. Door hunne hardheid, wykende niets, als men daar op drukt. 2. Door de uitwendige kleur, welke wit en even als het tandvleesch is. 3. Door eene naalde, welke men daar in steekt, en die duidelyk te kennen geeft, of de zwelling eenen steen of een beenagtig uitwas bevat.



*****:*****

X X I V.

Glandula Parotis scirrhusa.

Eene knoefstagtige zwelling van de oorklier.

Een jongen van vyftien jaaren uit *Ekholm-*
sund in *Westmanland* kwam in 1754. in het
Hospitaal. Hy had een hard en knobbelagtig
gezwel, als de vuist van een volwassen mensch,
onder het regter oor, welk zich tot op de
kaak uitstrekke, en van onderen tot voorby den
hoek van de onderste kaak kwam. Het gezwel
was byna onbeweegelyk, doch gaf mede by
het openen van den mond, tot een bewys, dat
het geene vereeniging had met de geleiding.

Dewyl nu het gezwel voor een goed derde
gedeelte der grootte tusschen de hals-spiere
op de dwarsche uitsteekfels van de werve-
len van den hals, en agter op den hoek van de
onderste kaak lag, konnende noch opgeligt
noch bewoogen worden, zoo was het te vree-
zen, dat de opklimmende tak van de uitwen-
dige krop-slag-ader, by het uitpellen van het
gezwel, zoude geopend worden.

De Operatie wierd ondernomen. De uit-
wendige huid wierd kruiswyze open gemaakt.
Het


Het gezwel had, behalven de vliezen van het celagtig weeffel, geen en zak: eene kromme naalde, met een' zesdubbelen gewaschten draad, wierd van boven naar beneden door het gezwel gestookt; hier mede wierd hetzelfde opgeligt; terwyl de uitpelling voortgezet wierd. Op het einde wierd de slagader gekwetst, welke, gelyk gewoonlyk is by soortgelyke gezwellen, drie-maal zoo wyd was geworden: sy gaf in twee of drie minuten meêr dan een halve stoop bloed.

De onderschepping was alhier uit hoofde van de diepe legging der slag-ader onmogelyk; de bloedstempende en een' korst maakende brandmiddelen waren, van wegens het groot getal der zenuwen, gevaarlyk; en de andere bloedstempende middelen, gelyk de ondervinding, leert, minder te vertrouwen. Men koos derhalven bereide spons uit, welke by stukken in de holligheid gebragt, en tegen het bloedvat aangelegd wierd, terwyl over en rondom dezelve plukzel gelegd, en alles met een' vasten zwagtel voorzien wierd; de bloedstorting hield op. Den agtsten dag wierden de sponzen wechgenomen; de verzwearing wierd volgens gewoonte bevorderd, en de geneezing volgde in zeven weken.

2.

Eene vrouw uit *Södermanland*, vier- en veertig jaaren oud, en eene Meid uit *Nerike* van drie-
en

en twintig jaaren, zyn in 1756 en 1757. van voortgelyke gezwollen in het Hospitaal geopereerd; derzelver zitplaats en overige omstandigheden komen zoo na over een met de boven beschreeven, dat weinig anders daar van kan gezegd worden. De Operatie is ook op dezelfde wyze verrigt, en met een goed gevolg ten einde gebragt. Het binnenste der uitgelopen gezwollen was onderscheiden, doch daar van zal ik op het einde van deeze waarneemingen iets meêr zeggen.





Al't geen kundige Geneesheeren hier tegen tot verzagting konden voorschryven, wierd zorgvuldig aangewend, doch zonder nut. Dewyl derhalven geene verdeeling kon te weeg gebragt worden, was het billyk, eene verettering te zoeken; en tot dit einde wierd een warme uie op het oor gelegd. Derzelver verwarmende en rypmakende kragt deed eene goede werking, en veroorzaakte eene verettering door den gehoorweg. Eenige, doch geene byzondere, verligting ten opzigte van de pyn wierd hier af bespeurt; doch, door middel van de ontlasting, welke men door de aangedaane deelen zocht te verkrygen en ook te weeg bragt, ontging de lyder, waarschynelyk, het gevaar van den dood deeze reis. De pyn bleef bestendig, doch niet altyd even zwaar.

Na ruim eene maand kreeg de lyder daar by draaijingen in het hoofd, zoo dat hy, zonder hulp, niet kon staan op de beenen, ja nauwelijks op de knien in het bed, zonder dat hem de draaijng scheen te willen doen vallen, wanneer hy dagt, dat het bed omgekeerd, en op en neder gedraaid wierd. De koorts, welke in den beginne aanmerkelyk was, had nu opgehouden na de gebruikte middelen, en na dat de verzwearing te weeg gebragt was. Maar de verwisselende hevigheid van de pyn en de slaapeloosheid, wekten de koortslige beweegingen dikwils op. Deeze schikten zich tot tusschenpoozing,

zing , wanneer de koorts-baſt , deels om de-
zelve te ſtuiten , deels ook uit hoofde van
de overhand neemende kragteloosheid , gebruikt
wierd.

Uitwendig wierd het oor en ſlaap-been tot
op de helft van het hoofd geſmeerd met eene
zalf uit *Balf. de Mecca. dr. j. ol. amygd. dulc. unc.
j. ung. alth. rec. unc. iij.* , welke in den beginne
eenige ruſt verſchafte , die egter niet beſten-
dig was. Uit het oor liep eene geele , dunne , en
zuur riekende etter. Om de verettering te onder-
houden en de ſtoffe te verbeteren wierd over de
gemelde zalf gelegd een pap met ſaffraan , welke al-
le vier uren wierd ververſcht ; de gehoorweg
wierd uitgeſpoelt dan met melk en rooſen-water ,
dan met *hydromel*.

Zeven weken waren zederd het begin verlooo-
pen , voor dat men eenige verandering ten goe-
den bemerkte. Doch toen namen de toevallen lang-
zamerhand af , en tegen de negende week kon
de lyder zich opregten , en ſtaan op ſyne beven-
de beenen. De uitwendige bekleetſelen over
het *pars petroſa offis temporis* en agter het oor wa-
ren eenigzins gespannen en ſtyf , maar niet ge-
zwollen. De gehoorweg gaf nog eene ſtinkende
en ſcherpe etter , welke uitgeſpoelt wierd met
gelyke deelen lauwen wyn en water , en eenige
droppelen *Tinct. Myrrhæ* met honig.

In de vierde maand was het ongemak zoo
veel



veel verbeterd , dat de zorg alleenlyk bestondt in het zuiveren van het oor. Dit geschiede door middel van inspuitingen en smeeringen met een penfeel, waar by het oogmerk was, om niet te verminderen de ontlasting met samen-trekkende en opdroogende middelen; het oor begon eindelyk te bloeden, 't welk van zelve ophield en wederkwam, dan meêr dan minder. Wanneer ik, ter onderzoekinge van de oorzaak deezer bloedstorting, den gehoor - weg bezag en onderzocht, scheen dezelve voor de helft gevuld te zyn met los sponsagtig vleesch. De sonde tegen en in dit vleesch gebragt zynde, wierd wel haast een vreemd en ongelyk been ontdekt.

De gehoorweg wierd verwyderd, zoo dat het losse vleesch uit den weg wierd gedrukt, wanneer het been den volgenden dag gezien wierd. Met een haakje en bekwaame tang wierd het beentje wechgenomen; het had eenen kwaaden reuk, was van eene ongelyke vierkan-te gedaante, zoo groot, als het einde van een' vinger, celagtig, en afgescheiden van de voor-ste zyde om de *apophysis mastoidea*. De kwaade reuk en bloeding verminderden dagelyks, alleenlyk was het oor een weinig vogtiger, meêr tot voor dan nadeel.



*****:*****

X X V I.

*Vermes in meatu Auditorio.**Wormen in den Gehoorweg.*

Van Th. Er. Nathorst.

Hoe moeyelyk het is te doorgronden de oorzaken van zekere ziekten, en verwonderenswaardige toevallen, kunnen sy weeten, die langen tyd gedraagen hebben den last van eene slaafagtige praktyk. De oorzaken komen wel niet zelden voort van ongenoegzaame waarneemingen of minder inzicht in de ongewoone ziekten, en 't geen dagelyks gebeurt van des lyders eigene onkunde, niet leerende acht te geeven op de veranderingen, welke in het ligchaam voorvallen, en noch een behoorlyk onderrigt weetende te geeven, noch zelve regt kennende hunne eigene ongemakken, en zulks alleenlyk laatende aankomen op de giffingen van den Geneesheer. Zulke raadzels kan dan noch een Oedipus, noch een Delphisch orakel, ja zelfs Aesculapius niet oplossen.

Tot zoo eene zieke wierd ik voor eenigen tyd geroepen, welke reeds eenige dagen geplaagd

plaagd was met zwaare ftuipen , die haar het eene uur verlieten het andere zoo veel te fterker aantaften.

De lydereffe, eene Juffrouw van het Land, agttien jaaren oud, van eene magere lighaamsgefteldheid, wift niets anders te berigten, dan dat fy door kwaadaartige buuren betooverd was, haar gehoor en de ftonden verlooren had.

Eene spanning en drukking in den buik deed my gelooven, dat zoo eene ziekte zoude plaats hebben. Niets wierd verzuimd, om haar te helpen uit het te vreezen gevaar; noch aderlatingen op den voet, noch pynftillende middelen, gegeven om de zwaare ftuipen te vermindern, noch ftoovingen op den buik, noch eenige andere middelen, om de ftonden haaren voorigen loop weder te geeven, hielpen iets. De ftuipen hielden aan, maar niet met dezelfde hevigheid.

De lydereffe begon nu te klaagen over zwaare pyn en ruifing in het regter oor, en ik nam waar, dat na de vermeerdering van de pyn en ruifing de ftuipen zich openbaarden, en, deeze toevallen bedaarende, wechbleeven.

Dit alles meende ik, dat van eene alte fterke spanning der zenuwen kwam; om deeze rede wierd 'er nat gemaakt plukfel in het oor geftooken, en ingefpooten oly van zoete amandelen,

len, met een weinig *laud. liq. Sydenhami* vereenigt. De lydereffe voelde daar van meêr pyn en kramptrekkingen, welke egter na gewoonte ophielden. By het wechneemen van het plukfel na eenige uren, zag ik, als eenen dikken draad in den gehoorweg, welken ik zocht daar uit te trekken, door middel van myn tangetje; maar ik vondt tot myne grootste verwondering, dat het een worm was, zoo lang, als een overdwarsche vinger, en zoo dik, als de pen van een duif. Ik kon 'er geen meêr by deezen vinden, om dat dezelve by het uittrekken eenigzins wierd in stukken geklemd.

Ik kon nu daar uit met eenige zekerheid befluiten, welke de oorsprong was geweest van de voorgaande toevallen. In vreeze, dat 'er meêr zulke inwooners zouden gevonden worden, veranderde ik myne voorheen gebruikte geneesmiddelen, en gaf een ander, voor deezen tegen zulke slegte gasten beproeft; namentlyk de *Ledum Palustre* LINN. *Flor. Suec.* 352, in de Apotheken *Rosmarinus Sylvestris* genoemd; waar van de bladen in water wierden gekookt, dat vervolgens met plukfel gebruikt en ook ingespuut wierd. Daarna zag ik wederom twee wormen, waar van de een nog leefde. Sy waren klein, en van grootte en lengte, als de voorgaande; smal aan het eene einde, en van buiten een weinig zwart aan beide einden; sy hadden in het geheel geen pooten, maar dertien ringen. Ik nam den levendigen om hem te laten

veranderen , maar na eenige uren stierf hy. Sy geleecken zeer veel na die , waar uit onze gemeene huisvliegen , door den Lyfartz en Ridder LINNÆUS beschreeven in *Fauna Suecica* N. 1106. , voortkomen.

Ik ging voort met het boven beschreeven middel , en vondt verder geen blyk van wormen. De lydereffe was intusschen haar ongemak kwyt geraakt , en bleef gezond.



de *splenius* en *complexus*. Dat dit zoo was, kon duidelyk beweezen worden uit de moeyelykheid, waar mede de etter zich ontlaste, wanneer de lyder den vinger drukte naar vooren, en tegen de *apophysis transversales colli*.

Om de geneezing te weeg te brengen, moest men 1. met goed voedsel en versterkende middelen de afneemende kragten opwakkeren; 2. de ontlasting der stoffe uit het oor beletten; 3. eene opening maaken aan den hals in den grond van de pypzweer. Tot het eerste wierden drie weeken tyd vereischt. Het tweede werd verrigt door steekwieken van plukfel en eindelyk met propfen van was, zoo dat de etter in twee dagen niet kon loopen uit het oor. Het derde oogmerk werd bereikt met *empl diachyl. c. gum.* gelegd op de plaats, en daar over eene weekmakende pap van haver-gort. Het laagste gedeelte begon, na zes of zeven weeken, *oedemateus* en eenigzins gespannen te worden op de plaats, waar onder de etter-zak lag.

De opening scheen zeer moeyelyk in het werk te stellen te zyn, daarom werd een stukje van den *lapis infernalis* zoo lang, als het lid van een vinger, daar over gelegd, om de huid en het celagtig weeffel door te knaagen. De roof werd los gemaakt met *ung. Basilic.* Na zes dagen viel dezelve af; maar de zaak was nog niet genoeg gevorderd; in de opening werd derhalven gelegd een *bouillonnet* van plukfel, bevochtigd met

met *butyrum Antimonii*; dit verwekte zwaare pyn, maar te gelyk eene groote diepte: wanneer de korst na agt dagen met zalf, pappen, en kleine inkervingen was afgesonderd, zag men eene kleine verhevenheid van de onderleggende etter. Deeze wierd genoegzaam geopend, en toen kon ik met den vinger zeer duidelyk de *apophyses transversales vertebrarum colli* voelen, die egter niet bloot waren: zederd deezen tyd liep de stoffe niet meêr uit het oor.

Een zuiverend en geneezend mengfel van gersten-water, roosen-honig, en *tinctura aloes* wierd deels door het oor in den hals, deels in den hals naar boven tot in den gehoorweg gespootten. Het verband en de verdere oppassing was vervolgens na gewoonte. In veertien weeken was hy gezond en in staat om het Hospitaal te verlaten. Indien men deeze pypzweer had kunnen sondeeren, en aanstonds eene tegenopening maaken onder aan den hals, dan was de geneezing meêr, dan de helft, verkort (*).

(*) Hetzelfde gebeurde aan hem, als aan veele, die in het Hospitaal geopereerd waren, dat hy zwaar de scheurbuik kreeg, voor; dat de geneezing was volbragt, daarom moest hy vervolgens by my in de Stad komen, en dagelyks de wonde laten zien; waar door hy in drie weeken de scheurbuik kwyt raakte, terwyl hy te gelyk geneezen wierd.





X X V I I I.

Fistula colli complicata.

Eene samengestelde pyp-zweer aan den hals.

Een Predikant uit *Helsingland*, vier- en veertig jaaren oud, kwam alhier in 1750. om hulp te zoeken tegen een zwaar ongemak, welk de helft van het hoofd en den hals aan de linker zyde innam.

Op het einde van het jaar 1749. had deeze lyder, door eene koude, zich zwaare hoofd- en oorpyn, vooral aan de linker zyde, op den hals gehaald. Al syne oplettenheid was niet in staat geweest het toeneemen van de pyn te vermindern, welke na verloop van drie maanden, even zwaar blyvende, zich vertoonde met een hard gezwel op de bovengenoemde plaats. Dit gezwel is vervolgens geduurig maar langzaam grooter geworden, waar by het gehoor aan het linker oor wechging en de mond geslooten wierd.

De zwelling, welke waarschynelyk meest aandeed de oorklier, had, door eene verwekte verettering, na gedagten konnen worden voor-

gekomen, en alle daar op gevolgde ongemakken afgeweerd; maar gebrek aan onderregting en ongeduld bragten den lyder tot verscheide veranderingen van middelen, welker werking van onkundig volk hoog gepreezen wierd.

Verdeelende, famentrekkende, rypmaakende, en verhardende pappen wierden op het ongemak beurtelings gebruikt, waar van de meesten de zoo heilzaame verettering verhinderden; diep in het gezwel, alwaar de werking der schadelijke middelen niet kon komen, geschiede de verettering wel tydig genoeg; maar de etter maakte zich eerst eene opening in de keel, vervolgens in den gehoorweg. Zederd zyn tot in het begin van 1750, wanneer hy hier kwam, verscheide pyp-zweeren, deels van zelve, deels door de konst geopend.

Nu wierden sy gevonden open en etter geëvende: eene was binnen in de keel, even agter het linker gedeelte van het slappe verhemelte; eene lange in den buitensten gehoorweg; eene boven het oor, twee voor het oor naar de kaak, twee agter het oor, en drie onder aan den hals, byna in eenen drie-hoek rondom het gezwel.

Deeze geheele zyde was hard en de deelen onkenbaar. Behalven de spieren, welke de onderste kaak opligten en neêrdukken, waren de



sterno-mastoideus, *splenius*, en *complexus major* met de veele groote en kleinere daar over loopende spieren, in het harde gezwel begreepen. Het aangezicht was sterk opgezet van bloed, door de belette te rug keering van hetzelfde. Eenige der pyp-zweeren hadden gemeenschap met elkander, maar niet alle. De uitwendige bekleetselen waren zonder gevoel, en verzworen, tot onder en boven het kuiltje van den nek.

Ik had rede, in dit zwaare ongemak, geene volkomen opening te belooven, de diepte van de pyp-zweer, en derzelver veelvuldige holligheden, de ongewoone hardheid, en de voornaame deelen, daar in begreepen, verboden, met het mes dit werk te onderneemen.

Het eerste en voornaamste oogmerk was, de hardigheden door eene verettering te doen verdwynen, op dat de ingewikkelde onbekende deelen eenigzins haare natuurlyke legging en gedaante zouden wederkrygen.

Het andere, om dan met meerder zekerheid de openingen te samen in eene of meêr te konnen brengen.

Het derde om na zodanige openingen gemakkelijker smeltende middelen op den grond van het ongemak te doen komen.

Het vierde, om, de hardheid volkomen verdween-

dweenen zynde, de geheele pyp-zweer te konnen openen, en eindelyk eene bestendige geneezing te weeg te brengen.

Het eerste oogmerk wierd berykt, door eene weekmaakende en vette pap, welke twee reizen's daags gelegd wierd over het gezwel van het begin van het jaar tot in het midden van Mey. Daar by wierden gebruikt lange ettermaakende propjes van hard gekookte roosenhonig, gemengt met den *mercurius præcipitatus ruber*. Deeze wierden dagelyks langer en dikker gemaakt, om dat de verettering of wechsmelting vermeerderde. De inspuitingen, welke somtyds gedaan wierden, om de diepe pypzweeren te zuiveren, gingen nu gemakkelyker, en in meêr quantiteit in de keel, dan voorheen.

In de maand Maart waren reeds de bovenste openingen rondom het oor geneezen. In dezelfde maand kon ik met eene sonde van was $\frac{2}{3}$ van een el lang vinden den weg onder het gezwel van het hoofd, en dezelve te voorschyn brengen door de bovenste openingen. De lengtte van de geheele sonde was nauwelyks toereikende, om in de diepte dit harde gezwel te omvatten.

Het tweede en derde oogmerk wierden hier door ook bevorderd, want de zydelyke pypzweeren konden gemakkelyker gefondeerd en
gec-



geopend worden, als ook de smeltende middelen beeter tot op den grond worden gebragt.

Door middel van eene sonde van was wierd aanstonds een *setaceum* gezet. Met hetzelfde wierden dagelyks de meêrgemelde smeltende middelen met goed gevolg ingebragt. De meeste der zydelyke pyp-zweeren waren deels door de verettering deels door de opening geneezen.

Maar, hoewel de verettering op den grond van de pyp-zweer was en zeer aanmerkelyk bleef, versmelte egter dit kraakbeenig gezwel al te langzaam. Om zulks te helpen, maakte ik door beide openingen, van den eenen kant van de seton tot de andere, eene insnyding, van een vierdendeel van eene elle, door welke ook het kraakbeenig vet-vlies (ik kan met regt zeggen, dat het celagtig weeffel in dit geval kraakbeenig was, dewyl het mes met moeite door hetzelfde heen ging) ter diepte van eenen overdwarschen duim doorgesneeden wierd. In den grond van deeze insnyding, en op de ontbloote hardheid van het gezwel wierden vervolgens met de grootste omzigtigheid brandmiddelen gebruikt, dan de *lapis infernalis*, dan het *butyrum antimonii*. Zoo dra de eene roof afviel, wierd eene andere in de plaats gemaakt.

Vyf weeken verliepen onder het gebruik van deeze middelen. De zwelling verminderde daar
door

door merkelyk ; ik kon ook nu zien , dat de *musculus sterno-mastoideus* , en by gevolg ook de *vena jugularis interna* , niet binnen de seton waren begreepen ; maar of de *carotis externa* of derzelve buitenste takjes in of by het gezwel gevonden wierden , kon tot nog toe niet bepaald worden , uit hoofde van de onkenbaarheid der deelen. De zitplaats en diepte van het gezwel maakte dit twyfelagtig.

Ik bevondt met leedweezen , dat al myrie aangewende moeite , en het ongemeene geduld van den lyder vrugteloos zouden zyn , zonder de geneezing te volbrengen , zoo niet de plaats tusschen beide de openingen volkomen wechgenomen wierd.

De *Escharotica* hadden de genoemde insnyding vier overdwarsche vingeren diep in het harde gezwel gemaakt. Ik vertrouwde niet langer nut te kunnen doen in de diepte ; maar de hooge kanten wierden daar mede wechgevreeten , waar door eene diepe en tamelyk platte zweer gemaakt wierd. Hier by ontstonden verscheide kleine bloedstoringen uit de takjes van de *jugularis externa* en de buitenste *carotis*. De pyp-zweer in de keel was nog niet geneezen , want de lyder had den smaak van alle genceesmiddelen , welke diep onder in het gezwel kwamen : dit had my lang belet den præcipitaat of andere sterke bytende middelen op de seton te gebruiken.

De seton, welke, om het gezwel te kunnen omvatten, in den beginne vereischte eene lengte van $\frac{3}{4}$ ellen, moest nu alleen $\frac{2}{3}$ van een vierdendeel zyn; maar de inwendige hardheid van het gezwel belette my, eenige klopping van de slagader te bemerken tusschen de seton en de insnyding. Ik waagde het daarom nog niet het middenste gedeelte door te snyden. Hier wierd vereischt een goed overleg, eene groote vrypostigheid, en veel geduld.

Ik zocht nu het vierde oogmerk te bereiken; en begon op nieuw in de verharding 's morgens en 's avonds te snyden altyd in eene regte lyn langs den draad. By elk verband knoopte ik den draad heel vast om het overblyvende gedeelte. Dus wierd de dikte merkelyk verminderd.

Onder dit werk, en wanneer de plaats tusschen de twee openingen niet meêr, dan twee overdwarsche vingers, dik was, brak aan den binnenkant eene slagader open; van welke ik niet wel kan zeggen, of het was de stam van de uitwendige krop-slagader, dan een van de voornaamste takken; maar de bloedstorting wierd sterk en verschrikkelyk.

Ik sneed nu de plaats door, waar voor ik altyd gevreesd had, dewyl de bloedstorting anders onmogelyk kon gestuit worden. Deeze sneede vermeerderde de bloedstorting door het openen van eenige kleinere slagader-takjes. Het eerste verband

ten vier uren , en het tweede ten vyf uren in den namiddag , ſchoon wel aangelegd en behoorlyk voorzien zynde , wierden doch doortrokken van het bloed , en moeften wechgenomen worden ; maar het derden ten zes uren voldeed.

Op den grond wierden gelegd kleine bourdonnets , gedoopt in zeer ſterken overgehaalden brandewyn , en vervolgens platte ſtukken van bereide ſpons (de gemeene ſpons gedoopt in heete was en ſamengedrukt). De ſpons , die ſchielyk opzwellt , drukt rondom zich en op het einde ſterker , dan een vinger , compres , en verband , zoo maar dezelve in den beginne door eene aanhoudende uitwendige drukking belet word , zich uit den grond op te ligten. Sy dringt zich in de vleefchige zyden van de wonde in , en vereiſcht eene ſterke verettering , eer ſy los word.

Agt dagen verliepen , eer dit geheele verband door eene ſterke en goede verettering los gemaakt wierd.

Binnen drie weeken of op het einde van de maand Juny was het gehoor herſteld , de binnenſte pypzweer in den hals geneezen , de hardheid verdweenen , en de man van een zoo gevaarlyk ongemak tot volkomen gezondheid , zonder eenige wanſtaltigheid , herſteld.

Drie jaaren genoot hy de voordeelen van de gezondheid, maar wierd door een nieuw toeval tegen het begin van het jaar 1754. overvallen. Zwaare hoofdpyn, drukkingen en draaijingen in het hoofd tasten hem op nieuw aan. Fontanellen op de armen en andere afleidende middelen wilden niet voldoen. De verdeeling werd zonder nut beproefd. De briefwisseling kon geen genoegzaame opheldering geeven, en afwezig kon men geen behoorlyk acht op alles slaan; hy kwam daarom weder naar Stockholm, na dat hy eenige maanden op syne geboorten-plaats veel ongemak had geleeden.

De regter zyde van het hoofd was nu eigentlyk aangedaan, behalven 't geen den hals en de omleggende deelen daar van door de medegevoeligheid leeden. De verdeeling werd op nieuw, doch vrugteloos gezogt: de bekleetselen van het hoofd op de *apophysis mastoidea offis temporis* met de helft van deszelfs *portio squamosa*, en de helft van het agterhoofds-been was gespannen, en eenigzins *oedemateus*. Men dagt derhalven op eene verettering op deeze plaats. Weekmaakende pleisters en pappen wierden gebruikt, om dezelve te bevorderen.


Na veertien dagen wierd eene weeke plaats ontdekt, zoo groot als eene halve noot boven de *futura lambdoidea*, ruim twee dwarsche vingers boven het genoemde uitsteeksel van het slaapbeen. Deeze plaats wierd geopend, en gaf ry-
pe

pe etter naar maate van de grootte; maar met verbaastheid zag ik teffens, dat de etter kwam door de *jutura lambdoidea*, en reeds een *os triquetrum*, zoo groot, als een schobben van een braasfem, verteert had, tusschen de tanden van dit been. In zich zelve was dit een voordeel, welk noch de konst noch de stoutmoedigheid zoude wagen te weeg te brengen, voornaamentlyk uit hoofde van den *fulcus offis occipitis* voor de regter *sinus duræ matris lateralis*, welke onmiddelyk loopt onder de genoemde beentjes, in den meergemelden *fulcus*. Deeze *sinus* kon egter niet afzonderlyk gezien worden, maar de ryzing en daaling der hersenen wierd na gewoonte duideelyk bemerkt: Dewyl de toevallen dagelyks verminderden, schorte ik andere proeven op, met het trepaneeren, of ten minsten het bekkeneel in den omtrek te doorbooren. Ik wilde ook niet de bekommernis van deezen man en van syne vrouw, die zwanger was, vermeerderen met zulke onderneemingen, welke hun de gevaarlykste van alle scheenen, hoewel fy zeer zeker en nuttig op zich zelve waren. De uitwendige wonde en de opening in het been wierden zuiver gehouden met balsamieke middelen.

Na drie weeken begon de wonde zich te vullen met goed vleesch en toe te gaan, zonder afschilfering van het been. De zieke was vry beeter, maar nog geplaagd met draaijingen en pyn in het hoofd, Hy wierd te raaden te gebruiken het poeder van *Ailbaud*, waar aan ik ge-

makkelyk myne toestemming gaf. In den beginne nam hy 'er een om den anderen, vervolgens om den derden, en toen om den vierden dag. Zestig derzelven gebruikt hebbende, bevondt hy zich merkelyk beeter, en kon gaan over straat alleen zonder hulp, 't geen te voren niet mogelyk was; zederd dien tyd was hy gezond en nam synen post waar tot in het vierde jaar. Onlangs heeft hy wederom beginnen te klaagen over zulke drukkende pyn in den nek, en de zenuwen van den hals, welke voor den anderen aanval ook bemerkt was. De tyd moet leeren, of de verettering te eeniger tyd deeze zinking zal breeken, welke zoo zwaar was, dat ik eene voortgelyke ten opzigte van de zwaare pyn noch gezien noch ergens heb hooren verhaalen.





X X I X.

Vulnera colli & asperæ arteriæ.

Wonden van den hals en lugt-pyp.

I.

Een man, oud veertig jaaren, een Bediende van de Lands-tol, wierd in het Hospitaal in 1756. geneezen van eene koorts verzeld met de scheurbuik, en uitslag over het geheele lighaam, benevens eene verzwearing aan het been. Hy was te vooren reeds eenigzins droevig, en onrustig: maar wierd dit nu meêr, wanneer de genoemde toevallen overwonnen waren.

Hy nam 's avonds ten negen uren een kwaad besluit, en gaf zich met een mes aan de linker zyde van den hals eene diepe wonde, begon met de linker zyde van de lugtpyp, en strekte dezelve uit tot over het einde van den *musculus sterno-mastoideus*. De uitwendige kropader aan dezelfde zyde was open, en storte overal in het vertrek eene ongemeene groote quantiteit bloed uit. De oppasser der zieken, en de Heelmeester, die de wagt had, kwam aanstonds daar by, leide hem in het bed, en stuitte, zoo veel mogelyk was, de bloedstorting met plukfel,



compreffen, en de drukking van de hand. Zoo dra ik de tyding gekreegen had, haafte ik my insgelyks tot eene fchielyke hulp. De dekkleeden waren vol bloed, en de gekwetfte was zoo door het verlies aan bloed, als den fchrik, buiten ftaat, om te fpreken; de pols was nauwe-lyks te bemerken.

De wonde wierd geopend, het plukfel wechgenomen; de lugt kwam uit de opening van de lugtpyp onder de ademhaaling. Zoo dra de wonde van het plukfel gezuiverd, en de bloedftorting gefluit was, vereenigde ik dezelve met drie hegtingen, welke met hegtpleifters onderfteund wierden, terwyl het hoofd door een behoorlyk verband over de linker zyde gehouden wierd. Haver-foep, met lepels gegeven, en de gemeene amandelmelk met *Conf. Alkerm. incompl.* was fyn eenigfte voedsel in agt dagen. De kanten van de wonde wierden befmeert met *balf. de Mecca*. De hegtingen wierden den negenden dag wechgenomen.

Tegen den twintigften was de geheele wonde geneezen, en toen verliet hy vrolyk en wel het Hospitaal.

2.

Een floeproeyer, ruim dertig jaaren oud, wilde in eene haafteigheid zich zelve om het leven brengen. Hy maakte met een bot mes eene won-

wonde, een' halven vinger lang, midden over het hoofd van de lugtpyp, en een weinig aan beide zyden. Dewyl dit hem veel pyn veroorzaakte, geloofde hy de wonde groot genoeg te zyn, de rafernij verminderde, en hy liet toe dat men hem kwam helpen: het verband en de opasfing waren noch wel ingerigt, noch voldoende.


De wonde was gewaffchen met brandewyn en azyn, en de lyder uit hoofde van fyne onhandelbaarheid in hegtenis gebragt.

Hy kwam op hoogft bevel in het Hofpitaal in 1757. in het voorjaar, en den tienden dag na dat hy zich het ongemak op den hals gehaald had. De wonde was met pleifters gehegt, maar had harde kanten, en veretterde niet; de lugt kwam door de openingen, die met de keel gemeenfchap hadden, en wierden gevonden te gaan overdwars door het *cartilago thyroidea*, evenwydig met de *glottis*, maar een weinig hooger, en op te houden in de *sinus externus laryngis*, zoo dat by de uitademing een fchuimende lugt, en 't geen doorgeswolgen wierd, daar uit liep; maar 't minft van het laafte.

Door inkervingen en het gebruik van den *Balf. Arcæi* wierd de wonde tot verettering gebragt: het *cartilago thyroidea* gaf eene ftinkende zwarte etter van zich; het verband gefchiede met den *balsamus Fioraventi*. De openingen in het kraakbeen wierden gefcarificeerd, in hoope, dat daar uit eene nieuwe

kraakbeenige stoffe zoude opkomen, om dezelve te sluiten; maar men had daarvan eene tegenovergestelde werking, dewyl de openingen daar door verwyderd wierden; men was derhalven genoodzaakt, de binnenste openingen onaangeroerd te laten. De uitwendige opgroeiing van het vleesch werd bevorderd.

Na agt weeken verliet hy het Hospitaal met eene pypzweer in de *larynx*, waar van de opening zoo groot was, als de kop van eene speld, en bedekt wierd met een lapje fyn linnen, een dun plaatje van lood en hegtpleister. Na dertig weeken van het begin had de geheele pypzweer zich geslooten zonder afschilfering.



X X X.

Tumores inclusivi seu melicerides colli.

Zakgezwellen aan den hals.

De Zakgezwellen aan den hals komen niet zelden voor, en vertoonen zich meestendeels op de zyden of van vooren: sy zyn week op het gevoel, hebben dezelfde kleur, als de huid, zoo maar de bevatte stoffe geene scherpte aangenomen heeft, en door de huid heendringen wil. Sy groeijen langzaam aan, een of meer jaaren, zyn in den beginne klein en hard, als opgroeiende knoestgezwellen, maar worden onder het toeneemen meer en meer week. Het vogt, daar in bevat, gelykt meestendeels na geele etter, met water verdund.

Derzelver oorsprong is onzeker, gelyk die der overige zakgezwellen ook onbekend is: Eene verstopping of ander beletsel in de vakjes van het celagtig weeffel, of in de ontlastbuisjes van eene klier, legt waarschynelyk den eersten grond daar toe.

Het laatste is my waarschynelykft voorgekomen. 1. Om dat deeze gezwellen een' zeer dunnen of in het geheel geen zak hebben, ten

op=

opzigte van die, welke in het vetvlies op andere plaatsen van het lighaam ontstaan en toeneemen. 2. Dewyl fy meest hunne holligheden uittrekken tot tusschen de spieren van den hals, en, even als de *glandulæ conglobatæ*, zich tusschen dezelve doorflingeren. 3. Om dat men uit deeze oorzaak somtyds genoodzaakt is verscheide openingen in derzelver holligheden te maaken, zullen fy anders zonder overblyvende pyp-zweeren geneezen worden, dewyl de noodzakelykheid, om de spieren, en de bloedvaten, te verschoonen, niet toelaat, dat men dezelve volkomen uitpelt.

I.

In de maand September 1752., kort voor dat het Hospitaal wierd geopend voor de zieken, melde zich een Constapel van de Koninglyke Artillerie aan. Hy had aan de linker zyde van den hals een, eenigzins week en rond, gezwel zoo groot als eene groote okker-noot; in de huid op hetzelfde wierd gezien een litteeken van eene opening, voor twee jaaren in het gezwel gemaakt, waar uit veel en dun vogt liep. Digt by deeze was een ander en dunner litteeken overgebleeven na eene soortgelyke opening, gemaakt voor zes maanden, om de stoffe te ontlasten.

De lyder, verneemende, dat deeze middelen wel verzagtede, maar niet geneezende, waren, verlangde daar van ten eenenmaale bevryd te

worden. De zitplaats van het gezwel was aan den binnenkant van den *musculus sterno-mastoideus*, leide zich daar over een weinig naar agteren, en verborg zich diep onder deeze spier tegen de *vena jugularis interna*: de stam van de *carotis externa* wierd afzonderlyk gevoeld van het gezwel; want de hals was voor het overige plat en mager, zoo dat de deelen duidelyk van elkander konden worden onderscheiden.

Myn voorstel was, om 1. Het gezwel in de huid, zoo ver mogelyk, te openen. 2. De zydelyke deelen van den zak los te maaken, en, zoo veel mogelyk was, daar van wech te nemen. 3. Om op den grond den zak te vertceren of door de verettering te doen verdwynen, en eindelyk eenen vasten grond te krygen en de geneezing aan te brengen.

Eerst wierd het gezwel geopend, waar uit een dun geel water liep; met den vinger wierd onderzocht de diepte, die aanmerkelyk was, gaande onder en agter den *musculus sterno-mastoideus*. Ik was onzeker, of de *vena jugularis interna* boven of onder den zak was. De grond wierd gevuld met vast in een gerold plukfel. Vervolgens zouden de kanten van den zak los gemaakt en wech genomen worden. Maar dewyl de zak overdwars in de diepte ging, kon de gedagte uittelling niet met zekerheid in het werk gesteld worden. Dit wierd derhalven uitgesteld tot het volgende verband na vier dagen.

Ik



Ik wilde toen weder de uitpelling beproeven; maar zoo dra het bistouri naderde tot het onderste gedeelte van den *musculus sterno-mastoideus*, ontstondt 'er eene zwaare bloedstorting, waar door de vrees bevestigd wierd, dat de *jugularis interna* was begreepen tusschen den zak en de spieren. Alle omzigtigheid was gebruikt; ik had fyne stukjes van *agaric. hæmostat.* en van bereide spons gereed: deeze leide ik om den anderen op den grond van de wonde, een' duim hooger, dan de huid, latende dezelve door myne bedienden by beurten vier uren lang met de hand tegenhouden. Het bloed sieperde aan de kanten uit; maar niet zoo sterk, dat men voor eene bloedstorting kon vreezen: eindelyk wierd hetzelfde volkomen gestuit. Het verband bleef veertien dagen zitten, alleenlyk wierden zuivere compressen aangelegd.

Den zestienden dag wierden alle stukjes spons wechgenomen; de wonde, welke nu groot en diep was, wierd de eerste dagen verbonden met eene *solut. sulphuris* en *ol. lini*; dezelve veretterde goed, wierd zuiver, en met goed vleesch gevuld, zoo dat het geheele ongemak op het einde van de tiende week ten eenenmaale geneezen was. De zak is waarschyndelyk verteert door de rotting en verettering, anders zoude de geneezing niet bestendig gebleeven zyn.

2.

Eene jonge juffrouw van veertien jaaren kwam in 1755. in het Hospitaal, met een *Meliceris* voor op den hals. Dezelve was binnen twee jaaren zoo groot geworden als twee samengevoegde gansen-eijeren. De kleur van de huid was zoo als op andere plaatsen. Het gezwel nam de geheele lengtte tusschen den rand van de onderste kaak en het bovenste einde van het borst-been in aan de regter zyde. De bevatte stoffe was dun, gelyk men uit de schommeling kon bemerken. Het gezwel bedekte en drukte te gelyk een gedeelte van de lugt-pyp, de *carotis externa dextra*, de *jugularis interna*, en de helft van de *sterno-mastoideus*, 't welk maakte, dat de lydereffe met moeite adem haalde, slikte, en het hoofd naar de linker zyde keerde; het aangezicht was daar by zeer opgezet, rood, en de aderen op het voorhoofd met bloed vervuld.

Het gezwel, welk eenen dunnen zak had, wierd geopend, en uit hetzelfde liep dun en geel vogt. De groote en diepe holligheid wierd gevuld met droog plukfel, en verder verbonden. De klopping van de *carotis* op den grond van de holligheid was zeer digt en kenbaar. Den derden dag wierd het plukfel wechgenomen, de wonde twee of drie dagen met eene ettermaakende zalf verbonden, vervolgens met de
solu.

solutio sulphuris oleosa; de zak, welke zeer dun en ongelyk geworden was, wierd geheel verteert met een poeder uit gelyke deelen *Merc. præcip. rub.* en *myrrha*, met maaten daar op gestroid.

Na agt weeken was de geneezing volbragt; maar, gelyk met deeze etterzakken meestendeels gebeurt, als sy groot zyn, dat sy boesemen hebben tusschen de hals-spiereu, en men noch deeze noch den zak durft openen en los maaken, uit vreeze voor doodelyke bloedstortingen, zo was hier ook een boesem op den grond overgebleeven.

Van daar was het, dat de roef na twee maanden van nieuws opzwol, en zich onder dezelve eene verzweering vertoonde. Dezelve wierd geopend, gezuiverd, en geneezen; het zelfde geschiede binnen een half jaar twee of drie reizen, maar telkens minder, tot dat de zak volkomen was uitgezwooren en voor altyd geneezen. By deeze ongemakken heeft men egter dat voordeel, als het gezwel de eerste reis geheel en al opengemaakt is, dat de grond zich opgeeft, en de verborge boesems digter tot de huid komen, afzonderlyk veretteren, zonder gevaar kunnen geopend en geneezen worden.


3.

Van soortgelyke gezwellen zouden 'er nog vier


vier konnen aangevoerd worden, welke van tyd tot tyd in het Hofpitaal behandeld zyn; maar dewyl fy, in de meeste omftandigheden, volkomen aan de voorgaande gelyk zyn, zal het onnoodig zyn, dezelve te verhaalen. Ik voeg 'er alleenlyk by, dat ik by derzelver opening altyd eene tegenopening gemaakt, en een feton gebragt heb door de deelen, welke moesten van het fnyden verſchoond worden. Op de feton heb ik gefineert of de *ſolutio ſulphuris cum oleo lini*, of *mel. roſ. inſp. cum merc. præcip. rub. & myrrha*, of den *balf. arcæi* met *pulv. alum. uſti*, na vereiſch der omftandigheden.

Als de wonde een dun, ſcherp, water gaf, heeft de *ſolutio ſulphuris* het meeste nut aangebragt. Was de grond geel en ſpekagtig, dan heeft de *merc. præcip.*, droog daar op geſtrooid, of ook onder andere middelen vermengt, denzelven gezuiverd. Zoo het vleefch los was, en ligt bloedde, heeft het gebrande aluin hetzelve tot eene goede geneezing gebragt.





HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



TWEEDE HOOFDSTUK.


VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE AAN DE BORST
EN DESZELFS ZYDELYKE DEELLEN VOOR-
KOMEN.



I.

Scirrhi & indurationes mammarum.

Knoest-gezwellen en verhardingen der borsten.

 **E**er dat ik de gevallen van deeze foort
opgeeve, moet ik myne eige onze-
kerheid bekennen, of de verhardingen
of verharde borsten, welke uitgepelt zyn, waar-
lyk voortsprooten van eene kankeragtige stoffe
in het bloed; dewyl myne dagelyksche onder-
vinding, en ook die van andere getoont heb-
ben, dat, als zulke klonters van eenen kanker-
agtigen aart waren, sy dan op dezelfde of op
eene

eene andere plaats, vroeg of laat, wederkomen. De uitwendige kentekenen tusschen goedaartige en kwaadaartige knoestgezwellen, welke by de Schryvers verzamelt zyn, moeten daarom niet minder in acht genomen, en de uitkomst daar na worden voorfpeeld.

I.

Eene juffrouw van drie en dertig jaaren uit Upsala kwam in 1754. alhier in het Hospitaal, om hulp te zoeken voor eene verharding in de regter borst, welke sy reeds drie jaaren had. De borst was vry groot, los en neêrhangende. Aan den grond of het onderste gedeelte wierd bemerkt eene, knobbelagtige, verharding, welke beweegelyk en zoo groot was, als een half gerafpd brood, in de lengte doorgesneeden. De uitwendige huid was van kleur en gesteldheid gezond. Het gezwel had geene zwaare toevallen, behalven eene, lastige, zwaarte, benevens trekkingen en steeken in de borst by verandering van weêr. Sy stondt de uitpelling toe, en wierd daar toe bereid.

Eerst wierd gemaakt eene regte insnyding van onder de verharding naar boven tot midden op de borst; vervolgens wierd eene andere gemaakt horizontaal na de lengtte en hoogte van het gezwel, welke bevatte het eene einde van de regte insnyding, en de gedaante had van een naar boven, en naar onder gekeerde Ro-

mynsche T. Het gezwel wierd aan de zyden los gemaakt en wechgenomen. De tepel was vry groot, knobbelagtig en bruin, en daarom wierd dezelve ook wechgenomen: de kanten van de wonde wierden vereenigt met hegt-pleisters. De borst en wonde wierd bedekt met droog fyn plukfel, compressen en het gewoone borst-verband. De overige oppassing en verbanden waren, als by eene versche wonde. De *Balsamus arcaei* met eenige droppelen *oleum ceræ* wierden op de vereenigde kanten gebruikt, als een ettermaakend middel. Droog plukfel was op 't laatst het eenigste *epuloticum*. In de zesde week was de wonde geneezen, en toen reisde sy fris en gezond wech. De verharding bestondt in eene vleeschagtige substantie, met verharde klieren zonder eenige order samen vereenigt.

2.

Eene meid van dertig jaaren, in Stockholm woonende, bloedryk, voorheen met pynelyke trekkingen door het lighaam aangedaan, had nu zederd twee jaaren een gezwel en verharding in de linker borst, om het welk te verdeelen sy vrugteloos aangewend had allerhande, anders dienstige, middelen. Sy kwam in het Hospitaal in de lenté van 1755. De borst was van eene middelmaatige grootte, had uitwendig eene gezonde kleur, en de huid los was van de inwendige deelen. Dezelve was hard, gelyk, ongevoelig op het aanraaken, en maakte het grootste deel uit van de verharding.

Sy

Sy was te vrede, welke middelen men ook ter geneezing aanwendde. De uitpelling wierd ondernomen. Dewyl de borst meêr lang, dan rond, was, wierd alleenlyk eene insnyding gemaakt in de lengtte door de huid en het vet, tot de linker zyde van de tepel. De kanten wierden van het binnenste gezwel los gemaakt. Dit met eene naald, en dikken, met was besmeerden, draad doorstookten zynde, wierd opgeligt, van den *musculus pectoralis major* los gemaakt, en wechgenomen, gelyk men gewoon is te doen met zakgezwellen. De vereeniging en geneezing had niets verschillende van het gewoone, en 't geen in het voorgaande geval is gezegd.

In de zevende week was de wonde geneezen, wanneer sy het Hospitaal verliet. Het uitgepelde gezwel bestondt uit het verharde vetvlies, en uit opgezwollen klieren daar in, ter grootte van amandelen, van welke twee inwendig eenigzins bruin gevonden wierden, zonder verrotting.

Tegen den winter van hetzelfde jaar begon sy eene byzondere ongemakkelykheid in het ligchaam gewaar te worden, welke opgewekt wierd door vliegende pynen in de leden, en krampen in de darmen. Verzagtende middelen wierden haar om niet gegeven van het Hospitaal, dan voor de eene dan voor de andere ziekte.

Tegen den herfst van 1757. wierd in de regter



borst het begin van eene verharding ontdekt, gelyk in de linker geweeft was. Zakjes met verdeelende kruiden wierden op de borst gelegd, en daar over het vel van een zwart lam. Het gezwel en de verharding verdeelden zich, verminderden, verdweenen grootendeels, en kwamen na korten tyd wederom. Dit duurde byna een geheel jaar, en intusschen plaagden haar de inwendige ongemakken meer of minder. Nu is het ongemak dragelyk en de borst zagt; sy had daar mede kunnen uitgaan. In de borst werd nauwelyks eene zwellling ontdekt, noch ook op eene andere plaats. Het vel van een lam werd daar over gedraagen.

Kankeragtige knoestgezwellen laten zich niet gemakkelyk op deeze wyze aantasten: zoude hier eene andere scherpte tegenwoordig geweeft zyn? (*).

Eene

(*) Ik heb twee verharde borsten zien wechneemen; de verhardingen waren veel in getal, en in de zyden van het geopende vet-vlies verspreid, tot de grootte van muscaat- en hazel-nooten, sy konden derhalven minstendeels wech genomen worden. Des niet te min smolten of verdeelden zich deeze knobbels onder de verettering volkomen, zoo dat de geneezing van het ongemak en eene bestendige gezondheid daar op volgden. Indien ik daar tegen bybreng andere, my bekende, gevallen, van wechgenoomen verharde borsten, waar by men, uit hoofde van de vaste vereeniging met de groote borst-spier, of met de klieren, die door het vet-vlies verspreid zyn tot onder den oxel, genoodzaakt is geweeft eenige verharde klieren over te laten, dan is de geneezing nauwelyks

3.

Eene juffrouw van 34 jaaren, te huis hoo-
rende, in de stad *Sala*, kwam herwaards in 1747,

om
lyks tot twee vierde deelen volbragt, of'er is een nieuw
gezwel en verzwearing ontstaan, waar op eene zwaare
pyn en eindelyk de dood gevolgd is.

Na het kraamen worden de borsten dikwils van opge-
hoopt zog, welk, het kind niet gezoogd wordende, schift
en opdroogt, zoo hard als kraakbeen, waar van ik een
aanmerkelyk geval zou kunnen bybrengen: in het begin
was dezelve zoo hard als been, of als de knie-schyf,
maar na dat men driemaal 's daags geduurende zestien
weeken gebruikt had eene dikke pap van haverwort en
saffraan, wierd dezelve zagt en gezond, zonder eenige
verzwearing; het zog wierd op nieuw ontbonden, en
ontlaste zich spaarzaam door de zogbuisjes van de tepel.

De podagreufe, jigt, en scheurbuikige stoffen, de *stru-
mæ* en *scrophulæ*, veroorzaaken elk hardigheden, knob-
bels, en gezwellen, zoo wel op de inwendige, als uit-
wendige deelen van het ligchaam, waar van de laatste met
vrugt wechgenomen worden zonder wederom aan te
groeyen, indien de plaats medegeeft.

Ik ben derhalven onzeker, of het waar kan zyn, dat
een kwaadaartig knoestgezwel in den beginne dikwils
goedaartig was, gelyk de Hooggel. Hr. PLATNER *Inst.
Chir. rat.* §. 263. en andere denken, dan of men niet
met groot regt kan gelooven, dat een waarlyk goedaar-
tig knoestgezwel, zonder zwaaren misflag, of liever eene
nieuwe daar by komende inwendige oorzaak, nooit kwaad-
aartig word, en kankeragtige eigenschappen aanneemd,
daar in tegendeel een waarlyk kwaadaartig knoestgezwel
dit van het eerste begin is, gelyk eene zaadstof, kon-
nende niet afleggen synen verdervenden aart, ten zy'er
een zeker en onfeilbaar middel geopenbaard, en algemeen
aangenoomen worde.

om zich te laten geneezen van eene verharding in de regter borst; dezelve was niet grooter, dan een muscaat-noot, maar hoekig, en met den eenen punt vastgegroeit aan de huid; voor het overige zeer los, konnende van de eene plaats naar de andere verschooven worden. Sy had dikwils pyn en voelde steeken diep in de borst.

Na dat het lighaam voorbereid was, werd de verharding op de gewoone wyze uitgepeld. Eene langwerpige sneede ter lengtte van eenen halven vinger was voldoende, om dezelve wech te neemen. De wonde bloede ongemeen sterk, werd gehegt, en was in veertien dagen geneezen. De klomp was wit van kleur, zeer hard, als eene verharde klier.

In de derde week kwamen 'er twee kleine knobbeltjes in het vet onder de huid, midden op het borstbeen tusschen de borsten. Deeze wierden aanstonds wechgenomen, na dat sy nauwelyks agt dagen waren zichtbaar geweest. Sy waren niet grooter, dan kerffen-steenen. De openingen waren geneezen, gelyk die van eene aderlaating, in vier- en twintig, of op syn hoogst in agt- en veertig uren. Eenige dagen daarna vertoonden zich drie soortgelyke knobbeltjes, twee op het borstbeen en een aan den binnenkant van de linker borst. Het laatste groeide dagelyks aan, zoo dat het binnen agt dagen zoo groot was als eene okkernoot. De klieren

onder den oxel aan de linker zyde begonnen insgelyks te zwellen en hard te worden. Haar ongemak bleek dus ten allerklaarsten. Sy reisde, zonder hulp, naar huis met eenige bloedzuiverende en verzagtende middelen. Haar ongemak heeft vervolgens zich geopenbaard door opene kankeragtige verzweringen, welke na verloop van eenige maanden haaren droevigen toestand eindigden.

4.

Eene meid uit de stad *Lindköping*, vyf- en twintig jaaren oud, kwam in 1757. in het Hospitaal. Haar linker borst was eens zoo groot, dan dezelve zyn moest, niet hard, maar styf, en door de zwaarte lastig. Sy wenschte, dat men dezelve zoude wechneemen, om voor te komen, dat sy in het vervolg zwaarder ongemakken of de kanker daar van krygen zoude.

Na eene voorbereiding wierd de operatie ondernomen. Eerst wierd eene lange insnyding gemaakt van onderen naar boven, rond over de borst tot in het vet, en de klieragtige substantie. Eene andere wierd kruiswyze daar over gemaakt van den binnen naar den buitenkant van de borst. De inwendige deelen, welke de borst en het gezwel uitmaakten, waren ten eenenmaale vermengt met het gemeene vetvlies, en bestonden uit harde vetblasen, waar tusschen verharde klieren waren. Derhalven was, by

het uitpellen, geen andere weg te volgen, dan door het vet zelve, zoo dicht by de huid, als mogelyk was. De zyden wierden vereenigt, verbonden en geneezen op de beschreeven wyze, zoo dat fy in de agtste week in staat was, om wech te reifen.

Door eene voornaame hand ben ik in het vervolg met eenen brief onderregt, dat fy, zonder eenig nieuw ongemak, zich zeer wel bevindt (*).

5.

Eene Boerin uit het Distrikt van *Jonköping*, zes

(*) Wanneer een borst geheel en al of gedeeltelyk verhard word, het zy uit eene kankeragtige of andere oorzaak, en dezelve kan op de gewoone wyze niet verdeeld worden, dan is het ontegenzeggelyk gemakkelyker, om alleenlyk de verharde deelen uit te pellen, en de huid geheel te laten. Ik heb veele verharde en kankeragtige borsten in het rond met huid en al volgens de oude manier zien wech neemen, maar nauwelyks een is tot eene volkomen geneezing gebragt, voor dat het *virus* zich wederom in de wonde of in derzelver kanten geopenbaard heeft. In tegendeel worden de uitgepelde, zonder zwaare toevallen met eene geringe verettering, en in korten tyd, geneezen; 'tgeen beweezen word uit de opgegeeven gevallen, en met meêr andere zoude kunnen bevestigd worden. 'Er ontbreken egter geene gevallen, die gelukkig afgeloopen zyn, schoon de geheele borst te gelyk met de huid wech genomen was, gelyk door den Hr. LE DRAN in *Memoir. de L'Acad. de Chir. Tom. VII. p. 251.* aange-merkt is.


zes en dertig jaaren oud, kwam in 1755. in het Hospitaal. Haar linker borst was driemaal grooter, dan de gezonde, onnatuurlyk zwaar, en ongemeen lang ten opzigte van de grootte. Sy was niet hard, maar steevig, als een spieragtig deel van het lighaam; de tepel was ingetrokken. De zwaarte, welke de groote borstspier, den linker boven-arm, en de ribben naar voren en beneden trok, was het voornaamste ongemak, welk sy daar van had.

De regter borst was ook eenigzins steeviger, dan na gewoonte, en, volgens haar berigt, in denzelfden staat, als de andere in den beginne geweest was. Zakjes met verdeelende kruiden wierden daar over gelegd.

Na eene genoegzaame voorbereiding werd, door twee overdwarsche insnydingen in de huid, het binnenste van de geheele borst, alleenlyk uit vet bestaande, wech genomen. Het celagtig vlies was uitgezet, en met dik geworden vet gevuld. De klieren en zogbuisjes waren onkenbaar, of in hard vet veranderd. De bloedvaten waren zeer groot en wyd, en onder de operatie ontstondt 'er eene aanmerkelyke bloedstorting. De vet- en klieragtige zelfstandigheid van de borst was vereenigd met het gemeene celagtige weeffel onder de groote borstspier, van waar het kwam, dat groote vezelbondeltjes van de onderste tanden van deeze spier opgeligt en in het harde vet als ingeweeven

ven waren, zoo dat fy by het wechneemen van de geheele borst niet konden verschoont worden.

Twee slagaderen, die 't meest bloed gaven, wierden onderschept en toegebonden. Men vulde de wonde met droog plukfel, waar over platte sponzen, compressen, en wat verder tot een vast verband vereischt word, gelegd wierden. De overtollige deelen aan de hoeken wierden wechgenomen. Het bloed doortrok tweemaal in vier en twintig uren het geheele verband, welk veranderd wierd. Na agt dagen was de wonde in verettering, wanneer de opgeligte hoeken neêrgelegd, en met den grond vereenigd wierden. In de negende week was alles geneezen. De regter borst was niet grooter, maar veel eer minder geworden. Sy wierd geraaden, langen tyd daar over te draagen zakjes met verdeelende kruiden van alfem, hop, en vlierbloemen, wanneer fy gezond naar huis ging.



de fomtyds een weinig zuiver bloed te voorfchyn kwam.

De opening wierd verwyderd, en open gehouden met een feton of stukje linnen. In de borst wierd eerft gefpooten gerften-water met rooffen-honig, tot dat de ftoffe den kwaaden reuk verloor, en verminderde, vervolgens een afkookfel van de *Rad. Aristol. Sympb. maj., summit. Hyperici*, waar by gevoegd wierd het doir van een ey, en de *Balf. Peruvianus*. Inwendig wierd geduurig een borst- en wond-drank gebruikt met andere middelen, welke iets konden toebrengen, om het bloed te zuiveren.

Onder deeze behandeling liepen tien weken voorby, en intuffchen moest de opening twee of drie reifen verwyderd worden. Eindelyk hield de ontlasting op, en de bovengenoemde toevallen bleeven wech. Door het voedsel kreeg hy langfamerhand eene goede gedaante weder. In de dertiende week was hy geneezen, en verliet gezond het Hofpitaal.

2.

Een Boeren-knegt uit *Södermanland*, zes- en twintig jaaren oud, kwam in 1756. in het Hofpitaal. Voor eenige maanden had hy uitgeftaan eene zwaare koorts, met een fteek in de zyde, welke langen tyd geduurd, maar eenigzins

zins verminderd was, na dat hy in de linker zyde eene opening had gekreegen, welke veel geele etter ontlafte, die ook nog dagelyks daar uit liep. Hy had anders goede kragten, en kon vry ver te voet gaan. Eene geringe koorts na den middag, moeyelyke ademhaaling, een onvermogen om op de regter zyde te liggen, en het nagt-zweet waren de kentekenen der ziekte. Doch het zekerste was eene fistuleuse opening aan de linker zyde van de borst tusschen de vyfde en zesde waare ribbe, ruim eene hand breed van den bogt der ribben naar het borstbeen, waar uit veele dikke, taaye, etter kwam.

De opening wierd verwyderd en open gehouden, ook wierd, even als in het eerste geval, in de borst gespootten gersten-water met roosenhoning. Na dat hy drie weeken in het Hospitaal geweest was, kreeg hy op nieuw eene sterke koorts met voorafgaande koude en daar op volgende hitte, en een steek in de aangedaane zyde. Daar op kwam eene nieuwe verzwearing. Uit de wonde liep gestaadig ongemeen veel etter, uit de lugtpyp en keel kwam minder met bloed vermengde stoffe. Inwendige borstmiddelen wierden naarstig gebruikt, terwyl de wonde en inwendige holligheid uitgespoeld, gezuiverd, en tot geneezing gebragt wierd, door inspuitingen, naar den tyd en de omstandigheden der wonde geschikt.

In den tyd van veertien weeken, welke tot
dee-

deezee geneezing noodig was, wierd de wonde verscheide reifen met het mes verwyderd.

Het geen meest overkomt aan alle lyders, met een etterborst geplaagd, gebeurde ook in deezee, dat namentlyk de ruggegraat zich naar de aangedaane zyde boog, uit hoofde van de aanhoudende legging daar op, en, in deezee gedaante, verliet hy, anders geneezen en gezond, het Hospitaal. Zederd heeft hy eens 's jaars met vergenoegen het Hospitaal bezogt, wanneer syn rug regt en syne gezondheid bestendig gevonden wierd.

3.

Van N. Oleveldt.

Een Brouwers-knegt, van zeven- en twintig jaaren, had voor twee maanden uitgestaan eene *pleuropneumonia*, welke, by gebrek van eenige andere heilzaame zuivering, op de plaats zelve tot eene verzwearing was overgegaan, en de halve zyde met eene ongemeene bederving had aangedaan, aan den regter kant van de derde tot de zevende waare ribbe. Een ontfteekingsgezwel had zich ter grootte van een bord reeds op den veertienden dag na de ziekte, op de uitwendige deelen beginnen te vertoonen, geëvende den gevaarlyken toestand der onderleggende deelen te kennen. De verdeeling kon niet
meer

meêr teweeg gebragt worden, en daarom wierden rypmaakende stoovingen en pappen gebruikt. Na eenige dagen was de zwelling zagt en gevuld met etter, en toen werd dezelve met eene kleine insnyding geopend, en leeg gemaakt. Hoe hy zederd dien tyd werd behandeld, is onbekend, tot dat hy, gelyk gezegd is, na verloop van twee maanden tot het Hospitaal kwam in 1756.

Offchoon de fistuleuse opening in de zyde tusschen de zevende en agtste ribbe veel kwalik riekende en dikke etter gaf, welke de toevallen in het algemeen verzagte, zoo had egter de lyder den geheelen dag eene aanhoudende zwaare koorts, welke 's nagts een weinig verminderde met rykelyk zweet, maar 's morgens wederkwam met eene moeyelyke en zwaare ademhaaling, als ook doodelyke benauwdheid, wanneer hy zich naar de linker zyde keerde. Voor het overige was hy wel gemoed, en hoopde syne gezondheid weder te krygen.

De opening tusschen de boven genoemde ribben, niet ver van derzelver bogt, werd verwyderd, en toen ontdekte ik aanstonds eene sterke beenbederving, waar mede veele ribben aangedaan waren; by het openen van de huid lag 'er een stukje van de agtste ribbe, drie duimen lang, geheel los, en werd wechgenomen. Zuiverende inspuitingen wierden gebruikt van geristen-water, het tweede kalkwater, van

elk twee pond' *tinct. myrrhæ*, een half once, en vier oncen Rosen-honig.

Doogaans gebeurt het, dat de stank der bevatte stoffe, door zodanige afschilferingen, vermindert, maar in dit geval had zulks geen plaats. De opening was groot genoeg en op eene bekwaame plaats, om de stoffe te laten wechloopen; maar, dewyl verscheide *carieuze* ribben veel konden toebrengen tot de ondragelyke verrotting en stank, en de opslorping van de etter in het bloed de toevallen onderhield, en den dood zoude verwekken, wierd beslooten, op de best mogelyke wyze, de bedorve ribben in de gezonde deelen wech te neemen.

Eene, en wel de eerste valsche, ribbe, was, gelyk gezegd is, reeds voor een gedeelte afgescheiden. De drie onderste waare ribben waren sterk aangedaan. Sy wierden bloot gemaakt. De tusschenribbige vaten wierden met verscheidene ligaturen onderschept, waar na de beenderen afgekneepen wierden met een nyp-tang en schar. De lyder was zeer geduldig, maar de operatie moeyelyk, uit hoofde van den ondragelyken stank van eene vlugge, rotte, stoffe, hoedanigen ik voorheen niet gekend had, en welke schielyk zyne ademhaaling scheen te zullen beletten. De verettering was in de huid en het vleesch rondom de beenderen, welke kortlings afschilferd waren, maar niet op den grond van de wonde. De daar onder leggende long, met

eene

eene dikke en donkere huid bekleed, was aan het borstvlies en de ribben vast gegroeid, en beweegde zich in het geheel niet by de in- en uitademing.

Veertien weeken verloopende zynde, was, on-aangezien alle zorg en goede oppassing, de toestand meer verslimmerd, dan verbeterd. De regter arm begon te zwellen, en wierd *œdema-teus*, van de schouder tot het einde der vingers. Uitwendige middelen konden niet helpen tot de verdeeling. Het plukfel en de compressen, welke over de wonde gelegd wierden, begonnen groen te worden, gelyk van koperroest. Een uitteerende loop nam fyne overige kragten wech, en hy stierf in de negentiende week.

De opening van de Borst na den dood toonde, behalven eene volkome verharding der long, overal tekenen van eene ongewoone verrotting, welke zoo wel de zachte als harde deelen in de borst had aangegrepen; de wervelen van den rug waren zelfs niet onaangeraakt, offchoon zuiverende en de verrotting tegenstaande middelen, den geheelen dag, in de borst gespootten waren.

4.

De Koetsier van een' Heer, hier in Stockholm, dertig jaaren oud, had, na eene voorafgaande *pleuropneumonia*, behouden eene verzweering, en

ope pypzweer in de borst, aan de regter zyde twee overdwarsche vingers onder den tepel. Hier mede kwam hy in den zomer van het jaar 1755. in het Hospitaal. Hy was zeer mager, had eene kleine, raffe, pols, zweette 's nagts, loosde met den hoeft veel bloederige etter, en kon op beide zyden liggen. De opening van de pyp-zweer wierd verwyderd, waar na de etter gemakkelyker uitliep, met behulp van zuiverende inspuitingen. Na veertien dagen had de etter den kwaaden stank verlooren, verminderde, en wierd dik. Eerst om den anderen en vervolgens om den derden dag wierd eene inspuiting gebruikt uit een afkooksel van de *Rad. Symphyt. maj. cum aq. calcis secunda*, doiren van eijeren, gemeenen honig, en *Bals. Peruv.* in eene gewoone proportie. In de agtste week verdweenen de toevallen, de wonde wierd geneezen, na dat hy, te gelyk met de uitwendige behandeling, by aanhoudenheid gebruikt had bloedzuiverende en wondheelende borst-middelen.

5.

Een afgedante Soldaat van het Regiment van Södermanland, een- en veertig jaaren oud, had, voor eenige maanden eene zwaare heete borst-ziekte, ongetwyfeld eene *pleuropneumonia*, uitgestaan hebbende, gekreegen een hard gezwel, welk met veele openingen doorgebrooken was aan de regter zyde van de borst. Dus kwam hy in het Hospitaal in 1755.

De *músculus pectoralis major* en *ferratus anticus* waren zeer hard, en als vereelt op het aanraaken. By derzélver vasthegtingen, of liever tusschen de tanden of hoofden, wierden verscheide, deels gesloote, deels ope, pypzweeren gevonden, welke eene dunne bloederige etter gaven, maar niet in eene genoegzaame quantiteit: hy had eene geringe koorts, zweette sterk, haalde eenigzins moeyelyk adem, en kon liggen op beide zyden. Syn tandvleesch was meestendeels verteert van de scheurbuik, en bloedde nog geduurig, wanneer het wierd aangeraakt; gestaadig wierden over de verharde spieren weekmaakende pappen gelegd, en, na dat ik de eene en andere pyp-zweer geopend had, wierd het ongemak in eenen ongeneeslyken staat gevonden; want 1. waren de spieren op zich zelve op eene ongewoone wyze verhard, en bloedden zeer sterk, indien sy by het openen der pyp-zweeren aangeraakt wierden. 2. Konden sy niet week gemaakt worden door pappen en eene sterke verettering. 3. Waren sy ondermynd deels boven deels onder de ribben door de pyp-zweeren. 4. Wierden de ribben op verscheide plaatsen aangedaan, zagtl, zeer verteert gevonden, en de hoogste graad van scheurbuik was voorhanden. De dienstige midelen tegen alle omstandigheden wierden gebruikt, doch te vergeefs. Het pluksel, over de wonde gelegd, de drukdoeken, en zwagtels, wierden groen, als of sy gedoopt waren

in water van koper-rood. Na dus agt-tien weeken veel uitgestaan te hebben stierf hy.

6.

Een Ruiter van het Lyf-Regiment, veertig jaaren oud, sterk en grof van leden, kwam in de Lente van 1758. in het Hospitaal. Na het zydenwee was gevolgd eene verzwearing in de regter zyde, welke openbrak met eene opening drie vinger-breette onder den tepel. Deeze gaf geele etter, doch noch in eene rykelyke quantiteit, noch van eenen kwaaden reuk. De gewoone toevallen waren dragelyk, en de kragten nog genoegzaam.

De opening wierd verwyderd. De inwendige holligheid wierd gezuiverd en uitgespoelt met inspuitingen, driemaal 's daags. In de tiende week, na dat hy in het Hospitaal was, kreeg hy eene nieuwe etter-koorts, welke verminderde, zoo dra de nieuw gekookte etter eenen weg vondt, maar in eene alledaagsche tusschenpoozende koorts veranderde. Met nut wierd de koorts-bast daar tegen gebruikt, tot dat de koorts volkomen ophield, zelfs twee of drie weeken daarna. (Deeze omstandigheid heeft ook plaats gehad by den voorgaanden zieken van deeze soort, by welken het gebruik van den koorts-bast insgelyks even nuttig was.)

In de zevende week, en wanneer de opening van het ongemak zich tot geneezing schikte, kreeg hy wederom eenen sterken aanval van koorts met eene steekende pyn rondom de wonde, binnen de ribben. Aderlatingen, verkoelende amandelmelken, verdeelende poeders van kampher, wierden met dezelfde order en levensregeling, als gebruikelijk is in het zydenwee, gegeven; den vyfden dag was de koorts meest wech, de wonde gaf nu eene bruin-geele, stinkende, en overvloedige etter. De opening wierd voor de derde reis verwyderd. Affspoelende, zuiverende, en balsamieke inspuitingen wierden in de borst gebragt, hoedanige in het eerste geval gemeld zyn. Volgens den raad van den Heere DAREL, nam hy 's morgens en 's avonds op een stukje suiker twee droppelen *Bals. Peruv.* tegelyk met den borst-drank. Het loopen der wonde hield kort daar na op, en dezelve genas, zoo dat hy, in goede gezondheid, wechreisde.

Nog vier soortgelyke zieken zyn in het Hospitaal geweest, twee derzelven wierden geholpen, en twee stierven. De gelukkige uitgang van soortgelyke verzweringen in de borst schynt voornamentlyk af te hangen; 1. van den gezonden toestand van het lighaam en der vogten. 2. Zoo de uitstorting van etter is in eenen matigen zak onder de ribben, en niet in de geheele holligheid, konnende de eerste met regt genoemd worden eene verzwering van het borst-vlies,

de laatste een etterborst, gelyk de Heer LE DRAN en andere met regt zeggen. 3. Zoo de ribben niet zyn aangedaan. 4. Als de scherpe etter geene groene kleur mede deeld; want als dit gebeurt, kan ik verzekeren, dat de uitkomst doodelyk zyn zal. 5. Indien 'er met den hoeft veel etter, met of zonder bloed, geloosd word, geeft zulks wel te kennen, dat de long veretterd by de wonde; maar teffens, dat de plaats is bepaalt binnen de aangroeiing van de long met het borst-vlies, zoo dat de etter zich niet kan uitstorten in de holligheid van de borst, maar ontlast moet worden, deels door de *bronchia*, lugt-pyp en keel, deels ook door de wonde; wordende, zoo zich alles wel schikt, geneezen als eene verzweering. In tegendeel word met veel regt een doodelyke uitkomst gevreesd, als de etter in de geheele holligheid is. De etter kan wel, door de doorbooring van de borst op de uitgezette plaats, ontlast worden; maar de eigentlyke oorsprong, of de veretterde deelen, welke by geval van voren in de borst zyn konnen, krygen geen nut van de middelen, die ingespooten worden, maar onderhouden geduurig eene voldoende oorzaak tot eenen zekeren dood.



drukt was. Het gezwel wierd opgeligt met eenen doorstooten draad en haaken, en vervolgens van den grond of de vereenigingen los gemaakt. Maar dewyl het onderste deel een smal aanhangfel had, welk liep naar en zich vereenigde digter aan de *vasa axillaria*, dan men hetzelfde met zekerheid met het mes konde volgen, wierd het afgebonden, om tot verrotting over te gaan, en dus af te vallen. Het gezwel zelve wierd voor deezzen band afgesneeden, en deszelfs zelfstandigheid was klier- en vleesch-agtig. De afgebonde deelen vielen met den draad na vier dagen af, door het binden en de verettering. De wonde was vry van verhardingen, en de grond bepaalde zich tot digt by de *vasa* en *nervi axillares*, na dat de huid was naar agteren getrokken van de plaats, waar na toe het gezwel was geschooven. Het verband en de verdere oppassing was als na gewoonte. In de vyfde week, waneer de wonde geneezen was, reisde sy naar huis.

Drie jaaren daarna kwam sy weder in de Stad, en toonde de veranderingen van haaren goeden toestand na de Operatie. Een nieuw en hard gezwel, tweemaal zoo groot, dan het eerste, onbeweegelyk, pynelyk, en met eene donkerblauwe kleur in de huid, had de eerste plaats ingenomen. Hetzelve wierd met regt voor kankeragtig aangezien, en derhalven was het onmogelyk, dit aan te tasten en wech te neemen, zonder zeker levensgevaar. Sy wierd derhalven
ge-

geraaden, verzagtede middelen te gebruiken, en reisde naar huis. Haar lot is verder niet bekend geworden.

2.

Eene Boeren-meid, twee en dertig jaaren oud, uit *Westmanland*, kwam in het Hospitaal in 1756; sy had een gezwel onder den linker arm, zoo groot als twee vuisten; in vier jaaren was het tot deeze grootte gekomen, zonder ander ongemak, dan dat de arm by het leggen tegen de zyde, en in de beweeging, verhindert wierd. De huid daar op was onveranderd. Het gezwel had eenigzins de gedaante van eene halve maan, waarom het middenste en dikste gedeelte los en vry was, en onder de huid zeer laag neerhông. De uiteindens of de hoornen van de halve maan waren beide vereenigd aan de buitenste zyden van het peesagtige deel van de *musculus pectoralis major*, en *latissimus dorsi*, digt by derzelver vasthegting aan het opper arm-been.

Om dat geene zekere kentekenen van 't geen het gezwel bevatte konden gegeven worden, voor dat het geopend was, kon ik niet besluiten, of het een zak-gezwel, een klier- vleesch- of vet-gezwel zonder zak, was, in welk laatste geval de uitpelling op eene zoo gevaarlyke plaats aan veel bedenkelijkheid onderworpen was.

was. 'Er werd derhalven beflooten het gezwel af te binden en te laten verfterven. De grond was, gelyk gemakkelyk te begrypen is, zeer breed, fchoon het gezwel vry ver van het lighaam hong. Een bekwaam koord wierd om den hals van het gezwel gebonden en toegedraaid, even als een *Tourniquet*. Dit wierd zoo vaft gemaakt, dat het niet kon te rug fchuiven. De huid was zeer dik, en ongevoelig; na vier en twintig uuren was nauwelyks eenig teken van verrotting te bemerken; de band wierd dagelyks, vyf dagen lang, fterker toegedraaid. Men bemerkte toen, dat door deeze toebinding wel de huid en het vetvlies, maar niet het inwendige van het gezwel aangedaan wierd, welk eigentlyk moest wechgenomen worden, terwyl men de huid diende te fpaaren, derhalven wierd eene naalde met eenen dubbelen en fterken draad midden door den hals geftooken, en zoo dicht aan den oxel, als de voorzigtigheid toeliet. Deeze draad wierd vervolgens van een gefcheiden, en afzonderlyk geknoopt om elk deel van den hals van het gezwel. Daarop volgde in twee dagen eene volkome verrotting in het gezwel; de grootfte ftukken wierden by elk verband wechgenomen. Eindelyk zonderde zich door de verrotting en verettering de hals af. Dewyl het gezwel nu ten eenenmaale verrot was, kon dezelfs zelfftandigheid niet onderscheiden worden, maar om te oordeelen volgens de week- en olyagtigheid, geloof ik, dat het zuiver vet geweest is. De wonde wierd verbonden met

met *ung. Basil. citr.* en *de styrace*, tot gelyke deelen, tot dat dezelve zich vulde, en vervolgens wierd dezelve, als eene gemeene wonde, geneezen.

De eerste band had de huid en het vetvlies zoo zwaar gedrukt, en doen versterven, dat daar van veel grooter stukken moesten afgezonderd worden, dan noodig zoude zyn geweest, op welke wyze de operatie ook was ondernomen. Dit geef ik opregt op, als een misflag, tot onderregting van andere in soortgelyke gelegenheden. Al had ik bedenking voor de *vasa axillaria*, om aanstonds eene naalde met een' dubbelen draad door den hals van het gezwel te steeken, hadden egter de bekleetselen eerst een weinig naar onderen kunnen los gemaakt en dan het gezwel toegebonden worden, 't welk ik vervolgens met vrugt heb in het werk gesteld. Het begin van de *arteria brachialis* lag agt dagen bloot van het celagtig weeffel. In de tiende week was de lyderesse geneezen en verliet het Hospitaal.





I V.

Collectiones seroso-purulentæ absque prægressa inflammatione.

Verzamelingen van etter zonder voorafgaande ontsteeking.

I.

Eene Meid hier in Stockholm, twee- en dertig jaaren oud, kwam in 1754. in het Hospitaal. Agter op den rugge had sy een week gezwel, hebbende den omtrek van een vierendeel van eene el, en strekkende zich uit van den rugge-graat, een weinig onder het regter schouderblad, waar van de *basis* door het gezwel aanmerkelyk opgeligt was.

Sy verhaalde, dat dit gezwel in het voorgaande jaar was ontstaan, zonder voorafgaande zwaa-
re ziekte, doch dat sy anders zederd eenige jaaren van eene zwakke lighaams-gesteldheid, en met pynelyke trekkingen in het lighaam geplagd was geweest. Deeze waren onder het toeneemen van het gezwel dragelyker geworden. Hetzelve wierd niet met pyn verzeld, maar verhinderde de beweeging van het schouderblad

blad daar door, dat de *muscul. omoplatæ*, *levator angularis*, *ferratus anticus major.*, *rhomboides*, sterk opgezet en gespannen waren. De ribben en borst wierden daarenboven gedrukt, en dewyl de stoffe, in het gezwel bevat, door de duidelijke schommeling, gemerkt werd zeer dun te zyn, vreesde ik met regt, dat dezelve eenen weg zoude kunnen zoeken tusschen de ribben tot in de holligheid van de borst; men besloot daarom, het gezwel te openen, en daar van zoo veel wech te neemen, als mogelijk was.

Door middel van eene regte insnyding midden op het gezwel, langs de *basis scapulæ*, door de huid, het vet, en de genoemde spieren, liep de bevatte stoffe, zynde etter met bruin water vermengt, omtrent tot de quantiteit van drie ponden wech. De zak, waar in deeze stoffe lag, had dikke en vezelagtige zyden, strekte zich uit, gelyk in den beginne gezegd is, onder de halve breedte van het schouderblad, en kon derhalven niet uitgepeld worden, maar werd behoorlyk met het mes *gescarificeerd*. Eene rykelyke verettering volgde kort daarop, en de wonde werd gezuiverd. In den beginne werd gebruikt *Ung. Basilic. citr. Balf. arc.* en *ol. ceræ*, als een ettermaakend middel, vervolgens de *Solutio sulphuris cum oleo lini*, gelyk ook andere zuiverende en opdrogende middelen.

Na tien weeken was de wonde overal gevuld met vleesch en geneezen, behaiven een boesem
on-

onder het fchouderblad, welk wel neêr gezakt was, maar door de geduurige beweeging verhin- derde, dat het vleefch zich kon vereenigen, vaft heften, en geneezen worden. Het bin- den van den arm, en de tyd verfchaften hier eene zeer langzaame hulp.

Eindelyk wierd door den Heere HJERTZEL, welke de zorg over dit ongemak op zich nam, wanneer fy het Hospitaal verliet, en woonde in de Noorder Voorftad, gebruikt de *merc. alcalifatus Edimburg. ex hydrargyro dr. iij. Lapid. can- cr. pptt. dr. vj.* om op de wonde te leggen, met goed gevolg, zoo dat het geheele ongemak in de zeventiende week na de operatie volkomen geneezen, en het fchouderblad vaftgehegt was, zonder dat de beweeging van den arm was ver- hinderd.

Omtrent twee jaaren verloopfen zynde, kwam fy weder na het Hospitaal, en verlangde om ge- holpen te worden van een ander ongemak, onder aan de lendenen ontftaan. Dit had binnen agt maanden zich vertoont, in grootte toegenomen, en was in alles gelyk aan het eerfte gezwel, be- halven dat de ftoffe op verfcheide plaatfen door de huid heendrong, en van binnen aantafte de lighamen der wervelen van de lendenen en het heiligbeen, welke te famen gecarieerd waren. Het ruggemerg en de *nervi facri* leeden ook daar mede, en fy kon niet gaan of ftaan, ja loofde de pis en den afgang onwillig. enz. Sy was der- hal-

halven buiten alle hoop van geneezen te konnen worden, ook kon men haar in het Hospitaal niet neemen, maar sy wierd in Danviks-Hospitaal onderhouden, alwaar sy kort daarna stierf.

2.

Een halfwassen knecht, uit *Lovön* in het District van Stockholm, kwam in den zomer van 1756. in het Hospitaal. Na dat hy den geheelen winter met eene anderen-daagsche koorts was geplaagd geweest, en ook een zwaar zyden-wee had uitgestaan, had hy in de Maand April gekreegen een gezwel by het linker schouderblad, digt by de plaats, alwaar de steekende pyn hem 't meest geplaagd had.

Het gezwel was nu in den tyd van tien weken grooter geworden; op het gevoel was het zagt, zoo als het voorgaande, strekte zich uit onder het schouderblad, van deszelfs buitenste hoek twee vinger-breette tot den ondersten. De huid was in kleur onveranderd. Geen eenig teken gaf te kennen, dat tusschen het gezwel en de holligheid van de borst eenige gemeenschap was, welke egter, zoo men op het voorafgaande lette, gemakkelyk kon vermoed worden.

Men opende het gezwel in de lengtte twee overdwarsche vingers van de *basis scapulae*, waar by wederom de *musculus levator angularis* en *rhom-*


boides moesten worden afgesneden. Een bruin water, vermengt met brokjes, als gestold wit van een ey, liep tot de quantiteit van twee ponden daar uit; de zak was zeer los, zoo dat dezelve met geringe moeite, na het wechloopen van de etter, kon naar vooren getrokken worden, en grootendeels diep onder het schouderblad uitgesneden wierd. De trillingen van de spier-vezelen waren hier sterk en aanmerkelyk. De wonde wierd verbonden van het begin tot het einde met dezelfde middelen, welke in het voorgaande geval genoemd zyn. De geneezing wierd zeer schieelyk volbragt, zonder twyfel om dat aanstonds het voornaamste gedeelte van den zak had kunnen wechgenomen worden.

In de elfde week was het schouderblad vereenigt met de onderleggende deelen, en de wonde met een vast litteeken toegeslooten. Dat het ongemak in den grond geneezen was, en op eene andere plaats niet is wedergekomen, heb ik na twee jaaren met vergenoegen gezien, wanneer deeze knegt, by eene reis naar *Swartjö*, toevalligerwyze my overzette met een boot. Dit geval had wel eene ontsteeking tot oorzaak, maar op eene andere plaats, dan waar het gezwel was opgekomen.

3.

Eene vrouw uit *Södermanland* met een voort-
ge-

gelyk gezwel zoude nog kunnen beschreeven worden, welk zonder voorgaande koorts of andere ziekte zich geopenbaard had, en in den herfst van 1756. in het Hospitaal gelukkig geopereerd en geneezen wierd; maar dewyl de twee voorgaande gevallen genoegzaam zyn, om aan te toonen de middelen, welke ter geneezing aangewend zyn, en derzelver uitkomst, meen ik overtollig te zyn, hetzelfde wederom op te haalen.



V.

Atberoma in Meliceridem conversum.

Een groot versmolten Zakgezwel.

Eene jonge juffrouw bemerkte, in haar zestiende jaar, een klein en hard zakgezwel agter op den rugge, welk zyne zitplaats had in den vetrok, en gemakkelyk van de eene plaats naar de andere kon geschooven worden. Het veroorzaakte haar geen ongemak, en wierd derhalven onaangeroerd gelaten geduurende negentien jaaren, zonder dat hetzelve zich merkelyk vermeerderde.

Eindelyk, en na dat sy in deezen tyd in het kraambedge had geleegen, begon het gezwel aanmerkelyk in grootte toeteneemen, behoudende daar by de voorige hardheid en beweging.

Vier jaaren verliepen, zonder dat daar tegen iets gebruikt wierd. Intusschen was het gezwel te groot en te ongemakkelyk geworden, om langer met geduld gezien, en gedraagen te worden. Het ligtte de klederen op, maakte den rugge wanstaltig, terwyl de zwaarte byna in alle leggingen en plaatsingen van het lighaam moeyelyk was.

Ten

Ten laatste wierd het gezwel eenigen tyd be-
smeerd met den *Spiritus arthriticus Di. Pot. (*)*,
waar door het zoo zagt en week wierd, dat
men duidelyk kon bemerken, dat het geen daar
in bevat, en te vooren hard en styf was, nu
was gesmolten, en vloeybaar geworden. Kort
daarna begon sy te bemerken geringe ongewoo-
ne huiveringen en hitte aan de linker zyde, in
den omtrek van het gezwel, en ook in deszelfs
holligheid. Sy wierd te gelyk mager, en vrees-
de voor eene uitteerende koorts, waarom sy be-
floot, om het gezwel met het mes wech te
laten neemen,

Met dit oogmerk kwam sy naar Stokholm in
de lente van het jaar 1757. Sy was nu by de
veertig jaaren oud, eenigzins vet, anders ge-
zond, en met eene verstandige vrymoedigheid
genoegzaam voorzien. Agter op den ruggen
onder het linker schouderblad en aan de zyde
van den ruggegraat, had sy een week zakgezwel,
lang 1½ vierdendeel, en breed een vierdendeel
van een el; het beslooten vogt, welk bemerkt
wierd dun te zyn, en onduidelyk schommelde,
had door de zwaarte het onderste gedeelte
van het gezwel meêr uitgerekt, dan het bo-
venste, welk als leedig, finaller, neêrhong, als
sy regt opstond, maar gevult was, wanneer sy
horizontaal lag.

Na

(*) *Sal. comm. unc. ij. Ol. vitrioli unc. j. Therbinthinae
unc. ij. destill. Spir. ab Aqua separa.*

Na verloop van eenige dagen, en na dat het lighaam voorbereid was, wierd de operatie den eersten Mey ondernomen op de volgende wyze. 1. Wierd eene insnyding gemaakt volkomen van eene halve el langs het zakgezwel, door de huid en vet-rok; het oogmerk was, om door het afschillen der huid van den zak, te komen boven over langs de zyden, en agter den zak, en denzelven uit den grond op te ligten, gelijk met harde zakgezwellen 't best en 't meest geschied; doch wanneer het voorste gedeelte van den zak tot een goede overdwarsche hand aan beide zyden van de opening in de huid was bloot gemaakt, kwam de bevatte stoffe te voorschyn door eene opening, die reeds te vooren aldaar was, of onder het los maaken was gemaakt. De uitpelling kon nu niet verder voortgezet worden, en men was derhalven, 2. genoodzaakt, den zak zelven open te maaken in de lengtte, volgens de opening in de huid, en vervolgens, 3. aan de zyden verder af te scheiden, de voorheen losgemaakte voorste deelen van den zak, 't geen in zoo verre gelukte, dat drie vierde deelen van den geheelen zak wechgenomen wierden. Dezelve had, schoon de stoffe daar in bevat volkomen gesmolten was, nog de dikte van twee of drie lynen, en was inwendig ongelyk. Het uitlopende vogt was donker-geel van kleur, dun en lymmerig, vermengt met verscheide vellen en vliessen, als gestolt ey-wit. 4. De wytte en lengtte van het gezwel vereischte wel eene kruiswyze insnyding
over

over de eerste, wanneer de geheele zak gemakkelijk zoude hebben kunnen uitgepeld worden, maar de byzondere standvastigheid van de lyderesse moest, zoo veel moogelyk was, behouden, en niet tot het uiterste toe beproefd worden; men besloot daarom. 5. de agterste deelen van den zak te laten zitten, welke vereenigt waren met het onderste gedeelte van de *musculus trapezius*, een groot stuk van de *latissimus dorsi* en het gedeelte van de *Rhomboides*, welk naar het schouderblad gaat, om dezelve door den toegang van de lugt en het gebruik van rypmaakende middelen, tot verettering te doen overgaan en te doen smelten. 6. Wierd de geheele wonde en de grond van den zak gevuld met droog plukfel, bedekt met drooge drukdoeken, ferveetten, en den schouderband, gelyk gebruikelijk is by ongemakken aan de borst.

Tegen den avond van den eersten dag wierd reeds eenige koortsige beweeging bemerkt, met klemmingen over de borst; de ader op den arm wierd aanstonds geopend; en men gebruikte dan de verkoelende poeders met kampher van de Lyf-artz en Ridder Rosén, dan amandel-melken. De toevallen waren daar door welhaast wechgenomen, zonder dat sy weder kwamen.

Op den zesden dag begon de wonde in de kanten etter te geeven; sy wierd toen verbonden met *Ung. basil. citr. bals. arcae. ää unc. iij. ol. amygd. dulc. unc. iij. ceræ gtt. xvj.* Den agtsten

dag was de geheele wonde in verettering, en het eerste verband wierd wechgenomen. De grond en zydelyke deelen van den zak wierden dagelyks gevuld met droog plukfel en het genoemde ettermaakend middel. Door de eene en lange infnyding, kon, gelyk voorheen gezegd is, de grond van den zak niet uitgepeld worden. In de binnenste vouw onder de bekleetselen tusschen den grond en de voorste zyde, wierden, om dezelfde reden, eenige gedeeltens van den zak gelaaten.

In het begin van de derde week na de operatie was wel de geheele omtrek van de wonde in de lengtte en breette in verettering, maar met dat onderscheid, dat op de plaatsen, alwaar de zak reeds wechgenomen was, nieuw vleesch schielyk opgroeide, om de wonde te vullen en te geneezen; daar in tegendeel op den grond, en in het byzonder in de binnenste hoeken, alwaar de zak door de verettering verteert wierd, dit langzamer ging, vooral met opzigt tot het opgroeijen van het vleesch, welk ook bleeker van kleur was, als uit eenen meêr harden grond voorspruitende. Om de verteering schielyker te bevorderen, wierd een weinig gebrande aluin in het gewoone ettermaakend middel gedaan, op plukfel gesmeerd, en op de genoemde plaats gelegd; maar de lyderesse kreeg daar van eene sterke branding en pyn, welke noodzaakte, daar mede op te houden.

In de derde en vierde week hoefte fy zeer fterk, waar tegen eenige verzagting te weeg gebragt wierd door warme doeken, naarftig op den rug gelegd; maar wanneer de hoeft met pyn en drukking op de borft begon aan te nemen de gedaante van eene dubbele anderendaagfche koorts; wierd daar tegen met veel voordeel het poeder van den koorts-baft gebruikt; de genoemde toevallen hielden op, en kwamen niet weder.

In de zevende week was de wonde, met goed vleefch, meeftendeels gevuld, zoo dat de vereeniging met voordeel kon ondernomen worden. Onder de diepe lappen van de huid, voornamentlyk aan de linker zyde, verzamelde zich nog etter, welke niet vry kon uitloopen, derhalven wierden nu fmalle en veeldubbelde comprefsen op de zyden van de infnydinge gelegd, om de afgefcheide deelen famen te voegen, waar door het opfchietende vleefch zich kon vafthegten, en de verzameling en verdere ophooping van de etter belet worden. Deeze comprefsen wierden te gelyk met de wonde vaf en tot een gehouden door bekwaame hegtpleifters. Op deeze wyze bleef het verband nog drie weeken zitten, en in deezen tyd maakten de zydelyke deelen zich meêr en meêr vaf, de etter verminderde, de wonde wierd geneezen aan het bovenfte en onderfte einde, met een diep en vaf litteeken. Om een proef te neemen, en de geneezing meêr te verhaas-



ten wierd de *merc. alcal. Edinb.* gebruikt op den grond der wonde, en onder de voorste kanten, geduurende eenige dagen, maar dewyl het lighaam sapryk was, en het vetvlies wel gevuld, wierd de ontlasting daar door sterker, waarom ook daar mede wierd opgehouden. Van dien tyd af wierd de wonde verbonden met droog plukfel, waar over gelegd wierd een lange en breede reep van het *Empl. de Griseo*, om de kanten neêr te drukken, daar over wederom en aan de zyden de gewoone drukdoeken, hegtpleisters, servetten en schouderband. In de dertiende week na de operatie, en wanneer de wonde voor drie vierde deelen geneezen was, reisde sy van Stockholm. In de zestiende week is de geheele geneezing volbragt.

Sy is vervolgens wel geweest, uitgezonderd, dat sy, even als andere gekwetsten, in het litteken pyn voeld, wanneer het weder veranderd, en vooral als het zal waayen.


Ik heb vervolgens geene gelegenheid gehad, om te beproeven, of de bovengenoemde *Spiritus*, gesmeerd op voortgelyke harde zakgezwellen altyd week maakt, en doet smelten de bevatte stoffe, gelyk in dit geval gebeurde. In dit geval blyft de vraag. 1. Of men de opening en uitpelling van het gezwel niet moet uitstellen tot dat het volkomen zagt geworden is? 2. Of niet eene langwerpige insnyding door de huid en den zak, tot dat de stoffe daar uit loopt, genoeg-

noegzaam is, om door toekomst van de lugt, en het gebruik van ettermaakende zalven, den zak te verteeren en te doen verdwynen? De operatie word dan oneindig korter en by gevolg minder pynelyk. Met kleine honig-gezwellen, die veretterd zyn, heeft dit dikwils gelukt; en met de groote heeft het niet mislukt, gelyk het voorgaande geval onder N^o. 1. van dit vierde artikel toont. Het sterkste bewys, dat het mogelijk is, zulke vliesige zakgezwellen te doen smelten, word genomen van geopereerde darmbreuken in den balzak, of water-breuken in het celagtig weeffel langs den zaadstreng. In het eerste geval ziet men de verlenging van het buikvlies, welke den breukzak gemaakt heeft, na dat dezelve geopend is, en de darmen wederom in het lyf gebragt zyn, volkomen wechsmelten, met vleesch en een vast litteken toegaan. In het laatste smelt ook het celagtig weeffel, welk in een sterk vlies veranderd is, volkomen door de verettering, hoewel men in de meeste gevallen, zelden of in het geheel niet, waagt, om den zak wech te neemen, dewyl de zaadvaten zich uitbreiden, en loopen langs den agterkant van den zak. Ik weet ook niet, of de raad van den Hoogleeraar ALEXANDER MONRO (*Aët. Edimb. Tom. V. Part. 1. pag. 391. Altenb.*) noodig kan zyn, om den zak gemakkelyker te verteeren in eene water-breuk, om namentlyk de Operatie te beginnen met een brandmiddel op de uitwendige deelen van den balzak over de verzameling van




van water gelegd, om daar mede den zak eerst te doen ontfteeken, het water te laten wechloopen, en zoo veel te fchielyker eene volkome en goede verettering te weeg te brengen. De pyn word daar door verdubbeld, en ik herrinner my geen een voorbeeld van eene water-breuk, welke ik van anderen heb zien opereeren, of die ik zelve geopereerd heb, waar by niet de zak, zoo alles anders wel afliep, zeer gemakkelyk wechsmolt.





HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN DEN BUIK, RUGGE, EN DE TEEL-
DEELLEN.



I.

Paracenthesis Abdominis in Ascite.

De buiks-doorbooring in eene Buik-waterzugt.

Het Hospitaal is van het begin tot op
H deezzen dag geduurig vol geweest met
waterzugtige lyders; een groot getal
van deeze, by welke men nog eenigen grond had,
om de geneezing te hoopen, dewyl de inge-
wanden welgesteld waren, zyn door de goede
voorzorg der Geneesheeren uit 'sdoodsgevaar
gered en gezond gemaakt; waar van het berigt
van den Lyf-artz BAECK in de Verhandelingen
van



van de Koninglyke Academie der Weetenſchappen voor het jaar 1754. en 1755. tot een genoegzaam bewys verſtrekt.

Daarentegen is ook een tamelyk groot getal van zulke waterzugtige by het eerſte inkomen, zoo bedorven door de verſtopping en ontaarting der darmen geweest; dat men aanſtonds hunnen dood kon voorzeggen.

Het Hospitaal is evenwel genoodzaakt geweest, zoo om het gemeen te vreedten te ſtellen, als op het verzoek van de elendige, van zoodanige in te neemen. Van daar is het gebeurt, dat, wanneer de, anders voldoende, inwendige middelen geene waare hulp konden aanbrengen, ik ſomtyds, om te voldoen aan het verlangen van de Geneesheeren van het Hospitaal, en tot verligting der zieken voor eenigen tyd, het water met de troiquart op de gewoone wyze afgetapt heb; maar, dewyl ik 'er geen een kan opnoemen, welke wederom gezond geworden is, na dat de doorbooring eens of tweemaal herhaald was, dunkt het my ook onnoodig eenige byzondere gevallen van deeze Claſſe aan te haalen.

Het openen der lyken heeft beweezen de onmogelykheid, om de waterzugt te geneezen; dewyl de buik-ingewanden, het net, de lever, milt, het darmſcheil enz. ſterk verſtopt, verhard, gezwollen, veretterd, ja verrot waren.

Derhalven leert men ook in de buik-waterzugt dezelfde regel, ten opzichte van de voorzeggings, te kunnen in acht neemen, als in een etterborst, dat, zoo de ingewanden, tot beide holligheden behoorende, aangegreepen en verteert zyn, noch het gebruik van inwendige middelen, noch de Heelkundige handwerking de geneezing kunnen aanbrengen.

Daarentegen zoo de waterzugt plaatselyk is, namentlyk in eenen zak beslooten, welke met een ingewand gemeenschap heeft, en zich door eene zwelling der uitwendige bekleetselen te kennen geeft, dan is 'er meêr hoop en raad, om den lyder te helpen; gelyk het met de geneezing ook beeter gaat in eene verzweering van het borst-vlies of aan de borst, dan in een waare etterborst, waar van reeds op fyne plaats gesproken is.





II.

Abscessus in convexa parte hepatis.

Eene verzweering in het bolle gedeelte van de lever.

Een meisje van tien jaaren, klein van ligchaam, en van eene zwakke gezondheid, kreeg in 1752. eene zwaare ontsteeking in de lever (*hepatitis*), welke uit de koorts, en de eigenschappen der andere toevallen gemakkelyk gekend wierd; en, offchoon alle nodige middelen beproeft en in het werk gesteld wierden, om de verdeeling te bevorderen, had dezelve egter niet kunnen te weeg gebragt worden; de hevigheid van de koorts was tegen den twaalfden dag verminderd, maar niet volkomen opgehouden. Eene aanmerkelyke zwaarte had zich vervolgens geopenbaard en dagelyks toegenomen in de regter zyde, waar mede eene sleepende terings-koorts verzeld ging.

In de zesde week van het begin wierd ik verzocht het kind te bezoeken. Het had eene kleine en raffe pols, bleek-geele kleur over het geheele lighaam, en was uitgeteerd, als een geraamte. De regter zyde was zeer opgezet, gespannen, zoo in de rondte, als in de breedte, gezwollen;

zoo dat de *epiphyes costarum*, *regio epigastrica*, en *umbilicalis* in de regter zyde zoo hoog opgezet waren, als of een brood daar onder geschooven was. Het hoogste gedeelte was reeds week van eenig, daar in bevat, vogt. Als een gewoone drank wierd gegeven een openend en verdunnend afkooksel van de *Radices graminis, chinæ, apii, liquiritiæ*. Om de verharding verder week te maaken, wierd over het gezwel gelegd een pap van witte brood en melk. Na dat deeze zes dagen gebruikt was, was het gezwel tamelyk zagt, en de schommeling van de etter dui- delyk te bemerken. Toen wierd in het hoogste en zagtste gedeelte eene insnyding gemaakt, ter lengtte van een half vierendeel van eene elle; uit de opening liep meêr dan anderhalve stoop geel-groene etter. De hoogte van het gezwel verminderde; het ronde gedeelte van de lever wierd door de opening gezien, en bleek een weinig ongelyk, maar niet hard te zyn. Steek- wiken van fyn plukfel, aan draaden vast ge- maakt, wierden in elk einde van de insnyding gestookten; het overige wierd met een lapje linnen bedekt, waar op gelegd wierden pluk- fel, een pleister, en compressen, met een rond servet en den schouderband volgens de gewoo- ne wyze vastgehouden wordende. In de eerste vyf dagen moest het verband, twee of driemaal 's daags, veranderd worden, van wegens de veelheid der uitvloeyende etter, Tot de in- spuiting wierd in 't eerst gebruikt *Decoct. bordei lib. iij. mel. alb. unc. iij japon. alicant. unc. ss.*



De etter binnen tien dagen aanmerkelyk verminderd, en de wonde ruim half geslooten zyn-
de, wierden de inspuitingen agterwege gelaaten. De wonde wierd toen verbonden met *bals. arcæi*, vermengt met eenige druppelen *Tinct. myrrhæ*, & *aloës*. In de vierde week was deeze groote etterzak geheel leedig en uitgedroogt. De wonde gaf, naar maate van de grootte, etter, en floot zich vast toe in den tyd van zeven weeken. De koorts, het zweeten des nagts, de bleeke kleur en de vermoeidheid, waren intus-
schen verdweenen, en de kragten merkelyk toegenomen.

Het byzonderste was, dat eene zoo rykelyke quantiteit van goede etter zich kon verzamelen op eene plaats, welke of in het geheel geen of weinig vet-vlies had, en men bemerkte ook niet, dat dezelve van de verettering van de lever voor een gedeelte gekoomen was. De etter-zak was ook zekerlyk beslooten tusschen den middensten band van de lever en eene vast-groeiing by de kanten van de regter en groote lobbe met het buikvlies, want anders zoude de etter zich voorzeker uitgestort hebben in de holligheid van den buik. Sy is nu volwaslen en volkomen gezond.





III.

Hernia Inguinales & Scrotales.

Liesch- en Balzaks-breuken.



I.

Hernia scrotalis incarcerata.

Eene geklemde Balzaks-breuk.

Een werkman, veertig jaaren oud, was verscheide jaaren geplaagd met eene balzaks-breuk, welke hy zeer onachtzaam behandelde. Hy had wel eenen breuk-band gedraagen, maar zonder nut, want de darmen waren egter neêrgezakt, wanneer hy met de vingers dezelve, niet zonder geweld en moeite, in het lyf te rug bragt.

In de maand January van het jaar 1754. zocht hy hulp in het Hospitaal, maar dewyl 'er toen juist geene plaats ledig was, wierd hy gelaaten in huis by andere medelydende menschen. Hy woonde eene meil buiten de Stad, en moest op

eene fleede over eenen flegten weg gebragt worden.

De Breuk was zederd veertien uuren geklemd, en wierd verzeld door de gewoone toevallen, als pyn in den buik, koorts, braakingen, den hik, en foortgelyke. Aderlatingen en pappen waren na de omftandigheid in den beginne in 't werk gefield; zes- en twintig uuren na de klemming, maakte ik de operatie.

Na dat de ring en zak volkomen bloot gemaakt waren, wilde ik den laaftten niet openen, op dat de lugt geen meêr nadeel aan de darmen zoude aanbrengen, derhalven wierden alleenlyk de gefpanne peesvezelen over en in den ring los gemaakt, welke de klemming veroorzaakten, en toen wierden de uitgezakte deelen met veel gemak naar binnen gebragt. De zak, welke ledig was, wierd toen geopend; de ring en de wonde wierden na gewoonte behandeld. Clyfteeren, en inwendige middelen wierden met alle omzigtheid gebruikt, en eene goede levensregeling in acht genomen. De toevallen, welke op de klemming gevolgd waren, hielden op, de lyder kreeg aanftonds afgang; de uitwendige wonde veretterde in vier dagen, en fchikte zich dagelyks meêr en meêr tot geneezing; de gcheele infnyding was vaft en volkomen geneezen op het einde van de zesde week.

Doch fchoon hy, gelyk gezegd is, vry was
van

van toevallen, en voornamentlyk van die, welke eigentlyk op de breuken volgen, kon hy egter niet tot kragten komen, maar had dikwils koorts, vermoeidheid, minder trek tot eeten, lastige krimpelingen in de regter zyde van den buik, alwaar meêr vastigheid bespeurd wierd, dan in de linker zyde, de afgang was ook gering.

In de negende week ging de lyder door en uit het huis, en wilde inhaalen 't geen hem te vooren geweigerd was, vooral ten opzichte van den trek tot eeten; hy was in syn eeten onmaatig, at erweten, zuur-kool, grutten, en eindelyk stokvisch. Daar op gebeurde het, dat hy, welchen ik nu eindelyk buiten gevaar meende te zyn, en niet meêr bezogt, schielyk geplaagd wierd met buikpyn, eene verstopping, braakingen, koorts, kragteloosheid, koud zweet, benauwtheid, en kort daar op stierf, binnen den tyd van vier- en twintig uren.

De buik wierd geopend na den dood: behalven eenig water in de aangedaane zyde was dat gedeelte van het net en de darmen, welke te vooren was uitgezakt, in een' klomp samen-gepakt, het net tegennatuurlyk verhard, de vliessen der darmen zoo hard, als leder, en het darm-canaal zoo nauw, dat 'er nauwelijks een kleine schryfpen kon worden doorgestooken. Het buikvlies en darmscheil waren door de ziekte eenigzins veranderd; het *ileum* samengepakt, gevuld met onverteerd voedsel,



opgezwollen, en in het vuur overgegaan. De opening van den ring aan de linker zyde, alwaar de insnyding gemaakt was, was zoo wel geneezen, dat de roef nauwelyks konde gescheiden worden van het onaangeroerde. Zoo bedriegelyk is de voorzegging en hoop, welke men anders moest hebben van de medewerking der natuur.

2.

Hernia scrotalis, Entero - epiplocele.

Eene darm- en net - breuk in den balzak.

De knecht van een Laaken - Fabrikeur, vyf- en twintig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1753. uit hoofde van eene darmbreuk in de regter liefch, welke hy reeds vier jaaren had gehad, zonder na hulp om te zien; de uitgezakte deelen waren de darm en het net, de eerste kon gemakkelyk worden ingebracht, maar het net bleef in den balzak zitten. Wanneer hy zich niet zeer veel vermoeide, viel de darm alleenlyk voor de helft uit, maar als hy lang ging, of werkte in den weefstoel, zakte dezelve tot op den grond van den zak.

Hy verlangde hulp, en onderging de operatie. Na dat de huid, het vet, en de zak geopend waren, vertoonde zich het net, welk met een driekant stuk vast zat onder in den balzak,

en

en de darm bedekte. Het net werd open gemaakt, en de darm zonder moeite ingebracht. Vervolgens werd een dubbelde ligatuur gelegd om het net, anderhalven duim breed onder den ring. Het net werd onder den knoop afgesneden, en in de wonde gelaaten, om door de verrotting en verettering afgescheiden te worden. Dit geschiede binnen twaalf dagen; het net zonderde zich wel haast af by den ring, welke daar door geslooten werd en met de uitwendige wonden toegroeide, door een vast litteeken.

In de vyfde week was hy gezond, en kreeg eenen breukband, om het litteeken te ondersteunen, gelyk altyd vereischt word na deeze operatie, uit hoofde van de gewoone drukking der darmen.

3.

Hernia inguinalis, Intestinalis.

Eene darmbreuk in de liesch.

Een knecht van dertig jaaren, woonende in Skone, kwam hier in 1753., om zich te laten opereeren van eene breuk in de liesch, welke hy zederd twee jaaren had. Het gezwel was niet grooter, dan een hoenerrey, maar zeer gespannen, zakte niet altyd uit, wanneer hy regt op stond of ging, maar na voorafgaande buik-

pynen, en winden, maar mede hy voornamentlyk geplaagd was, viel de darm uit, en veroorzaakte hem zwaare pyn, en fchielyk de gevolgen van de klemming, als braakingen, den hik, en meêr andere. Wanneer de darm was uitgevallen, had hy wederom groote moeite, om denzelven binnen te brengen, uit hoofde van de pynelykheid, en spanning tegen eenen nauwen ring; en dus kon hy zich nooit bewaaren voor eene waare klemming van den darm, en de gevaarlyke gevolgen daar van. Hy onderging daarom de operatie.

Om het oogmerk met de infnyding des te beter te bereiken, maakte ik, dat de darm was uitgevallen in den beginne, en eer de infnyding ondernomen wierd; maar, dewyl dezelve begonnen wierd boven den zak, om tot onder aan denzelven te kunnen uitgestrekt worden, wierden de overdwarsche peesagtige spier-vezelen, welke van de *fascia lata* over den ring loopen, afgesneden, waar op de darm, tegen gewoonte, gemakkelyk van zelve in den buik ging. De zak viel neder; verstopte bloedvaten waren van den zaadstreng met het celagtig weeffel tot op de plaats, alwaar de infnyding moest volbragt worden, uitgespreid, en beletten derhalven, dat die kon voortgezet worden, uit vreeze voor eene zwaare, en aan de ballen hinderlyke, bloedstorting, welke moesten gered worden. De lyder moest op de voeten in het bed gaan staan, en door den hoeft de darmen neêrdriven.

ven. Toen leide hy zich wederom voorzigtig neder, en de zak wierd geopend van den ring tot aan den grond. De darm, die zeer gezond was, wierd ingebracht; in den ring wierden van boven kleine inkervingen gemaakt, de wonde wierd verbonden, en na gewoonte behandeld.

In de zesde week was de wonde geneezen; het litteeken wierd met een' breukband ondersteund; inwendig wierden dunne amandelmelken gebruikt; en na vereisch der omstandigheden een clysteer gezet; roode vriesche lappen, gedoopt in water en azyn, wierden gelegd over den buik en balzak. De wonde wierd verbonden met de gewoone zalf van *Bals. arcæi, ung. Basil. citr.*, en *ol. ceræ*. Deeze is, behalven de noodzakelyke veranderingen, de gewoone handelwyze geweest, waar op hy van de breuk bevryd bleef.

4.

Hernia scrotalis completa, Entero-epiplocele.

Eene groote darm- en net -breuk in den balzak.

In het jaar 1753. gaf zich een afgedankte Artelerist by het Hospitaal aan, ruim dertig jaaren oud, voor het overige gezond en sterk, om geopereerd te worden van eene oude darm-breuk, eens zoo groot als een man's hoofd. Men stelde hem voor, aan

welk gevaar de operatie in zoo een geval bloot gesteld was, doch dit verminderde geenen deels synen moed, en verlangen, dat aan syne begeerte zoude voldaan worden.

Na dat hy eenige dagen in het bed gelegen had, en behoorlyk gezuiverd was, wierd de breuk kleiner, en ik kon het grootste gedeelte der darmen tot in den buik brengen. Wanneer ik in begrip was, om de operatie te onderneemen, wierd de balzak ledig, en alleenlyk eenigzins ongelyk gevonden, om dat de zak in een gevallen was. Na dat ik alles geopend had, vondt ik nog twee en een half el van de darmen in den zak. De ring was wel groot, maar zoodanig eene aanzienelyke lengtte van darmen vorderde, uit hoofde van de binnenste, tegenstand biedende, kronkelingen, veel moeite, eer sy konden ingebracht worden.

Schoon het voor deeze darmen, zederd eenige jaaren, ongewoon was in den buik te zyn, en sy met de vingers sterk waren behandeld, als ook aan de lugt eenen langen tyd, welke vereischt wierd, om dezelve in te brengen, waren bloot gesteld geweest, had de lyder byna geene toevallen, wierd gelukkig geneezen, en was in de zesde week in staat, om het hospitaal te verlaten.

Volgens een gewoon en noodzakelyk gebruik kreeg hy een' nieuwen breukband, om het littee-

teeken te ondersteunen; de balzak was geheel en al ingetrokken, en de opening van den ring zoo vast gesloten, dat hy zonder breuk-band kon gaan en staan in het vertrek. Dus zoude het ook zekerlyk zyn gebleeven, als hy altyd even nugteren en bevreesd voor synen toestand was geweest, maar na dat syne ongebondenheid door ontvangen aalmoessen tot den hoogsten top gesteege was, verkogt hy zelfs den breuk-band aan een' anderen, welke zoo eenen noodig had, voor een goedkopen prys, begaf zich op reis met kooplieden, en reisde het land rond. Daarop kreegen de darmen eenen vryen weg, rekten het litteeken uit, en zakten, na verloop van twee jaaren, wederom in den balzak, maar alleenlyk tot de grootte van twee vuisten; ook kon hy met eenen band dezelve inhouden, indien hy het wilde doen.

5.

Hernia scrotalis, Hydro-Enterocoele,

Eene darm en waterbreuk in den balzak.

Een smid, een- en vyftig jaaren oud, begeerde hulp voor eene darmbreuk in den balzak, welke hy op geene wyze kon binnen houden. De breuk aan de regter zyde was grooter, dan twee vuisten, opgezet, en zwaar, maar wierd zagter, zoo dra hy zich op den rugge leide, wanneer de darmen ongedwongen in den buik gingen.



gen met een gerommel, als van water. Deeze man was voor het overige meêr kragtenloos, dan de ouderdom van vyftig jaaren doorgaans medebrengd. De Buik was gespannen, maar 'er vertoonde zich geen uitwendig gezwel; de balzak was flap, en op verscheide plaatsfen ontveld door een kwalyk riekend en bestendig zweet.

De operatie wierd verrigt op de gewoone wyze, behalven dat de lyder hoog met het hoofd en de borst moest leggen; op dat de darmen in den balzak zouden blyven. De zak geopend zynde, liep 'er aanstonds omtrent zes oncen geelagtig water uit. Twee ellen van het *ileum* wierden daar in gevonden, loodkleurig, en ongezonder, welke aanstonds in den buik wierden gebragt. De uitwendige bekleetselen, het vet, de vliesen, en zelfs de zak van het buikvlies, hadden eene ongezonderde kleur. Voornamentlyk gaven alle, en zelfs de kleinste bloedvaten zeer veel bloed van zich. Sommige wierden onderschept, de kleinste konden na gewoonte met droog plukfel gestuit worden. Des niet te min kwam uit deeze vaten zeer veel bloed, welk in agt- en veertig uren driemaal het geheele verband doortrok, dat derhalven telkens vernieuwd wierd. Nieuwe onderscheppingen konden niet gemaakt worden, dewyl het bloed door alle uiteindens der vaten in het vleesch en de zydeleke deelen der wonde kwam. Plukfel, gedoopt in warme wyn azyn, stilde eindelijk de bloedstorting. Tot

Tot op den derden dag was het verband droog, en wierd niet aangeroert. De lyder had geen koorts. Den vierden wierd de balzak zes of agtmaal zoo groot, paersch, had een' kwaaden reuk, en gaf eene stinkende stoffe, welke het geheele verband vogtig maakte. De pols was klein en ongelyk, de handen waren koud, en een rykelyk zweet voorfpeelde eenen onvermeidelyken dood. Eene amandelmelk met den koorts-bast, en versterkende dranken met Rhynfchen wyn, wierden, by beurten, gebruikt. De wonde wierd bevogtigd met *Spir. Sal. ammon.* en *Tinct. Fæt. Lond.*, als ook verbonden met *ung. de styrace*, waar over gelegd wierden zakjes met de beste verdeelende kruiden. Midden op den vyfden dag ftierf hy, na dat 'er *Phlyctenæ saniofæ*, bloed-blaſen, rondom de wonde waren opgekomen, en de opperhuid overal was los geworden. Na den dood wierden alle de uitwendige deelen, gelyk gezegd is, met koud vuur en verrotting aangedaan gevonden. In den buik wierden drie pinten bruin geel water ontdekt, de darmen waren loodkleurig. De lever was groot, eenigzins hard, en geelagtig; de milt klein en bedorven.

Ik moet toeftaan, dat, zoo men op den zie-kelyken ſtaat van deezen man meêr acht gegeven had, de operatie had moeten gelaaten worden, maar ſyne aanhoudende begeerte, om de uiterſte middelen tot alle mogelyke hulp te beproeven, en de hoop van eenen gelukkigen uitkomst

komt by andere , maakte , dat men overzag de beletfelen , welke met eenige waarschynelykheid konden uitgerekend of voorzien worden.

6.

Hernia scrotalis, Epiplocele.

Eene net-breuk in den balzak.

Een knecht van zefstig jaar', had zich voor veertig jaaren, door fterk te ryden, eene breuk in de régter liefch op den hals gehaald. In den beginne kon hy, na genoegen en zonder zwaargheid, het net met de hand terug brengen, en daarom had hy altyd moeite gedaan, hetzelfde met eenen band binnen te houden. Driemaal in de laafte tien jaaren was dezelve, gelyk deeze reis, geklemd, en had niet zonder ruft en bekwaame ftoovingen naar binnen gebragt konnen worden. Meefteendeels was dezelve buiten gebleeven, zoo dat het net zakte op den grond van den balzak, zynde zoo groot, als een middelmaatige meloen.

In de maand Juny 1748. raakte dezelve wederom geklemd, na voorafgaande zwaare buikpynen. De lyder had braakingen, en was genoodzaakt, gekromt in het bed te zitten. De overige toevallen, gemeen aan darmbreuken, waren alle tegenwoordig, doch in eenen minderen graad. Van daar was het, dat ik, onder
een

een aanhoudend gebruik van alle gewoone middelen, in dit geval de operatie opschorte tot den vyfden dag, wanneer ik uit vrees, dat alle de krachten zoude verlooren gaan, en eene gevaarlyke verettering in den balzak zoude ontstaan, hem op de gewoone wyze opereerde.

In den zak wierd gevonden een weinig water. Het net, voor de helft daar in bevat, was zeer dik, uitgezet, in een gerolt, en door middel van twee of drie vasthegtingen aan den grond vereenigt. Dit stuk van het net was het egter niet, welk de klemming maakte, maar een nieuw stuk daar van, welk met het voorige neêrgezakt was.

Na de verwydering van den ring was het niet moeyelyk, het kleine stuk naar binnen te brengen; maar met het overige grootte was ik in den beginne verleegen. Het net zoo wel als de darmen en het darmfcheil, in zeer oude grootte balzaks-breuken, bevindt zich eindelyk beter op de vreemde plaats, dan in den buik zelve, alwaar sy na de terug bringing als vreemde lichamen zyn, dikwils met levensgevaar van den lyder; daarom is men wel gewoon, als zoo eene knelling by eene darmbreuk voorvalt, het kleine gedeelte van den darm intebrengeu, en den overigen hoop in den balzak ongeopend te laten blyven; maar by eene zoo groote uitzakking van het net, moest hetzelfde noodzakelyk na de opening, door den toegang van de lugt,
tot

tot verettering overgaan, versmelten, en door de vereeniging met den ring, de maag en karteldarm naar beneden trekken, niet zonder gevaar en de grootste pijn voor den lyder. Het afbinden had hier eenig ongemak kunnen veroorzaken, offchoon hetzelfde anders in geknelde breuken met bygekomen kleinere deelen van het net onvermydelyk is.

De vereenigingen van het net met den zak wierden losgemaakt, en besmeerd met lauwen roosen-oly; vervolgens, dewyl het niet mogelijk was, hetzelfde uit een te brengen, werd het, na dat de ring genoegzaam naar boven verwyderd was, zoo dik en in een gewonden, als het was, zonder ligatuur in den buik gebragt. Dit ging langzaam voort, en veroorzaakte veel moeite. De eerste toevallen hielden op, zonder dat zich nieuwe openbaarden. Maar de klomp van het net werd boven den ring wel drie maanden lang bemerkt, terwyl de zieke eindelyk in de vyfde week geneezen was, en syn werk wederom waarnam.

Nu is dezelve geheel en al verdweenen; hoe veel kan niet de natuurlyke warmte uitregten tegen de konstige? En dikwils vallen zwaare operatien beeter uit op oude, dan jonge menschen.

7.

Hernia scrotalis, Intestinalis & incarcerata.

Eene geklemde darmbreuk in den balzak.

Een Koetsier van zes- en vyftig jaaren, welke van eene andere inwendige ziekte geneezen was, en zich welhaast inftaat bevondt, om het Hospitaal te verlaaten, had ook eene oude darmbreuk.

In de maand Juny 1755. wanneer hy zonder breukband onbedagtzaam uit het bed opftondt, zakten de darmen tot in den balzak, en wierden aanftonds in den ring geklemd. De gewoone toevallen openbaarden zich, en wierden zeer zwaar. Den volgenden dag, na dat alle proeven, om de klemming wech te neemen, te vergeefs gemaakt waren, was het hoogft noodig, om tot de operatie te komen, maar niets kon hem daar toe overhaalen, ook kon zoo eene gevaarlyke operatie niet tegen fynen wil gefchieden. Dus was 'er geen andere raad overig, dan hem aan de natuur over te laaten, terwyl men voortging met weekmaakende en verdeelende pappen te gebruiken.

Van den tienden tot den agt-tienden dag was hy buiten alle hoop, de breuk gefpannen, de buik opgeblaafen: de aanhoudende braakingen, de hik, het loffen van winden naar boven,
P ryke-

rykelyk koud zweet, paerfche vingers en nagels, eene paerfche kleur in het aangezicht, koude handen, ruifingen in de ooren, byna onmerkbaare pols, moesten nu, volgens gewoonte, een' onvermydelyken dood voorfpellen. De balzak wierd een weinig flapper, als of het vuur daar by gekomen was, maar de ring was even eens gespannen. Deeze toevallen waren zichzelve gelyk van den twaalfden tot den zes- en twintigften Juny, wanneer de darmen onverziens naar binnen gingen, een beeter breukband aangelegd wierd, de lyder de kragten weder kreeg, en gezond uit het Hospitaal gezonden wierd.

8.

Hernia scrotalis, Entero-epiplocele.

Eene darm- en net-breuk in den balzak.

Een man uit *Fahlun*, ruim dertig jaaren oud, zegt in 1754. in het Hospitaal hulp tegen eene kleine balzaks-breuk aan de regter zyde.

De breuk bevatte het grootfte gedeelte van het net, en een klein stukje van den darm, was onpynelyk, en zeer moeyelyk in te brengen. De zak was nooit volkomen ledig, om dat het net op den grond vastgegroeit was. De uitgezakte deelen hadden zich eenen weg gebaant in het celagtig weeffel van het buikvlies, en onder den zaadstreng, zoo dat de

cre-

cremaster, en de zaad-vaten uitgezet waren, vooral op de bovenzyde van den zak, alwaar het net en de darm lagen. De operatie ontdekte dit.

Om des te zekerder den weg te vinden, werd een gedeelte van het net in den balzak gelaaten. Zoo dra de insnyding was gemaakt door de huid, en het vetvlies, kwamen verscheide opgezwollevle en gekronkelde zaadvaten te voorschyn.

Door het wechneemen van den bal had deeze operatie zeer schielyk en wel konnen volbragt worden; maar dewyl ik dit gaarne ontwyken wilde, vergenoegde ik my, om den darm in te brengen, welke onder de operatie op nieuw door den ring drong; latende het net, welk niet kon binnen gebragt worden, in den balzak, tusschen de zaadvaten. Aan den buitenkant van den zak werd eene insnyding gemaakt door den vliefigen zak, en in het net, in gedagten, dat de lugt daar door zoude indringen, het net veranderen, en doen overgaan tot verrotting of verettering. Noch het een noch het ander geschiedde. De lyder was zonder koorts en had geene zwaare toevallen. Het net, in plaats van te veretteren, zwol op, werd hard, en even als vleeschig, volkomen tot de grootte van eene vuist. Dewyl ik zulks nooit zelve waargenomen, of aangetekend gevonden had, wagte ik met tamelyk ongeduld de uitkomst hier van af. Het gezwel en de wonde wierden droog verbonden, de verettering was voldoende. Na drie weken

begon het onderſte gedeelte van het hard geworden net te ſmelten, en ſterker te veretteren, terwyl de overige hardheid ten eenenmaale verdween, en de geheele wonde in de zevende week toegegaan was. Dewyl nu de zak, om de aangehaalde rede, niet geopend was, en ik ook niet wilde overgaan tot het wechneemen van den bal, was de operatie ook onvolkomen. Zoo dra het litteeken in de huid en het vet een weinig mede gaf, viel het net en de darm wederom in den balzak, gelyk in den beginne. Een halfjaar verliep 'er; de lyder droeg den breukband met het grootſte nut, maar was niet te vreedē; hy plaagde my dagelyks, om noch eene reis de operatie te onderneemen, al zoude het beide de ballen ja het leeven gelden.

In het begin van dit jaar kwam hy voor de tweede reize in het Hospitaal, in tegenwoordigheid van den Lyf-artz SCHÜTZER, en den Hr. *Aſſeſſor* ELF. De inſnyling wierd nu gemaakt even boven den ring, en naar de regter zyde, in gedagten om te ontwyken de opgezette zaadvaten. Dit gelukte. Door langzaam te ſnyden kwam ik aan de zyde van den zaadſtreng door den vlieſigen zak tot op het net; en vondt, wanneer de zak naar onderen zoude geopend worden, eerſt de opgezwolle zaadvaten, welke my in de eerſte operatie noodzaakten op te houden; vervolgens zag ik, dat een gedeelte van het net beſtendig in den zak was, en daar mede was ſamen-

mengegroeid, terwyl een ander digt by en langs het voorſte op en neêr uit den buik in den balzak ging. De uitgezakte deelen of de bloodgemaakte breuk wierd gevonden tegenſtand te bieden; en in zoo eene geſteldheid was het verboden, de caſtratie te doen, dewyl het net met den zak, deeze met den zaadſtreng, en mogelyk ook een gedeelte van de darmen met het net inwendig vereenigd waren. Derhalven was 'er niets anders te doen, dan aan de zyden meêr met de vingers, dan met het mes, de opening tot onder in den zak te verlengen, en in het net zelve, welk overal vaſt zat, inkervingen te maaken. Hier van wierd wechgenomen een ſtuk ter breette van drie overdwariſche vingers in het vierkant. Op den geopenden ring, en op den ſtreng wierd een zachte bal van pluſfel gelegd, en de wonde verbonden.

Alhoewel de lyder deeze reis veel leed, waren de toevallen zeer gering. Tegen den vierden dag begon het net zoo wel binnen als buiten den zak, even als de eerſte reis, op te zwellen, hard en vleefchig te worden, tot de grootte van twee groote vuuſten. De bal had hier door noch pyn noch zwellling. De hardheid van het gezwel, de ontſteeking, en de drukking met den vinger, toonden genoegzaam, dat geen darm daar in beſlooten was; en hetzelve was derhalven van die nuttigheid, dat de zaadvaten, welke eerſt over den geheelen zak lagen, neergedrukt wierden tot midden in

den balzak. Dus kreeg ik ruimte, om met verscheide sterke onderscheppingen, en toebindingen van den klomp, zoo dicht aan den zaadstreng, als mogelyk was, denzelven geheel en al in het vuur te doen overgaan, en te laten afvallen. Daar op kwam eene goede verettering in den zak, welke te gelyk met den ring volkomen en vast toe geneezen wierd.

Ik meen, dat deeze operatie niet te volgen is, uit hoofde van derzelve gevaar, op ongezonde lighamen; maar beschryf dezelve omstandig, alleenlyk tot waarschouwing en onderregting.

9.

Hernia Scrotalis, Entero-Epiplocele.

Eene Darm- en Net-breuk in den balzak.

Een man van veertig jaaren had van syne eerste jeugd eene breuk. Dezelve was in syne jonge jaaren van een onkundig heelmeeester kwalik behandeld, en vervolgens verzuimd. De breuk was tot onder in den balzak gezakt, en bevatte den darm en het net. De uitgezakte deelen konden gemakkelyk ingebracht, maar bezwaarlyk binnen gehouden worden, uit hoofde van de wytte van den ring, en deszelfs groote opening. De breukband wierd voor het dertigste jaar niet gedraagen. In 1755. wanneer hy by geval ondienstig voedsel gegeten had,

kreeg

kreeg hy zwaare buikpyn, koorts, kon niet slaapen, en had pyn in het geheele lighaam; de breuk wierd te gelyk gespannen, pynelyk, en kon moeyelyker ingebracht worden. Behalven de krimpelingen in den buik, vooral naar de zyde van de breuk, als ook de genoemde toevallen, had hy geene andere, welke te kennen gaven, dat de darm gekneld of aangedaan was, voornamentlyk, dewyl het lyf door de ontlastingen meêr geledigd was, dan vereischt wierd. Daarentegen bleek het duidelyk, dat het net aangedaan en ontflooken was, zoo wel boven den ring in den buik, als onder denzelven in den balzak.

Den tweeden dag na den aanval deezer ziekte bezogt ik den lyder, en vondt alles, gelyk reeds gezegd is; de balzak was gevult, maar niet styf en gespannen; met gemak bragt ik aanstonds het gedeelte van den darm, welk buiten was, naar binnen; maar het net, welk te voren grootendeels kon worden ingebracht, wilde nu niet mede volgen. Dit, zonder twyffel, reeds vastgegroeide gedeelte, was in den beginne dik, zagt op het aanraaken, en zoo groot, als een hoener-ey, met eenen smallen hals naar den buik toe. Door alle mogelyke hulp, welke de Heeren ROSÉN en STRANDBERG nevens my aanbragten, zoo in- als uitwendig, wierden de toevallen na verloop van drie weeken wechgenomen, en het stuk van het net in den balzak verminderde.

Terwyl hetzelve verminderde, en ik vervolgens alle dag zagties wilde beproeven het gedeelte naar binnen te brengen, door zeer voorzigtig op den klomp te drukken, raasde het daar in even eens, als in een lugt-gezwel (*Emphysema*), wanneer de lugt in het celagtig weeffel zich ophoud. Naderhand, de klomp meer verminderd zynde, hield het geraas onder de vingers insgelyks op; de klomp wierd minder en vaster, zonder hardheid, tot een bewys, dat de celletjes van het net, welke te vooren na de ontfteeking waren opgezet met eene uitgezette lugt, nu samengevallen waren. De lyder kreeg door deeze ziekte een aanmerkelyk voordeel, dat hy, die te vooren geen oogenblik zich kon opregten op de beenen, zonder dat de, daar aan gewoone, deelen in den balzak neêrzakten, dit nu deed zonder ongemak. De hals van den overgebleeven brok in de liefch, welke toen zoo groot was, als een plat duiveney, en nu was verdweenen, floot de opening van den ring, en was waarfchynelyk na de voorgaande ontfteeking daar mede vastgegroeit. Een bekwaame band, vervolgens over den ring en den hals van deezen kleinen brok gedraagen, belette beeter, dan ooit te vooren konde gefchiede, de weder-uitzakking van de breuk.

Hernia scrotalis. Enterocoele incarcerata, accedente gangraena rupta, in inguine dextro absque fistula sanata.

Eene geklemde Darm-breuk in den balzak, aan de regter zyde, door het vuur opengebrooken, en geneezen zonder eene pypzweer.

Van Job. Frid. Schifver.

Een werkman, *Johan Böffa*, van de yzer-fabriek op het Eiland *Elfkarle*, van eene magere en drooge lichaamsgesteldheid, had, volgens syn verhaal, voor vyftien jaar' eene geringe breuk in den balzak aan de regter zyde gekreegen, welke hy toen ter tyd, als een smid werkende, zonder twyfel door iets zwaars op te ligten, zich had op den hals gehaald; ook was deeze breuk hem fomtyds by zwaar werk zoo hinderlyk geweest, dat hy het smeeden moest laten, en ligter werk doen, hoewel de breuk in den balzak niet in grootte toenam, gelyk hy zelfs wist te berigten. Wanneer hy pyn of spanningen in den buik bemerkte, had hy altyd uit eigen beweeging eene teug brandewyn genomen, die, volgens syn zeggen, altyd de pyn verzagt had; maar in vervolg van tyd, geen en toegang tot dit middel hebbende, had hy niets gebruikt, maar zich te bed gelegd, tot dat de pyn overging. Den zeven- en twintigsten Juny 1757.

had hy gegeten ingemaakte falm, welke hy kwalyk gekauwt en doorgefvolgen had, kort daar na bemerkte hy, dat hy fteekingen en krimpelingen in den buik kreeg, welke de volgende dagen aanhielden met verftopping, en fterke branding. De lyder bevondt zich kwalyk, kreeg hoofdpyn, koorts, buikpyn, braakingen en meêr andere toevallen. Den zesden July wierd ik geroepen; de boodfchapper wift my niets van de ziekte te zeggen. By myne aankomft vondt ik den lyder zitten op eenen ftoel by het bed, met beide beenen van elkander, en eene aanmerkelyke quantiteit drekstoffen, onder hem, op den grond leggen.

Het ongemak onderzoekende wierd de geheele regter liefch verftorven gevonden, met eene fterke ontfteeking, die zich drie of vier overdwarfche vingers in den omtrek, en aan de zyden uitftrekte, ook zag men verfcheide openingen in het verftorvene, waar uit de fpyfen en drekstoffen zich ontlafte. De koorts was tegelyk met de genoemde toevallen veel verminderd, na dat de ftoffe ontlafte was. In dit geval was 'er niets anders te doen, dan het verftorvene wech te neemen, op dat men eene zuivere verzwearing zoude kunnen krygen, 't geen dan ook met een fcherp mes gefchiedde. Over de opening wierd eene groote wick van plukfel gelegd, daar over twee drukdocken, en alles wierd vafte gehouden door de *spica inguinalis*. De lyder wierd met decze deelen hoog in het bed

gelegd. Men kon geen ander geneesmiddel krygen, dan bier-azyn, welk ik liet warmen, en met een groot compres uitgedrukt daar over leggen; latende dit verscheide reifen herhaalen. Twee uren daarna wierd de lyder bezogt, welke intusschen eenen rykelyken stoelgang had gehad, waar over ik my niet weinig verheugde.

By het afreisen gaf ik bevel, dat men den volgenden morgen in de Stad komen zoude met berigt van den zieken; deeze was toen nog vermoeid, en had in den nagt eene natuurlyke ontlasting gehad, terwyl de drekstoffen ook op zyde door het verband gedrongen waren. Na den middag bezogt ik den zieken, die drie meilen van deeze Stad, *Gefle*, woonde, en vondt hem zonder aanmerkelyke koorts. By het opneemen van het verband kwamen veele drekstoffen te voorschyn. De darm onderzocht zynde, wierd in denzelven gevonden eene groote verstorve opening. Ik waagde het niet, om te beproeven de geneeswyze van den geleerden en gelukkigen DE LA PEYRONIE, die namentlyk den darm doorsneed, en het bovenste einde in het onderste stak. Het toenaaijen van den darm kon niet geschieden. Ik zonderde derhalven van het verstorvene zoo veel af, als ik kon, doorstak het darmfcheil met eene naalde en gewaschten draad, om den darm in de opening van de wonde te houden, en denzelven daaraan vast te geneezen. Op de opening van den darm wierd ge-

gelegd een wiek, bevogtigd met een mengfel van *Tinct. Myrrhæ, succin. en spir. Thereb.* De uitwendige wonde wierd verbonden met een wiek, bestreeken met een smeersel, gemaakt uit *Pulv. subt. myrrhæ, Thereb. ä unc j. vitell. ovor. N. 2. camph. dr. j. aq. calc. viv. lib. ß.* om nog af te zonderen, 't geen van het verstorvene was overgebleeven. Gedurende agt dagen wierd inwendig gebruikt, alle dag, de koortsbaft tot een dragme, en tegen den avond een poeder tegen de koorts, uit *morf. citr. nitr. pur.* en een weinig kampher. In den beginne wierd de lyder drie maalen 's daags verbonden, dewyl het verband onzuiver wierd, doch na agt dagen maar twee maalen 's daags. De wonde kwam tot een. De lyder begon dagelyks beeter te worden, en was na verloop van agt dagen volkomen gezond; met de levensregeling ging hy drie weeken voort, en met het verband, bestaande in twee compressen en de *spica inguinalis*, eene maand. Zederd dien tyd is de lyder altyd gezond geweest, en heeft geenen aanval der ziekte gehad.

Aan den Schryver van deeze waarneeming heb ik de volgende vraagen gedaan.

1. Of hy niet bemerkt had, waar door de graat van de Salm ontlast was, of door de wonde, of door het fondament?

Hier

Hier op heeft hy den negenden February 1758. geantwoord.

. De graat van de Salm is ongetwyffeld opgehouden geweest in de knelling, en door den verstorven darm in de liefch te voorschyn gekomen, voor myne aankomst, of in myne afwezigheid.

2. Of de wonde geneezen was, zonder pyp-zweer in de liefch?

Den drie- en twintigsten February 1758. antwoorde hy hier op.

. De omstandigheid van den lyder is volmaakt goed: de stoelgangen geschieden door den natuurlyken weg, en de wonde in de liefch is volkomen geneezen, zonder eenige pyp-zweer over te laten, gelyk het gelyke en vaste litteeken genoegzaam bewyft. Ik was niet weinig bevreesd, dat 'er eene pyp-zweer zoude overblyven; maar de goede gesteldheid van den lyder bragt ongetwyffeld veel toe tot syne redding uit het doods-gevaar, en tot de volkome geneezing van de wonde.

* * * *

Tot slot van dit artykel over het snyden der breuken, wil ik nu antwoorden op eenige tegenwerpingen, welke met minder grond gemaakt

maakt zyn, tegen de onderneeming daar van, ten opzigte van het geringe voordeel, welk men daar van heeft in oude darmbreuken en de onzekere uitkomst, wanneer men ongezonde lighamen aantreft.

1°. Word gevraagd, welk aanmerkelyk nut een man, die met eene breuk geplaagd is uit hoofde van de slapheid van den ring, vallende de darmen uit den buik in de liesch of balzak, kan hebben van de operatie, daar de ondervinding leert, dat zulke breuken meestendeels wederkomen, zoo het litteeken niet wel ondersteund word met eenen breukband.

Antw. Het grootste getal van hen, die langen tyd eene breuk gehad hebben, en of uit hoofde van de vetheid met den breuk-band niet dicht kunnen drukken op den ring, en de darmen met het net in den buik houden, of ook, met hetzelfde gevolg, ondienstige breukbanden draagen, kan vervolgens, by de toeneemende wytte van den ring, de darmen niet meêr te rug houden, maar 'er dringt een gedeelte daar van geduurig, of by de minste beweging, voor by het kussentje en zakt neder. Deeze zyn dus aan de klemming van den darm even eens bloot gesteld, als of sy geenen band droegen, 't geen meest gebeurt in jonge menschen en van eenen middelmatigen ouderdom, maar niet by oude van ze.

ven-

ventig jaaren en daar over. Daarentegen hebben sy, die de operatie ondergaan, dit aanmerkelyke voordeel, dat de verwydering van den ring in de *aponeurosis* van den *musculus obliquus externus*, onder de geneezing, toegeslooten word, en sy in vervolg van tyd door den minsten tegenstand van den band bewaard worden voor het geweld en de uitzakking der darmen: maar indien de band na de operatie of in het geheel niet, of onachtzaam, gebruikt word, begrypt men gemakkelijk, dat de darmen en het net, welke te vooren doordrongen, insgelyks, na de operatie den tegenstand van het litteeken konnen verzwakken, zoo veel te meer, dewyl de binnenste opening van den ring in de *aponeurosis* van den *musculus transversalis*, en *obliquus internus* niet open gemaakt en vervolgens geneezen word. De drukking der darmen tegen deeze inwendige zwakke plaats, of de overgebleeve opening der buikspieren, maakt, dat het buikvlies op nieuw moet wyken door den ring of de opening van de buitenste *aponeurosis*, boven het litteeken na de operatie; waar door een nieuwe breuk-zak van het buik-vlies, en een nieuwe breuk gemaakt word, zoo men zulks niet wil voorkomen, gelyk mogelyk is.

- 2°. Word gevraagd, of dit met gevaar verkreegen voordeel kan opweegen tegen het lee-

leevens-gevaar , waar aan de lyder door de operatie word bloot gesteld?

Antw. volstrekt jaa; want, gelyk zoo even bewezen is, zoo een lyder, die eene breuk heeft, en de darmen door den breuk-band niet kan binnen houden, leeft in hetzelfde gevaar, als hy, die 'er in het geheel geen draagd; leggende de darmen over dag in den balzak, en gaande 's nagts, by eene horizontale ligging, in den buik. Hier uit blykt, welk ongelyk gevaar en welke voordeelen volgen van de operatie of als men de breuk onaangeroert laat, daar men in het eerste geval zich zeker stelt tegen de klemming van den darm, en in het laatste overgeeft aan een klaarblykelyk gevaar, en onzeker noodlot. Dat de operatie in zich zelve niet gevaarlyk is, indien 's lighaams ongezonde gesteldheid uitgezonderd word, kan elk een begrypen, die uit de ontleedkunde weet, dat de deelen, welke hier by opengesneden worden en lyden, den lyder niet bloot stellen aan doodelyke toevallen, vooral zoo de darmen niet lang onbedekt aan de uitwendige lugt bloot staan, of te voren reeds ziekelyk zyn.





I V.

Fistulæ perinæi urinose.

Pypzweeren in den bilnaad, waar door de pis ontlast wierd.

Van Joh. Elias Sjöström.

De pypzweeren in den bilnaad behooren niet onder de geringste uitwendige ziekten, welke het menschelyke lighaam overkomen, en zyn ook niet de gemakkelykste om te geneezen. Ik meen hier niet zulke pypzweeren, die na de steensnyding overblyven, of na dat de bilnaad doorboord is, om de pis af te tappen in eene zwaare pis-opstopping, noch ook de zulke, welke op eene verzwearing daar ter plaatse volgen; maar zoodanige, welke haaren oorsprong hebben van eenen, of in het geheel niet, of kwalyk behandelden, druipert, waar van de scherpe stoffe de *glandula prostatica*, de *vesiculæ seminales*, het *veru montanum*, den *isthmus*, of eenige andere plaats tusschen den hals van de blaas en het hoofd der roede doet ontspreken, verzwereen, en opengaan; waar by de vaten op zwellen, en verstoort worden. De sluitspier van de blaas word geprikkeld, om zich sa-

men te trekken, of de pisbuis word nauw en ook wel toegetrokken.

De pis, welke dus binnen gehouden word, of binnen den hals van de blaas, of tusschen denzelven en de ontstooke plaats van de venerische verzwearing in de pisbuis, helpt de scherpe stoffe den weg doorvreeten, dringt langzamerhand door tusschen de *musculi ischio-bulbo-cavernosi* in het vetvlies van den bilnaad, en verschaft zich of aanstonds eenen weg door eene of meer openingen in de huid op deeze plaats, of verspreid zich in het celagtig weeffel naar afgelege deelen, gelyk de deyen, lieschen, of den buik. De *dartos scroti* zwelt op tot eene tegennatuurlyke grootte, word gespannen en ontstooken, raakt aan het veretteren, verandert in eene pyp-zweer, ja gangraeneerd.

Dit laatste geval is zeer gevaarlyk, en vereischt eene spoedige hulp; maar als hetzelve op eene bekwaame wyze behandeld word, en de noodige insnydingen niet worden gespaard, word het doorgaans gemakkelyker geneezen, en ook in korter tyd, dan wanneer alleen door de nauwte en verstopping van de pisbuis, zonder bykomende ontsteeking, op eenige plaats langzaam eene opening gemaakt word in de pisbuis en huid, en de pis daar uit by droppelen uitsiepert.

Het is mogelyk, dat eene en de eerste druipert

pert den lyder kan storten in het gevaar van den hoogsten graad van opstopping van water, eene ontsteeking van de pisbuis, verzwearing, doorbooring en het vuur in het vetvlies van alle omleggende deelen, wanneer hy bloedryk is, dagelyks onachtzaam syn lighaam verhit met dranken, ryden, dansen, en ontydigen byslaap.

Daarentegen krygt een ander, welke veele druipers gehad heeft, maar, zonder andere mislagen te begaan, de hulp alleenlyk op de natuur laat aankomen, gestraft door eene strenge levens-regeling, van den eenen tot den anderen kant eene ongelykheid in de wytte van de pis-buis. De pis loopt wel altyd daar door, maar in eenen dunnen straal, gedraaid als een schroef, of verdeeld in veele stralen. De eene of andere reis vindt men vereeltheden in de pisbuis, vooral dicht by het hoofd, welke deeze ontlasting van de pis veroorzaaken, en ten eenenmaale zoo in substantie als in rondheid gelyken na de gewoone *condylomata venerea*; maar meestendeels is de pis-buis ongelyk in wytte, en als togetrokken op eene of meêr plaatsen. De pis, die altyd met geweld uit de blaas komt, word by de vernauwing of toefluiting opgehouden, en zet de dichtste plaats uit, als een kleine dam, uit welke dezelve langzaam en zelden volkomen door de vernauwing zich ontlast: eindelijk word de pis-buis zoo wyd en te gelyk zoo dun, dat de pis daar door dringt, en zich onder de huid te kennen geeft, eerst met eene

harde zwelling op de pis-buis, maar eindelyk, en als de huid insgelyks doorgevreeten is, met eene pyp-zweer, waar door zich de pis ontlafte, en dit kan gebeuren op denzelfden tyd op verscheide plaatsen van de pis-buis; al 't geen uit de volgende waarneemingen kan begreepen worden.

1.

Fistula colli vesicæ urinosa & callosa.

*Eene vereelde pyp-zweer in den hals van de blaas
met eene aflooping van de pis door
dezelve.*

Een Soldaat een- en veertig jaaren oud, had in den laatsten veldtogt in Finland in 1742, drie weken lang, eene heete ziekte uitgestaan. Na dat deeze ophield, bemerkte hy zeer veel ongemak in het loofen van de pis, daar op begon de bilnaad, de balzak, en regter bal hard te worden, te zweilen, en 'er openbaarde zich eene nieuwe koorts. Eenige weeken verloopende, brak het gezwel met drie of vier pyp-zweeren open, welke weinig etter, maar veel pis, gaven. In deezen toestand had hy tien jaaren zeer ongemakelyk doorgebracht, wanneer hy in 1753. in het Hospitaal kwam.

Op de vraag of hy voor het begin der ziekte
in

in Finland gemeenschap had gehad met besmette vrouwspersonen, en daar van behouden eene ontlasting van geele of witte etter uit de pisbuis, antwoorde hy, dat noch het eerste noch het laatste gebeurt was, en dat hy het met vergenoegen zoude zeggen, om syne gezondheid weder te krygen, als het zoo ware.

De helft van het onderste gedeelte van den balzak, de geheele bilnaad, en de regter dey ter lengtte van drie overdwarsche vingers, waren ongevoelig, hard, en als kraakbeenig. Door deeze hardigheid openden zich drie pyp-zweeren in de huid. De eerste aan den onderkant van den balzak. De tweede twee overdwarsche vingers van het fundament, en de derde twee overdwarsche duimen van den bilnaad in de hardheid aan de regter dey. De pis liep door elk een, wanneer dezelve door de pis-buis zoude gaan. De pis-buis was geslooten, of ongelyk vernauwt, van den boog der schaambeenderen tot aan de blaas. De afgelegene oorzaaken waren zeer onzeker.

De geneezing der ziekte vereischte 1. dat de pisbuis van de blaas tot het hoofd der roede vry en ledig gemaakt wierd 2. dat de verhardingen in den bilnaad wierden wechgenomen. En 3. dat de pypzweeren in de pis-buis wierden geneezen.

Men zegt het eerste oogmerk te bereiken door de *bougies* van den Hr. DARAN eene geheele

le maand te gebruiken. Dewyl deeze al te duur waren, wierden gemarkt, en met hetzelfde nut gebruikt *Bougies* van het *Empl. Stict. Crol. lii. unc. iv. Pulv. Antim. crudi unc. j.*, welke eene sterkere verettering onderhielden. Toen deeze al te sterk wierd, verkoelde men de pisbuis met *bougies*, gemaakt uit het *Emplastrum diapomphol.* fy wierden beide op linnen gesmeerd, na gewoonte, en zederd dien tyd om den anderen geduurende de geheele geneezing gebruikt. De pis had nu haaren vollen loop, en eenige drop-pelen ontlasten zich alleen door de eene pyp-zweer boven het fondament]

Het tweede oogmerk wierd in de eerste maanden bevorderd door het inwendig gebruik van zachte kwikmiddelen, foortgelyke smeersels van het *ung. Neapol.* op de verhardingen, en week-maakende pappen, van haver-gort met het *ung. Altheæ* vermengd, daar over gelegd. Dit rigtte weinig of niets uit. 'Er wierden daarom diepe insnydingen gemaakt in de hardheden, welke vervolgens verbonden wierden met *mell. rosar. inspis.*, *merc. præcip. rub.*, de rand versmolt wel eenigzins, wierd ook schielyk met vleesch gevuld, en wel haast geneezen, maar binnen korten tyd wierd dezelve wederom op nieuw hard. De balzak was nu overal week en gezond, maar de verharding onder tegen het fondament was na verscheide vrugteloose insnydingen en gebruikte *antivenerea* even hard, en

zoo groot als een klein hoener ey, aan de zyden plat gedrukt.

Eene holle sonde, by den grooten toefstel van het steensnyden gebruikelijk, wierd door de pis-buis gebragt, en dezelve van boven naar beneden door den *isthmus urethrae* doorsneedden. In de verharding tegen de deyl wierd eene insnyding gemaakt, zoo diep mogelyk was. De wonde wierd verbonden met *ung. basil. n.*, de verettering wierd goed; de verhardingen in den bilnaad smolten wech; de pis-buis wierd ruim, en de *bougies* van het *Empl. diapomphol.* wierden gebruikt. In de twee- en twintigste week, na dat hy in het Hospitaal was gekomen, en de vyfde na de gemaakte insnyding van de pis-buis, was de wonde geslooten met een zagt litteken. De verharding aan het deyl-been was als een groote muscaat-noot, en scheen te drygen, dat de geneeswyze niet bestendig zyn zoude: de pis ging den natuurlyken weg; hy kreeg op nieuw *bougies* en pleisters, om eenige maanden te draagen, en reisde naar huis.

Twee jaaren daar na, en toen hy, by het gewoone boeren-werk, zich minder achtzaam oppaste, en de *bougies* niet meêr gebruikte, begon de kleine verharding, welke overgebleeven was, te zwellen, en kort daar na zich te openen, als ook aan de pis eenen uitgang te verschaffen, welke sterk met droppels te voorschyn



kwam, wanneer fy zoude gaan door de pis-buis. Hy kwam derhalven in 1756. wederom in het Hospitaal.

Dewyl deeze verharding toen alleenlyk overig was, en tot bewys verstrekte van eene fistuleuse opening, of in den hals van de blaas, of daar over, wierd de holle sonde, by het steensnyden gebruikelijk, wederom in de blaas gebragt (*). Vervolgens wierd de verharding in de diepte tegen de dey uitgesneden, zoo ver met zekerheid kon geschieden. De verharding was zeer wit, en volkomen, als kraakbeen; in den grond wierd de opening van de pyp-zweer gezien; eene gewoone holle zilvere sonde wierd ingebragt om te stooten tegen de sonde in de blaas, waar op een smal mesje wierd gezet, om den hals van de pis-buis en blaas door te snyden, te gelyk met de verharding tegen de dey. Dit geschied zynde, kon ik met den voorsten vinger de geheele verharding by en

(*) In deeze pyp-zweeren is 'er nauwelyks een andere raad overig, dat met de pyp-zweer den hals en sluitspier van de blaas door te snyden, op dezelfde wyze, als eene *fistula ani incompleta* nooit met zekerheid geneezen word, voor dat de rand van het fundament of de sluitspier te gelyk met de pyp-zweer opengemaakt, tot verzwearing gebragt, en geneezen word. Het voorbeeld van den Hr. PETIT in *Mem. de l'Acad. R. de Chir. Tom. I. Part. III. pag. 204. & 209*, spoorde my 't allermeest aan, om dit te onderneemen.

en over den hals van de blaas onderscheiden. Het gebruiken van de *bougies*, gemaakt van *Empl. diapomphol.* werd voortgezet. De wonde werd verbonden met *Ung. Basil. n.*, en *sol. sulph.* tot gelyke deelen, de verharding smolt wech, de wonde werd geneezen, en de pis behield vervolgens den natuurlyken loop, waar mede het derde oogmerk eindelyk bereikt wierd.

Dewyl nu de middelen, in venus-ziekte gebruikelijk, niet het allerminste uitgeregt hebben, is het waarschynelyk, dat zich, na de ziekte in Finland, een *tumor criticus* of verzwearing in het bekken by den hals van de blaas gezet heeft, waar van de rotting, door de pis verergerd, alle de toevallen en ongemakken veroorzaakt had. Eindelyk moet ook aangemerkt worden, dat hy by alle insnydingen zoo geduldig als een houten beeld was, maar telkens eene zwaare toevallige koorts kreeg, die door aderlatingen, salpeter, amandel-melken, en clystieren gestuit wierd.

2.

Fistulæ perinæi urinossæ venereæ.

Pypzweeren in den bilnaad, waar door de pis ontlast wierd, uit eene venerische oorzaak ontstaan.

Een man van agt- en dertig jaaren, in Stockholm woonende, had zich door veele, kwalyk

behandelde, druipers, op den hals gehaald zwaare vernauwingen in de pis-buis, eene gestaadige ontlasting van geel-groene etter, en verhardingen met drie of vier pyp-zweeren in den bilnaad, waar door de pis te voorschyn kwam, Hy kwam in het Hospitaal in 1755. Het bevryden van de pis-buis, het versmelten van de verhardingen, en de geneezing der pyp-zweeren in de pis-buis waren wederom de oogmerken ter geneezing. Na eene genoegzaame voorbereiding door aderlatingen, buikzuiveringen en eene verkoelende diæt, wierden de *bougies* wederom gebruikt, dan van het *Empl. stict. Crollii*, dan van het *Empl. Diapomph.*, zoo als in het voorgaande geval is opgegeeven. Binnen veertien dagen was de pis-buis ledig, en de verhardingen waren merkelyk verminderd; maar om tyd te winnen wierden daar in diepe inkervingen gemaakt (*), die men verbondt met *ung. Basil. n. en mercur. præcip. rub.* De verettering tot stand gebragt zynde, wierden insgelyks dagelyks twee of drie greinen van de *panacea mercurialis* gegeeven. In de negende week waren alle zwaarigheden overwon-

(*) De Heer DARAN spreekt, in syn *Traité des Maladies de l'urethre*, wel niet van inkervingen in de verhardingen, maar alleen van het gebruik des *bougies*. Ik heb ook zelfs gezien en behandeld veele zieken, welke zonder inkervingen geneezen wierden, doch daar by verliep meêr tyd. In een hospitaal zoekt men graag den kortsten weg, om de gezondheid te herstellen, op dat veele noodlyden dedaar aan zouden kunnen deelagtig worden.

wonnen; men raade hem nog eenige maanden de *bougies* te draagen, wanneer hy het Hospitaal verliet.

3.

Fistulae perinaei cum abscessu gangrænofo.

Pypzweeren in den bilnaad met verfterving.

Een groot en vet man, van veertig jaaren, had ook door eenen kwaaden omgang en veele verwaarloosde druipers, zich op den hals gehaalt eene vernauwing van de pisbuis, geduurige ontlasting van etter, en eindelyk eene ontsteeking in den hals van de blaas met eene opstopping van de pis in de blaas zelve of in derzelve hals; waar op volgde eene zwaare koorts, gegangræneerde verettering in het vet en de huid van den bilnaad, met de *dartos* van den geheelen balzak, welke zoo groot als een mans hoofd was. De pis was reeds overal doorgedrongen, en liep uit veele openingen, als door een zeef.

De drie, boven voorgestelde, oogmerken moesten bereikt worden; maar de ontsteeking en verfterving, die door het gebruik van de *bougies* zoude kunnen vermeerderd worden, moesten eerst worden bedwongen; men maakte genoegzaame insnydingen door de huid, en den geheelen dikken vetrok, van de eene opening tot de andere langs den bilnaad: groote verrotte
stuk-

stukken van het vet-vlies kwamen daar uit, en de pis liep grootendeels door de openingen in de pisbuis. De wonde wierd verbonden met *ung. de styrace & solut. sulphur.* van den grond af: de zuivering volgde schielyk, en daarna wierd de wond gevuld met goed vleesch.

Nu wierden ook de *bougies* van het *Empl. diapomphol.* gebruikt, welke de pisbuis ledig maakten. In de negende week waren alle deeze groote en diepe zweeren geneezen en geslooten; maar midden in den bilnaad wilde eene pypzweer overblyven, welke even daar onder gemeenschap had met de pisbuis en de pis door liet; daarop wierden gelegd koekjes, gemaakt van het *empl. stict. Crollii* met gradueele compressen, waar door de pypzweer binnen drie weeken geslooten, en de lyder volkomen wel was.

4.

Fistula perinæi cum abscessu gangrænofo.

Eene pypzweer in den bilnaad met versterving.

Een man van veertig jaaren, van eene middelmatige grootte, mager, maar bloedryk, had door dezelfde oorzaak soortgelyk ongemak, als de voorgaande, gekreegen; namentlyk na veele niet geagte druipers, eene verzwearing, vernauwing en ontsteeking in de pisbuis, en den hals van de blaas, waar op volgde eene op-
stop-

stopping van water, uitstorting en verspreiding der pis door het vetvlies; veroorzaakende eene nieuwe ontsteeking, zwaare koorts, gegangraëneerde verettering in het vet rondom de pisbuis, en *dartos*, met veele pypzweeren in de huid van den bilnaad en balzak, waar uit de pis liep. Met het begin van de ziekte werd hetzelfde gedaan, en gevolgd door eene goede uitkomst tot op het einde van de twaalfde week, wanneer de lyder volkomen geneezen was: inwendig waren verkoelende middelen, en eenige reifen het poeder van den koorts-bast, om te versterken, als ook bloedzuiverende, en koorts-bedaarende middelen, gegeven. De uitwendige pypzweeren wierden tot een gebragt door diepe insnydingen; de verettering, zuivering, en geneezing, wierden door de genoemde middelen bevorderd. De pisbuis werd ledig en opengemaakt met de bovengemelde *bougies*; de overgebleeve pypzweer in de pisbuis wilde zoo min in dit geval, als in het voorgaande, zich sluiten, voor dat de koekjes van de genoemde pleister gebruikt waren. In de tiende week verliet hy, gezond, het Hospitaal.

Ik heb vervolgens deeze koekjes altyd met voordeel in pypzweeren van de pisbuis gebruikt, het zy dezelve uit eene venerische oorzaak ontstaan, of na de steensnyding overgebleeven waren.

Fistula perinaei urinosa, callosa & venerea.

Eene vereelde pypzweer in den bilnaad, uit eene venerische oorzaak.

Een droog en mager man, twee en veertig jaaren oud, had zich ook door eene slegte levenswyze in de beschreeve omstandigheden gebragt; doch het zeldzaamste was, dat hy, een eenzinnig mensch zynde, zonder hulp, de eerste toevallen van koorts, ontsteeking, versterking, en verzwearing had ondergaan; maar na dat hy bemerkte, dat de pis kwam door verscheide openingen in den balzak en den bilnaad, en dat deeze deelen van dag tot dag harder wierden, werd hy genoodzaakt, zich aan te geeven aan het Hospitaal, zestien weeken, na het begin der ziekte.

In den balzak en bilnaad wierden verscheide verhardingen gevonden, die met de pisbuis vereenigd waren, en waar door de pis, geloofd wordende, te voorschyn kwam. Men maakte een begin van de geneezing met de bougies van DARAN (*), geduurende tien of twaalf dagen; ver-

(*) Schoon de kennis, om eene vernauwde of toegetrokke pisbuis te openen, en aan de pis den vryen loop te verschaffen, voor meêr, dan twee eeuwen, bekend was, en van den Hr. DARAN geenzins eerst bedagt of

vervolgens wierden gebruikt die van *Stict. Crollii cum antim. crudo*, en eindelyk van het *Empl. Diapom.*

of uitgevonden is, verdiend hy egter niet minder den dank van het algemeen, dat hy de lyders en geneesheeren aangespoord heeft, byna in alle landen, om op nieuw aan te neemen, en met het grootste nut in het werk te stellen, eene manier, om de litteekens en verhardingen in de pisbuis te smelten, welke tegen het beeter weeten aan was verzuimd of niet genoegzaam gewaardeerd tot op synen en onzen tyd.

Nauwelyks zyn 'er twintig jaaren verloop, nadat ik zieken in deezen toestand elendig heb zien omkomen, als uitgeteerde, daar sy egter, op syne en nu op de algemeene manier door het gebruik van *bougies*, voor den ondergang bevryd hadden kunnen worden. Ik weet niet, of eene mindere kundigheid van de regte oorzaak der vernauwing in de pisbuis, de veragting en het verzuim van de *bougies* heeft te weeg gebragt: want, dewyl de oude altyd uitwassen of *caruncula* aanzagen voor het waare bletsfel in de pisbuis, raadden sy ook het gebruik van bytende en verteerende *bougies* aan, welke de ontfteeking, vernauwing, en het ongemak vermeerderden, en geene verligting aanbragten, dan wanneer sy wierden wechgenomen: maar na dat de ontleding, dat is het onderzoek van de aangedaane plaats na den dood, zoo duidelyk getoont heeft, dat de pisbuis van de oorzaaken in het begin van dit artykel genoemd, zelden behoud eenig ander ongemak, dan eene ongelyke wytte, door vernauwende litteekens, en verwyderde kuiltjes daar tusschen, is de Hr. DARAN, op eene vernuftige wyze, tot de gedagten gekomen, om de geneezing door de verettering te onderneemen. Hy laat zeer moeyelyk ontdekken de manier, op welke hy syne *bougies* maakt, zonder ongemeen groote belooning, om dat hy zich reeds eene aanzienelyke somme gelds verkreegen heeft: ik twyfel, dat hy daar
by

pompholygos. De pisbuis wierd na veertien dagen wel vry en open, maar de verhardingen finol-

by voegd eenige bytende middelen (*escharotica*), maar geloof veel eer, dat syne geneeswyze bestaat in een voorzigtig, naarstig, en aanhoudend gebruik van de *bougies*, dewyl dit ook by andere en my, die de *bougies* van den Hr. DARAN niet gebruikt hebben, even eens gelukt is.

De Heer HEVIN, Heelmeeſter van *Madame la Dauphine*, buitenlandſch Lid van de Koninglyke Sweedsche Academie der Weetenſchappen, en myn geachte correspondent, heeft in ſynen tyd onder andere aanmerkelyke nieuwigheden my doen weten, dat hem zeer, wel gelukt waren *bougies*, bereid uit *Em. l. Diachylon unc. ij. merc. crud. unc. j. Antim. crudi pulver. unc. ſſ*; en de Heer GOULARD van Montpellier heeft groote kuuren gedaan met *bougies*, bereid van gefmolten was, en *acetum saturni*; en daar voor van den Koning van Vrankryk ontvangen een jaarlyks penſioen van zeshonderd livres.

De Heer DARAN intuſſchen heeft, het geheim voor zich houdende, meêr, dan de helft van ſyne konſt, zoo my dunkt, ontdekt. In de voorreden voor de verzameling van ſyne aanmerkingen en geneezingen, heeft hy duidelyk en klaar gezegd, waar in de werking der *bougies* bestaat, waar door hy genoegzaam de oogmerken aan de hand geeft, om, of te ontdekken en op te loſſen ſyn eigen mengſel, of hetzelve na te volgen; en 't geen ſyne geheimen nog meêr ontdekt, is het geduld en de agtzaamheid, welke hy den zieken aanraad, als noodzakelyke hulpmiddelen, wanneer de beeterschap zich niet aanſtonds en na verlangen openbaard. Zoo de pisbuis, zegt hy, alleenlyk het einde van de *bougies* inlaat; dan volgt de verettering in de tegenſtand biedende plaats, waar door de buis door den tyd geopend en vry word; zoo ook de opening van de pisbuis vernauwd was, kon egter

smolten niet wech, schoon fy van fyne komt in het Hospitaal af met het *ung. merc.* en foortgelyke

egter het einde van de *bougies* de verettering opwekken, en de buis verwyderen, byna met meêr vrugt, dan in het eerſte geval, wanneer de *bougie* tot eenig deel in de pisbuis kan gebragt worden.


Dewyl nu de voornaamſte werking beſtaat in het verwekken der verettering, wie ziet niet, dat andere mid- delen en andere *bougies*, welke dit zelfde konnen uitreg- ten, ook aan hetzelfde oogmerk voldoen konnen.

De mogelykheid is aan den dag gebragt, niet alleen door deeze wynige gevallen, welke ik nu als geneezen aangehaalt heb, maar ook door een groot aantal van foortgelyke geneezingen, in alle Landen, en met allerley, zelfs ongelyke, *bougies* te weêg gebragt, doch volgens den-raad van den Hr. DARAN. Van daar is het ook ge- beurt, dat eenige heelmeeſters, welke bevonden, dat hunne *bougies* zoo goed waren, geloofden, de vermen- ging van den Hr. DARAN ontdekt te hebben, niet be- denkende, dat veelerhande middelen dezelfde werking doen, door eene zelfde behandeling.

De *bougies* zyn dan noodig en onvermydelyk. 1. Wan- neer eenig deel van de pisbuis is vernauwt, en den vryen loop van de pis verhinderd. 2. In verouderde en vereel- de verzweeringen by de ontlaſt-buiſjes van de *proſtata*, zaadblaasjes, en kleine kliertjes in de pisbuis, welke meêr of min etter van zich geeven. 3. By harde litte- kens, na kwaalyk geneezen wonden in de pisbuis. 4. Te- gen de zogenaamde vleefchagtige uitwaſſen in oude zwee- ren. 5. als de *proſtata*, *veſicula ſeminales*, *veru montanum* en ſponsagtige deelen van de pisbuis hard en opgezet worden: en eindelyk. 6. Als de pisbuis op de eene of andere plaats doorgegeeten is, gelyk in den beginne reeds is beweezen.

lyke pleisters besmeerd en bedekt wierden. Sy wierden derhalven tegen de pisbuis opengesneeden, en vervolgens door de verettering opgelost. Dagelyks werd ook de *Panacea mercurialis* in geringe giften gebruikt.

In de agtste week na fyne komst in het Hospitaal was hy geneezen en in staat om weder uit te gaan. Syne byzondere zinnelykheid moest egter op eene andere manier syn leeven verkorten. Hy huurde eene zeer verre woening in de voorstadt *Konigsholm*, leefde van grof brood en water, waarmede hy de darmen vulde, zoo dat eene doodelyke verstopping daar op volgde. Wanneer hy te laat merkte, dat deeze omstandigheid nadeelig zoude zyn, begeerde hy wederom myne hulp. Hy was reeds buiten alle hoop, en stierf in 1745. Syne dikke darmen waren zoo opgevuld met harde drekstoffen, dat sy noch de wormswyze beweeging konden verrigten, noch verder eenige stoffe doorlaaten.





V.

Fistula inguinalis complicata.

Eene samengestelde pypzweer in de liesch.

Door lyders met pypzweeren in de lendenen, en die tot in de gewrigten doordrongen, met of zonder beenbederving, is het Hospitaal al te dikwils bezocht. Beklaagelyk is het, dat aan zulke elendige zoo weinig hulp heeft kunnen toegebracht worden, uit hoofde van den slegten en ongeneeslyken toestand, waar in sy gebragt waren, deels door den diepen oorsprong der ziekte, deels ook door de verwaarloofing, wanneer 'er nog eenige tyd tot redding was. Een voorbeeld zal genoeg zyn, om de waarheid daar van te bewyzen.

Eene Dienstmeid, zes- en twintig jaaren oud, uit het district van Stockholm, gezond en fris tuitziende, was eenige jaaren geplaagd geweest met vliegende jigt-pynen, die haar in den herfst en de lente 't meest lastig waren. Voor drie jaaren had de jigt overgelaaten een gezwel op het regter opperarms-been, welk eindelyk tot verettering overging, en na eene afschilfering van het been van den grond op genas. In het volgende jaar had de jigt-stoffe zich wederom

vaftgezet in de regter dey by het bovenfte gedeelte van het been. De zwelling, die daar op volgde, ging over tot verettering, gaf veel geele etter, maar veranderde by gebrek van toerykende openingen in den beginne in eene pypzweer.


In den zomer van 1757. wanneer fy zich voor 't eerft by het Hospitaal aangaf, had fy in de vouw van de regter dey anderhalven duim onder den band van *Fallopis* een hard gezwel, zoo groot als een hoener-ey. Digt daar by was eene pypzweer, waar door de sonde zonder geweld gebragt wierd; 1. onder den genoemden band en tot onder in het bekken; 2. regt naar beneden tegen den *trochanter minor*, voorby harde gezwollen en het deybeen. De gemelde zwelling wierd geopend, en daar uit wierd gehaald een los en afgeschilferd ftukje been, zoo lang als een' duim, hol aan de eene en rond aan de andere zyde, zynde duidelyk een derde gedeelte van het dey-been aan den voorkant tuffchen de twee draaijers.

De plaats, van waar dit gekomen was, was toegegroeid, zoo dat het dey-been niet meêr gekend wierd. De verzweering wierd binnen drie weeken op de gewoone wyze geneezen. In de verhardingen van de pypzweer wierden inkervingen gemaakt, en dezelve verfmolten met *merc. præcip. rub.* en *mell. rofar. infpis.* Infpuitingen met *tinct. myrrhæ* & *aloës* fcheenen de
ver-

verborge wegen op te droogen. In de agtste week, wanneer fy wechging, gaf de pypzweer weinig of in het geheel geen etter. Vier maanden daarna kwam 'er wederom een nieuw gezwel op de dey, gelyk in het eerste begin.

Terwyl fy veertien dagen wagten moest na eene plaats in het Hospitaal, wierden verdeelende en weekmaakende pappen rondom de lydende deelen gelegd. De zwelling volgde wel haast, en vertoonde zich nu op twee plaatsfen. 1. In de eerste pypzweer onder den band van *Fallopius*. 2. onder de bil agter aan de regter dey, een weinig agter de *tuberositas ossis Ischii*. Deeze laatste plaats brak open, en gaf veel etter. Na dat fy voor de tweede reis in het Hospitaal was, wilde ik beproeven de mogelykheid, om tusschen deeze openingen gemeenschap te maaken. Maar noch de sonde noch de inspuiting kon eenen weg vinden, tusschen de ongelykheden van de pypzweer: De sonde en *bougies* konden wel gebragt worden onder den band over de *eminentia ilio-pectinea ossis pubis* naar beneden, byna tot midden voor den *musculus obturator internus*, maar niet verder. Van de agterste opening ging de sonde gemakkelyk tot de vasthegting van de regter lip in den bilnaad tusschen de *margo ossis Ischii* en de *plexus cavernosus vaginae*, maar kon niet naar boven komen, om te raaken aan de eerstbeschreeve, en tot in het bekken neêrgaande, pypzweer.

Dit lukte ook niet met inspuitingen, en dewyl de pypzweer ongetwyfeld onderhouden wierd door inwendige vereeltheden of beenbederving, welke niet konden versmolten of wechgenomen worden, wierd sy geraaden, om een mineraalwater geduurende den zomer te gebruiken. Kort daarna kwam 'er een beenschilfertje uit de opening onder de bil, waar na beide pypzweeren zich dagelyks tot geneezing schikten, 't geen ook geschiede binnen eene maand met een vast en diep litteeken.





V I.

Sarcocoele.

Eene Vleesch-breuk.

I.

De knegt van een' goudsmid, twee- en twintig jaaren oud, zocht hulp in het Hospitaal in 1755. voor eene zoogenaamde vleesch-breuk; de regter bal was zeer hard, en zoo groot, als een ganzen-ey. Aan den binnenkant tegen de streep van den bilnaad wierd gevonden eene pypzweer met weelderig vleesch, welk met den bal vereenigt was.

Geen voorgaand venerifch ongemak had daaraan eenig deel, maar hy meende, voor drie jaaren, door al te fterk te ryden, den bal geklemd te hebben, konnende hy daar van het begin en de toeneeming rekenen. Een jaar daarna had het ongemak zich tot verettering geschikt, 't geen ook gedeeltelyk geschiede, terwyl het openbrak, en de beschreeve pypzweer overliet, zonder dat de gezwolle bal daar van verminderde. Alle beproefde middelen, om de verdeeling te weeg te brengen waren vrugteloos geweest, derhalven bleef 'er niets overig, dan het wechneemen van den bal.

Na eene genoegzaame voorbereiding wierden de uitwendige bekleetselen van den ring tot aan den grond van den zak geopend; de zaadstreng, welke in eenen natuurlyken staat was, werd van den *cremaster* en het celagtig weeffel losgemaakt. Ik had voorgenomen, volgens den raad van den Heere LE DRAN, de zaad-flagader van de overige bloedvaten en zenuwen af te scheiden; maar schoon alles met gemak en bedagtzaamheid verrigt wierd, kon de flagader deeze reis niet gevonden of afgezonderd worden (in lyken, waar in de vaten meêr bleek en zonder bloed zyn, is dit gemakkelyker te doen), de ligatuur wierd derhalven gemaakt, een' halven overdwarschen duim onder den ring, zagt om den zaadstreng toegeknoopt, en deeze daar onder afgesneden. Geen bloed kwam 'er te voorschyn. De wonde wierd gevuld met droog plukfel. De balzak en buik wierden gestoofd met wollen lappen, gedoopt in oly en azyn.

Op den agtsten dag was de wonde in eene goede verettering; den veertienden wierd de ligatuur los gemaakt, wanneer het bloed met droppelen doch schielyk en rykelyk te voorschyn kwam uit de zaad-flagader. De ligatuur, welke van den beginne met een strik was aangelegd, wierd wederom toegebonden, en daar door hield de bloedstorting op. In de derde week viel de ligatuur door de verettering af; en in de zesde was de geheele wonde geneezen.

2.

Een student uit *Skone* gaf zich aan by het Hospitaal in 1756. Syn regter bal was opgezet en gezwollen tot de grootte van een kleine meloen, zynde vier duimen breed en zes lang. Na eene langduurige koorts, welke, volgens syn berigt, eene *Febris mesenterica* scheen geweest te zyn, en die hy voor vyf jaaren had uitgestaan, had zich dit gezwel vertoont, welk, behalven de lastige zwaarte, somtyds ook pyn en stekingen veroorzaakte, zoo wel in de lydende deelen, als naar de lendenen tot de nieren, van dezelfde zyde. Deeze pyn verspreidde zich insgelyks ook tot de darmen en veroorzaakte zwaare krimpelingen in den buik, zonder dat daar by gekomen was eene andere oorzaak van hardlyvigheid of ondienstige spyfen.

Het wechneemen van den bal was het eenigste middel, dat men hem konde voor slaan, na dat veele middelen, ter verdeeling aangewend, mislukt waren. Hy wierd na vereisch der omstandigheden bereid door dienstig voedsel en drank, buikzuiverende middelen en aderlatingen.

De operatie wierd ook begonnen met het openen der uitwendige bekleetselen van den ring tot aan het einde van het gezwel. De zaadstreng, die week en gezond was, wierd blootgemaakt. Ik wilde wederom zien, of niet

de slagader heel alleen kon afgescheiden, en op de manier van den Hr. LE DRAN opgevat, of ten minsten affonderlyk toegebonden worden. Maar dit wilde met alle omzigtigheid niet lukken; derhalven wierd de streng verdeeld in twee gelyke deelen, en gebonden op die wyze, dat een enkele ligatuur gelegd wierd dicht aan den ring, zonder dat dezelve wierd toegebonden, en een andere meêr naar beneden tusschen de afgezonderde zaadvaten en zenuw; deeze wierd verdeeld in twee ligatuuren, welke omzigtig toegeknoopt wierden, een rondom elk gedeelte van den zaad-streng. Deeze streng wierd wechgenomen met het gezwel. De bloedstorting wierd gestuit. De wonde wierd gevuld met plukfel, en veretterde den negenden dag.

Tegen den veertienden gingen de ligatuuren los, en wierden wechgenomen. Twee dagen daar na begon de slagader, welke nu in het vleesch ingetrokken was, veel bloed te geven, voorzeker meêr, dan twee ponden. De bovenste ligatuur was, in de goede verwagting, 'sdaags te vooren wechgenomen. Derhalven moest ik met naald en draad de slagader in het vleesch onderscheppen, 't geen wel uitviel. Eene aderlating op den arm, verkoelende amandelmelken en voedfels wierden op nieuw gebruikt. De wonde wierd verbonden met de gewoone zalf uit gelyke deelen *Basilic. citr.* en *Bals. arcæi* met een weinig *el. ceræ*. In de negende week was hy volkomen geneezen.

Uit deeze gevallen wil ik niet besluiten, dat het onmogelyk is, om de slag-ader **alleen** te onderscheppen, 't geen, op zich zelve zeer voordelig is, als het kan in 't werk gesteld worden; maar ik noem de zwaarigheden op, welke my in het onderzoeken voorgekomen zyn, namentlyk de roodheid der deelen door het bloed, de plaatfing van het celagtig weeffel rondom elk bloedvat en zenuw, die den streng uitmaaken. Zoo dit weeffel opgezet is in de lengtte, even als in een bondel, verduistert het gemakkelyk het gezicht der waare bloedvaten. Een langzaam onderzoek, en afbetting met eene vogtige spons, enz. verwekt eene prikkeling en ontsteking in den zaadstreng boven den ring, niet zonder aanmerkelyk gevaar, even als een styf toegebonden band uit dezelfde oorzaak, volgens myn begrip, zeer gevaarlyk is, en boven maaten pynelyk voor den lyder. Het gezwel bestond in den bal, die in eene vleeschagtige substantie veranderd was; midden in wierden gevonden omtrent twee oncen van een lelyk vogt, en eene beginnende verrotting.

3.

Sarcocoele: cancer testiculi dextri occultus.

Eene vleesbreuk: eene verborgen kanker van den regter bal.

In het begin van het jaar 1759. kwam een jong Heer van zeventien jaar' hulp zoeken voor
eene

eene verharding van den regter bal; hy had onder geduurige krampen en ongemakken doorgebracht fyne vroegere jaaren. Voor twee jaaren had hy voor 't eerst gemerkt eene ongewoone dikte en verharding in den genoemden bal; welke egter, na korten tyd en door het gebruik van eenige verdeelende middelen, schie-lyk verdween. In October 1758. openbaarde zich dezelfde zwelling, wanneer hy op de Aca-demie te Upsala studeerde; maar schoon de kragtigste middelen by de hand genomen wier-den, om het gezwel te verdeelen, nam het eg-ter schie-lyk zoo in grootte als in hardheid toe.

By fyne aankomst in Stockholm, of liever in het midden van January, wanneer ik voor 't eerst raad gevraagd wierd, vondt ik den lyder zeer bleek, mager, kragteloos, hebbende eene kleine en raffe pols, wynig trek tot eeten en nagt-rust, eene roode tong, hier en daar even als met vischschobben bezet; de bal was mee-ftendeels hard, te gelyk met het begin van den zaadstreng, en zoo groot, als eene middelmaati-ge vuist. Van alle oorzaaken, waarna men hem ondervroeg, wist de lyder 'er geen eene met zekerheid op te geeven; doch hy meen-de, den bal op den eenen of anderen tyd te-gen den zadel, onder het ryden, geklemd te hebben.

De beste middelen ter verdeeling waren reeds langen tyd en vrugteloos aangewend; de hard-
heid

heid van den bal, en de vermeerdering daar van naar den zaadstreng gaf niet de minste hoop daar toe, veel meêr had men te vreesen voor de toeneemende verharding boven den ring en in den buik.

Men merkte nu wel geene duidelyke hardheid in den buik, maar eene geringe zwelling, voornamentlyk aan de regter zyde van den navel. De Lyfartz SCHÜTZER, de Hoogleeraar MARTIN, en de Geneesheer LINDHULT waren alle aangemoedigd, om den lyder met raad en hulp by te staan. En, na dat de toestand overlegd was, konden wy niet ontgaan, om het wechneemen van den bal aan te merken, als het eenigste hulpmiddel, welk de lyder met eene edele en zeldzaame vrymoedigheid afwagte.

De voorzegging wierd op zekere voorwaarden bepaald, dat, namentlyk, zoo deeze verharding en zwelling van den bal was eene ziekte op zich zelve, voornamentlyk door eene uitwendige oorzaak ontstaan, en niet voortspruitende uit eenig ander, in het bloed of in de ingewanden verborgen, kwaad, men veel hoop kon hebben van de goede uitkomst der operatie en van de geneezing; maar zoo in tegendeel eene kankeragtige stofte daar onder verborgen was, het zy in de vogten, of reeds bepaalt in eenig ingewand, dat dan de uitkomst vroeg of laat na de operatie niet anders, dan doodelyk, zyn kon.

Het

Het geen my 't meest verscheide verhardingen der klieren in de holligheden deed verdagt houden, was, dat de borsten van den lyder insgelyks hard wierden, en opzwellen, eenigzins rond voor uitstaande. Het *Emplastrum de Meliloto c. Camphora* wierd daar over gelegd, zonder dat de verdeeling kon te weeg gebragt worden.

De lyder gaf zich volkomen over aan den Goddelyken wil, of hy door de operatie eenig voordeel kon verkrygen, of niet, rekende hy het voor eene schuldigheid, om niets te laten, 't welke zou kunnen voorgeslagen worden, om het leeven te behouden of de gezondheid te erlangen.

Na dat hy een zagt buikopenend middel had gebruikt, bestaande in het *Elect. Lenit. Lond.* verrigtte ik de operatie in de tegenwoordigheid van de bovengenoemde Heeren, den agtsten February, op de gewoone wyze, met het wechneemen van den bal.

De balzak wierd geopend van den ring der buikspieren tot den grond; de zaadstreng en bal wierden in den omtrek los gemaakt van alle vliezen. Aan het bovenste gedeelte van den bal en het begin van den zaadstreng wierd gezien een doorschynend waterblaasje, welk omtrent drie of vier thee-lepeltjes vol dun en geel bloederig water bevatte; het overige van den bal was onge-

ongemeen hard. Na dat de streng los gemaakt was, werd dezelve afgebonden nauwelyks eenen duim van den ring in deszelfs zagtste en gezonde deel, digt by de verhardingen, en afgesneden. De ligatuur hield wel, en behoefde niet vernieuwd te worden. Eene kleine slagader van de *iliaca externa* aan de regter zyde van den streng gaf eenig bloed, maar werd aanstonds onderschept. De wonde werd gevuld met droog plukfel, waar over druk-doeken en een goed verband gelegd wierden; de buik en balzak wierden gestooft met azyn en *ol. rosarum*. De levensregeling was verkoelende. Poeders met salpeter en kampher wierden voorgeschreven. Den eersten dag was hy tamelyk wel, doch op het einde van den anderen werd de pols opgezetz, en ras. De ader op den arm werd geopend; het bloed zag 'er zeer slegt uit; weinig rood bloed werd gezien, maar het meeste was veranderd in eene *crusta serosa coriacea*.

Op den derden dag was de koorts wech, en daar kwam geen verder toeval. Den zesden dag was de wonde geheel en al in veretting, en al het plukfel werd wechgenomen. Den der tienden dag viel de ligatuur zonder de minste bloedstorting af; de toegeknoopte eindens van den zaad-streng wierden te vooren en na het afvallen verbonden met plukfel, bevogtigd met *Bals Fioraventi*; de wonden met *Bals. arcæi unc. ij. ol. amygd. unc. ij. vit. ov. N. j. ol. ceræ gtt. xv.*

De tong behield altyd de korst, doch de welgemoedheid, de trek tot eeten, en de slaap hadden tot hier toe niet ontbrooken. Des niet te min wierd reeds den zesden dag na de operatie bemerkt eene duidelyke hardheid aan de regter zyde van den navel juist daar, alwaar de zwelling gezegd is te zyn; dezelve was puntig naar boven en had eene breede *basis*. Aan den zieken wierd dezelve na verloop van veertien dagen ontdekt, en hy verloor daar by allen moed. Den zeventienden en agt-tienden dag had hy in den namiddag eenige hitte, waar na de slaapeloosheid zich openbaarde. Den twintigsten begon hy, na het eeten en drinken, benauwt te worden, en al 't geen hy gebruikt had, uit te braaken. De voeten wierden *œdema-teus*, hy wierd van uur tot uur mager, en had alle kleur verlooren, wanneer hy den vier-en twintigsten dag na de operatie, de wonde reeds voor drie vierde deelen geneezen zynde, zagt stierf.

Om de gesteldheid der ingewanden te onderzoeken, wierd, in tegenwoordigheid van de bovengenoemde Heeren, eerst de buik geopend. 1. Was het net donker van kleur, en zoo uitgeteerd, dat nauwelyks een gedeelte zoo breed, als eene hand, van het onderste en losse deel overig was. 2. Was het darmscheil opgevuld met veele harde opgezwolle en paerſche klieren. 3. Bevatten de darmen, vooral de dunne, donker blauw van kleur zynde, eene bruine
en

en stinkende stoffe. 4. Was de twaalfvingerige darm by fyne buiging tegen de regter nier boven maaten verwyderd in eenen zak, die wel eene groote vuist kon bevatten. De rok had egter eene vrye gemeenschap met het darm-canaal, zoo wel naar boven naar den poortier, als naar onderen. Maar op de plaats van de vereeniging met het darmscheil was de darm door eene kankeragtige verzweering opengebrooken. 5. Kwam deeze verzweering van de verharding, welke by het leeven ontdekt wierd door de spieren van den buik in de *regio lumbaris dextra*, zoo groot en duidelyk, en nu gevonden wierd een waar verzworeen knoestgezwel of open kanker in het uitgezette deel van den twaalfvingerigen darm te zyn: het harde gezwel had voornamentlyk fyne zitplaats in het *mesocolon* aan de regter zyde van de ruggegraat, en puijde het meest uit tegen de meêrgemelde plaats en twaalfvingerigen darm, wiens overdwarsche deel op het laaste wervelbeen van den rug in de *theca triangularis peritonæi*, door het knoest-gezwel van boven bedekt, en, zonder eenig teken van afscheiding, zeer vast daar mede was samengegroeit; van daar strekte zich de verharding in eene gelyke vlakke uit byna over het geheele begin van het darmscheil tot boven de lendenwervelen, en verdeelde zich eindelyk in twee deelen, welke de *muculi Psoas* volgden aan de regter en linker zyde tot omtrent twee vingerbreette van den band van *Fallopious*. 6. Was het celagtig weeffel van het buikvlies overal met

water gevuld. 7. Was de regter zaadstreng begrepen in de beschreeven neêrklimmende verharding aan de regter zyde van de lenden-wervelen, en zoo daar in vereenigt, dat het niet mogelyk was, denzelven los te maaken: anderhalven overdwarschen duim boven den ring was hy egter zagt en gezond, en ook met versch vleesch in den ring en uitwendige wonde wel toegegroeit en geslooten zonder de minste verharding. 8. Wierden in het ronde gedeelte van de lever veele groote en kleine *vomicæ* gevonden, welke diep in de zelfstandigheid doordrongen. 9. Waren de longen ook niet vry van soortgelyke verhardingen, welke tot verettering overgingen, en eindelyk 10. wierden, gelyk na de meeste sleepende ziekten, slymproppen in beide de holligheden van het hart, en een weinig uitgestort vogt in de linker holligheid van de borst, gevonden.

Hier uit schynt men met zekerheid te kunnen besluiten, dat het inwendige knoest-gezwel en de verborge kanker veel ouder was, dan de vleeschbreuk; en dat hetzelfde door de legging, grootte, vereeniging met den regter zaadstreng, en gemeenschap met de darmen, juist op de plaats, alwaar voornamentlyk de chyl moet bereid worden, verwekt zal hebben alle de genoemde tekenen der ziekte; als ook veroorzaakt de verharding van den regter bal en der borsten, gelyk ook derzelver zwelling, en verandering in eenen kankeragtigen staat. Soortgelyke gevallen van
den.

denzelfden aart en uitkomst overtuigen my van het gering voordeel, welk zoo een lyder kan hebben van het wechneemen van den bal, zoo de overige toevallen overeenkomen met deeze aanmerkingen, en dat dit eenigste hulpmiddel niet kan aanbrengen eene waare hulp in eene ongeneeslyke ziekte; gelyk ook onze gegeeve voorzegging by de operatie in dit geval met het gevolg overeenstemmende gevonden word.

4.

Sarcocoele comparativa.

Eene vleeschbreuk in een vrouws-perfoon.

Een jong vrouwsperfoon van negentien jaar, had zederd veele jaaren gemerkt een hard gezwel in de teeldeelen, zoo groot als eene kers. Uit onkunde, of het zelve natuurlyk was, dan niet, had fy zich daar over niet bekommerd, zoo veel te minder, om dat het haar nooit enig ongemak veroorzaakte. Het gezwel was in denzelfden staat gebleeven tot voor drie maanden, wanneer hetzelve schiclyk begon toe te nemen.

'Er verliepen nog zes of zeven weeken, eer fy hetzelve uit schaamte aan haare Moeder wilde bekend maaken of zeggen. Toen was het reeds zoo groot, als een Borsdorfer-appel; men had aanstonds op de plaats, alwaar fy woon-

de, zulken goeden raad, als men kon, aangewend; maar nu groeide het gezwel dagelyks, en byna zichtbaar aan, en dus wierd fy, drie weeken vrugteloos alles beproefd hebbende, genoodzaakt naar Stockholm te komen. Ik vondt het gezwel de eerste reis, als een groote renet-appel, uit de teeldeelen hangende, zwart van kleur, en met eenen stinkenden kankeragtigen reuk. Nadat de stank door zuiverende omflagen verminderd was, wierd het gezwel onderzocht, en bevonden, gelyk gezegd is, buiten de teeldeelen te hangen, aan eenen hals, die eene middenlyn van anderhalven duim had, en nauwelyks drie overdwarsche duimen lang was. De hals was eene uitzetting van de scheede, beginnende even onder de uitwendige opening van de pisbuis, en strekkende zich uit, al afneemende, tegen den bovenkant van het voorste gedeelte der baarmoeder. Het gezwel zelve was hard, vast, en van boven open, als een kankeragtige zweer. De vermeerderende grootte veroorzaakte nu ongemak by het lossen van de pis, en in de wonde had fy eene ondragelyke pyn, wanneer de pis daar in kwam. De lyderesse was kragteloos, en had eene aanhoudende koorts.

By het eerste onderzoek was het waarlyk zwaar te zeggen, waar uit dit gezwel gemaakt wierd. Deszelfs hals gaf aanleiding te denken op eene darmbreuk in de scheede; maar de verharding en verzwearing op een kankeragtig gezwel. Dit laat-

laatste was het waarfchynelykfte, dewyl de hals op het gevoel ledig, maar het gezwel dik en hard was. De opgelegde middelen konden geene betere verettering, zuivering, geneezing of vermindering van het gezwel te weeg brengen, maar in tegendeel begon het op te zetten, te bloeden, en ten eenenmaale te ftinken, als een open kanker. Dit noodzaakte de lydereffe zelve fchielyk tot de operatie over te gaan, welke gefchiedde in de tegenwoordigheid van den Lyf-artz SCHUTZER, en den Heelmeefter RAMSTRÖM,

De lydereffe wierd gelegd op eene tafel, gelyk by het fteensnyden. Eerft wierd een *ca-
sheter* in de pisbuis gebragt, om dezelve altyd te kennen onder de operatie, vervolgens wierd een fterke ligatuur aangelegd, zoo hoog als gefchieden kon, om den hals van het gezwel; de pisbuis wierd eenen overdwarfchen vinger van den hals los gemaakt, op dat derzelver opening door de toetrekking van de ligatuur niet zoude ontftooken worden. Daar op wierd de hals geopend in de lengtte en met veel omzigtigheid, gelyk in eene breuk, ook kon dezelve by vergelyking met regt eene vleefchbreuk genoemd worden; maar de hals wierd famen gegroeit gevonden, en niet open, zoo als in eene gewoone breuk der fcheede.

Nu wierd de pisbuis een weinig hooger los gemaakt van den hals, vervolgens bragt ik met


eene kromme naalde eene fterke en dubbelde ligatuur op eenen zekeren afftand van de pisbuis, door den hals en boven de genoemde verharding, welke tot op den grond van de fcheede ging.

De eerfte aangelegde ligatuur wierd wechgenomen, maar met de laafte wierden twee toebindingen gemaakt, een in de gemaakte affonderinge, tuffchen de pisbuis en den hals, de andere rondom den hals, zoo hoog mogelyk was. De hals wierd met het gezwel afgefneeden, eenen goeden overdwarfchen duim onder den band. Dewyl de hals nog dik was, en de lugt, door de infnyding van den draad, daar by kwam, was dezelve ook zeer genegen, om aan het einden voort te brengen, hard fponsagtig vleefch, gelyk de weder opgroeyende kankers gewoon zyn te doen. Maar in onzekerheid van eene gelukkige geneezing, wierd om den derden dag een nieuwe ligatuur aangelegd, telkens hooger en hooger, tot dat de geheele verharding daar in begreepen en wechgebonden was.

Vervolgens veranderde het ongemak fyne kankeragtige gedaante; de lydereffe wierd op het einde van de vyfde week gelukkig geneezen, en is wel tot op deezen tyd,

Uit deeze en veele andere proeven geloof ik te kunnen befluiten, dat de afbinding in foortgelyke
on-

ongemakken veel zekerder is, dan de affnyding, dewyl men met hulp van de eerste het overige op dezelfde wyze kan bedwingen, maar na de affnyding bezwaarlyk daar op eenige vastigheid heeft. Ik heb andere zien afbinden, en ook zelve afgebonden kankeragtige gezwellen op de lippen, welke gelukkig geneezen gebleeven zyn; maar ik heb die ook zien wechfnyden, zoo dat fy op verscheide wyze weder zyn gekomen.





V I I.

Hydrocele.

Eene Water-breuk.

Dit artykel zoude ik gaarne uitlaaten, zoo de waarheid niet even nuttig was, als dezelve onaangenaam, dan als fy aangenaam is om te verhaalen.

Eene waterbreuk zonder verharding van den bal of zaad-ftreng is gemakkelyk te opereeren en te geneezen ; maar de minfte ongemakken worden, zonder eene behoorlyke of voorzigtige oppassing, ook fomtyds dodelyk. Een bewys hier van zal gevonden worden in de volgende waarneeming, welke van veele, die better uitgevallen zyn, uitgeoofen is, om andere des te opmerkzaamer te maaken.

I.

Een Predikant uit het distrikt van Stockholm zegt in 1749. hulp voor eene groote waterbreuk aan de linker zyde. Hy was voor het overige gezond, zag 'er wel uit, was bloedryk, zeer geduldig, en even zoo onachtzaam. Hy wist niets van de oorzaak deezer waterbreuk te zeggen, dan alleen dat hy dezelve vier jaaren gehad had. De bal wierd onder den waterzak

zak vry en ledig gevonden, waar uit men dagt, dat het water niet lag in de *capsula testiculi*, maar in het celagtig weeffel van den streng. De operatie was derhalven minder gevaar onderworpen. Na dat men hen eene levensregeling had voorschreeven, welke hy niet onderhield, aderlatingen had laten doen en buikzuiverende middelen gegeven, wierd de operatie verrigt.

De algemeene bekleetselen en de waterzak wierden, na gewoonte, geopend. Twee ponden donker geel water waren daar in bevat. De zak ging van den ring tot onder in den balzak. De zaad-streng scheen duidelyk door de onderste zyde. Verscheide verwyderde bloedvaten gaven veel bloed, waarom 'er eenige onderschept wierden; de mindere wierden geslooten met droog plukfel, waar mede de zak en het *scrotum* gevuld wierd. De vrouw van het huis paste den zieken op met dienstig voedsel, het geeven der vereischte medicamenten, en het veranderen van den pap. De strengste levensregeling en stilte wierden nog meêr aanbevoolen; maar nauwelyks was hy aan zich zelven overgelaaten, of hy wilde zich zelve geheel alleen helpen, opneemende, al 't geen hy noodig had, en kon vinden, by het bed; daar door ontstondt 'er eene nieuwe bloedstorting, om welke te stuiten het geheele verband moest wechgenomen, en een nieuw aangelegd worden. Hier mede zoude syn gevaar hebben kunnen overwonnen zyn; doch, buiten myn

weeten, at hy allerley ondienſtige en ſterke ſpyſen, vleefch, viſch en gebak, welke ſyne vrienden hem fonden. Dit verwekte de koorts, en vermeerderde de ontlaſtingen. De natuur dit vereiſchende, was hy zoo onachtsaam, dat hy naar het gemak met verband en al ging, van waar hy wederom kwam met eene ledige en bloedende wonde.

Dit gebeurde driemaal binnen drie dagen, on-aangezien de ſterkſte beſtraffingen, en een ge-duurig bezoek van myne bedienden. Op het einde van den derden dag was het vuur in den balzak, in eenen zoo hoogen graad, dat hy met het begin van den vierden dag ſtierf. Ik weet my niets te verwyten by deeze ongelukkige uitkomst, dan alleen dit, dat men den lyder nauwkeuriger had moeten laaten oppaſſen, om ſyne byzondere onachtzaamheid te beſtuuren.

2.

Een ſterke, en bloedryke, Brouwers-knecht van dertig jaaren, had inſgelyks eene water-breuk aan de regter zyde. Dezelve was, in het tweede jaar na haar begin, zoo groot als eene man's vuist, hard, geſpannen, en had een pynelyk gevoel, welk tot aan de regter nier opklom. In de lente van het jaar 1755. kwam hy in het Hospitaal, en wierd tot de operatie bereid.

De uitwendige bekleetselen, het scheidewormig vlies van den streng, en de zak wierden geopend. Iets meer, dan twaalf oncen donker geel water kwam daar uit te voorschyn. De wonde, welke niet bloedde, en derhalven geene onderschepping noodig had, werd verbonden met droog plukfel. De buik werd gestooft met wolle lappen, gedoopt in roosen-oly en azyn. Aanstonds na het verband werd eene aderlaating in het werk gesteld, als ook amandelmelken, en gort-soepen gebruikt. Geene toevallen openbaarden zich. Maar dewyl de roede te vooren kort was, en de huid van den balzak niet volkomen samen gevallen, was het moeijelyk te beletten, dat de pis in de wonde viel, maar wel mogelyk met een zoo nuttig *urinaal*, als in het Hospitaal gebruikt word, zoo deeze lyder verstand en gehoorzaamheid gehad had. Hy liet de pis, zoo dikwils dezelve hem tot de ontlasting prikkelde, loopen voorby het glas in het verband en de wonde. Dit is zeker, dat noch de ziekte, noch de zwakheid van ligchaam of geest, hem kon beletten, de zuiverheid in acht te neemen; want hy had weinig of geen koorts, sprak, antwoorde, en nam na zich al't geen men hem gaf van voedsel of geneesmiddelen; maar des niet te min, liet hy de pis en drekstoffen in het verband en bed loopen. Dus moest ik met leedweezen zien de kwaade gevolgen, welke te wagten waren, zonder dat ik dezelve kon voorkomen.

Hy lag op den rugge, en liet de pis overal naar toe loopen: de wonde wierd droog, de balzak opgezet, blauwagtig, en volkomen verstorven op den zesden dag na de operatie, wanneer hy ftierf.

3.

Een jongeling van zeventien jaaren, had na eene zaadbreuk in de regter zaadstreng gehouden eene waterbreuk, niet in het celagtig weefsel, maar in het scheiddevormig vlies van den bal. Het ongemak had reeds eenige jaaren geduurd. In den zomer van 1758. zocht hy hulp door de operatie, na dat alle verdeelende middelen verscheide jaaren vrugteloos waren aangewend. Nu waren de zaadvaten van deezen bal tamelyk samenvereenigt, en hadden eene geheel andere gedaante dan voor twee jaaren, wanneer fy waren opgezwollen geweest.

De zwelling of water-zak was zoo groot, als het ey van een kalkoen, eenigzins week, zoo dat de bal, welke een weinig meêr hard was, dan dezelve zyn moest, onduidelyk aan den agterkant van den zak kon bemerkt worden. Tegen het licht van eene kaars gezien, was dezelve gedeeltelyk doorschynende, en gedeeltelyk ondoorschynende uit hoofde van den bal.

Na dat de lyder behoorlyk bereid was, wierden de uitwendige bekleetselen en de geheele
zak

zak geopend, eenen duim van de bilnaadsstreef, en op eene plaats, welke vry scheen te zyn van opgezette bloedvaten. Vier oncen water liepen 'er omtrent uit, wanneer de bal bloot lag; en, dewyl 'er geene aanmerkelyke bloedstorting op volgde, wierd de bal bedekt met fyn plukfel, te gelyk met de wonde, en na gewoonte verbonden. Warme omslagen van wolle lappen, gedoopt in water, azyn, en roosen-oly wierden alle vier uuren gebruikt over en rondom het onderlyf; de ader wierd den volgenden dag op den arm geopend; zeven dagen lang wierden amandel-melken, en poeders met salpeter en kampher gebruikt, tot dat de koorts ophield, en de verettering volgde.

Zoo wel voor als na de operatie gaf ik hem zonder vrees te verstaan, de doodelyke gevolgen, welke de onachtzaamheid eenen zieken in deezen toestand konnen toebrengen. Hy toonde meêr verstand, dan de twee voorgaande, en was daarom ook in de negende week geneezen.


In de derde week, na dat de verettering in eenen goeden staat was, begon de bal te zwellen, en uit de kanten van de wonde uit te puilen, 't geen niet ongewoon is; en gelyk te voren in verscheide toevallen, wierd ook nu gebruikt de *solutio sulph. cum ol. lini*, in plaatse van eene ettermaakende zalf op het plukfel, om over de hoogte te leggen; het grootste ver-

smolt

smolt daar van en zakte neder, en op het einde wierd het opgegrocide vleesch met den *lapis infernalis* opgedroogd en bedwongen. De bal zat eenige maanden vast tegen het litteeken, op de plaats, alwaar de zak geopend, en de *cellulosa dartos* verteert was; vervolgens heeft hy zich losgemaakt van de huid, en legt nu vry in den balzak, op dezelfde wyze, als dit gaat met andere diepe littekens in het begin en het gevolg, waar uit met waarschynelykheid beslooten word, dat het geheele celagtig weeffel by de verettering niet wechsmelt, maar de oly alleen, welke door den tyd in dezelfde quantiteit wederom kan verzameld worden (*).

(*) De Hr. WARNER deelt in *Obs. Chir. n. XXIX. Edit. Paris 1757.* mede eene nieuwe manier, om de waterbreuken te geneezen, welke hem wel gelukt is. Eerst heeft hy twee reizen binnen korten tyd met het trois-quart het water afgetapt; en de laatste reis heeft hy aanstonds, by het uittrekken van het pypje, in de opening een stukje spons gestooken, welk na vier- en twintig uren wierd uitgetrokken, terwyl 'er een ander op nieuw ingestooken en twee dagen lang daar in gelaaten wierd. De balzak wierd eenigzins hard en ontflooken. De steekwiek wierd wechgenomen en een pap van witten-brood met melk over den balzak gelegd. Na vier dagen volgde 'er eene goede verettering in den zak, wiens eerste opening met het trois-quart eenigzins verwyderd wierd, om de etter te doen afloopen, vervolgens vermeerderde zich dezelve in tien dagen zeer aanmerkelyk en vertoonde zich als eene kleine verzweering. Daar op is de ontlasting verminderd, en de zak geneezen zonder eenige zwaare toevallen. Ik wil egter elk een niet raadden deeze manier te volgen; in ongezonde

zonde lichamen zoude de uitkomst gemakkelyk doodelyk konnen worden, wegens de drukking en ontsteeking van den bal en zaadstreng, die zich verspreid tot in het selagtig weeffel van den buik, en het vuur kan veroorzaaken, voor dat de verzwearing in den zak van de waterbreuk heeft konnen volbragt worden; te meêr, zoô'er geene goede en schielyke hulp tusschen komt, vooral met nieuwe insnydingen en het openen van den zak. Ik ben daarom liever geneegen by de eerste toevallen deezem manier te beproeven op zulke lyders, met waterbreuken, welke van onagtzaamheid konnen verdagt gehouden worden, gelyk de twee in de eerste en tweede waarneming.





V I I I.

Fistula Scroti.

Een pypzweer in den balzak.

Een jaager, vier- en dertig jaaren oud, had by eenen kwalik behandelten druipert gekreegen eene ontsteeking en zwelling in den regter bal. De flegte oppassing had de ontsteeking vermeerderd, tot dat de verettering in den balzak daar op volgde. De verzweering had zich alleen door de hulp van de natuur eenen weg gebaant, en de etter kwam aan den grond van den balzak by de bilnaads-streep aan de regter zyde te voorschyn.

In deezen toestand kwam hy in het Hospitaal in 1756. By het onderzoeken van de pypzweer, welke aanstonds verwyderd wierd, vondt men den balzak ledig, of, om duidelyker te zeggen, den bal in het scheedevormig vlies los en vry van het gemeene vetvlies, welk hetzelfde vereenigt met de *dartos scroti*, zoo dat ik den vinger rondom den bal kon beweegen. De *Epididymis* en het *corpus pampiniforme* waren nog hard en opgezet; de aangedaane zyde van den balzak wierd geheel en al geopend, de bal bleef leggen op het onderste gedeelte, en het overige wierd met plukfel gevuld. Den vierden dag zag men overal eene goede

goede verettering; de wonde wierd verbonden met *Balf. Arcæi unc. ij. en solut. sulph. unc. ß.*, de opgezwollen deelen wierden zagt; de bal maakte zich in syn scheiddevormig-vlies met nieuw vleesch vast tegen den balzak. De insnyding was in de vyfde week volkomen geneezen, waarna de bal zich allengskens los maakte en vry in den balzak bleef.

Zulke verzweeringen, welke volgen op de ontsteeking van een' of beide ballen, worden somtyds van eenen slegten aart, als de lyder bloedryk, van eene heete natuur, en in den beginne onagtzaam is. Ik heb tweemaal den geheelen balzak en *dartos* zich zien afzonderen en door eene gangræneuse versterving afvallen, waarna de regter bal, die ontstooken was, tegen gewoonte zich duidelyk verdeelde; de ballen lagen nauwelyks veertien dagen bloot, maar wierden vervolgens op nieuw met eenen nauwen balzak bedekt. Dus heb ik ook eens den regter bal zien verzweeren, open maaken, en met den balzak geneezen. De pypzweer in den balzak, welke na de verettering overblyft, schoon somtyds veelvuldig en met veele middenschotten voorzien zynde, word egter gemakkelyk onderscheiden van eene pypzweer, waar door de pis ontlast word, zoo wel door de vrye ontlasting van de pis, door den gewoonen weg, als door de afweezende uitziepering geduurende de ontlasting.



I X.

*Calculus vesicæ urinariæ.**Een steen in de blaas.*

De Heer Lyf-artz HERMAN SCHÜTZER is de eerste, welke van de inlandsche Heelmeesters in onzen tyd de steensnyding heeft beginnen te doen. De Verhandelingen van de Koninglyke Academie der Weetenschappen voor den jaare 1749. p. 221. geeven daar van een duidelyk bewys. Na dat ik in vreemde landen deeze operatie veelmaalen had bygewoond, en alhier dezelve op lyken dikwils beproefd, heb ik met den nuttigen bystand van den Heer SCHÜTZER (*) dezelve op eenige lyders, met den steen geplaagd, alhier in het Hospitaal verrigt.

Een

(*) Het geval, welk de Hr. SCHÜTZER op de aangehaalde plaats beschryft, verdient groote opmerking. Een man van zestig jaaren had zederd twintig jaaren pyn in de pisbuis gehad, welke hem zeer hinderlyk was, als hy syn water zoude loosen; dezelve nam meêr en meêr toe, tot dat hy eindelyk op raad van den Hr. BÄCK tot den Hr. SCHÜTZER kwam. Deeze voelde den steen wel met den catheter, doch of dezelve groot of ook vastgegroeit was, kon hy niet ontdekken; hy raade hem de operatie te ondergaan, en daar toe was hy gereed. Dezelve wierd met den grooten toestel gemaakt. Na verloop van eenige

minuu.

I.

Een meisje van agt jaaren had', van zeer vroe-
gen ouderdom, tekenen en pynen van eenen
steen in de blaas gehad. Haar vader bragt haar
in 1756. in het Hospitaal; by de eerste sondee-
ring was de steen duidelyk te merken. Als sy
de pis loosde, had sy zwaare persfingen, zoo
dat

minuuten kon hy den steen met de tang vatten, doch
het uithaalen was langduurig en moeyelyk. Hy werkte
ruim een uur, zoo dat twee tangen daar by onbruik-
baar wierden, de Hr. SCHÜTZER eindelyk moede wierd,
en den Hr. ACREL verzogt, denzelven uit te haalen;
doch hy wilde evenwel niet volgen. Den hals van de
blaas van onderen meêr verwyderd hebbende, vondt
men, dat dezelve agter aan den hals van onderen by
den endeldarm, zich digt om den steen, als een zak,
geslooten had. De steen was in denzelven ook tamelyk
vast gegroeit. Men besloot derhalven, eerst het hoofd
van den steen los te maaken van den hals van de blaas,
waar by het grootste gedeelte van de *prostate* verloren
ging; vervolgens wierd de steen met een tang gevat, en
zoo lang heên en weêr bewogen, tot dat hy niet alleen
van den zak los wierd, maar ook gelukkig uit denzel-
ven te voorschyn kwam, zoo dat hy uit de blaas ge-
haalt wierd, dog schoon de blaas en wonde daar door
veel leed, had hy egter geene zwaare toevallen. Geene
toevallige koorts kwam daar by. De buik en balzak
waren, tegen alle verwagting, van het eerste oogenblik
tot de volkome geneezing week, en niet gezwollen.
Hy herstelde volkomen, uitgezonderd, dat hy het water
niet houden kon, waarschyndelyk door het geweld, welk
de deelen geleden hadden, en door de verslapping. De
steen woog tien lood'.

dat het einde van den endeldarm uitzakte; de fchielyke ontlasting van de pis, en derzelver droppeling tusschen beide, waren de gewoone ongemakken.

Men besloot de operatie te doen, en dezelve wierd, na eene genoegzaame voorbereiding, op de volgende wyze verrigt.

De lydereffe wierd gelegd op eene korte tafel byna horizontaal; leunende het hoofd tegen eenen stoel, die agterover gelegd, aan de tafel vastgebonden, en met de noodige dekkleeden bedekt was. De handen en voeten wierden met lange banden gebonden boven de schouders, als by den grooten toestel, maar niet zoo vast, op dat sy plat op de tafel zoude kunnen blyven leggen.

Eene bekwaame gesleufde sonde van staal wierd door de pisbuis in de blaas gebragt. Op deeze wierd de pisbuis aan de linker zyde en naar onderen met een regt mesje geopend. Vervolgens wierd het verborgen mesje van *Frere Cosme*, gesteld op N. 7., ingebragt, en daar mede wierd de hals van de blaas en de pisbuis doorgesneden in de opening door de eerste insnyding gemaakt, naar onderen, tusschen de *plexus cavernosus labii sinistri* en de scheede. Beide bleeven sy onbeschadigt; de voorste vinger van de linker hand, in oly gedoopt, wierd in de blaas gebragt, daar op het *gorgeret*, en langs
dit

dit de tang, waar mede de steen zonder moeite uitgenomen wierd. Dezelve woog ruim drie loot en een half dragma. Over de wonde wierd gelegd plukfel, gedoopt in *Bals. Samarit. Brand.* Geene toevallen openbaarden zich. Op het einde van de derde week was de wonde geneezen, maar de moeyelykheid, om het water op te houden, plaagde dit meisje lang, zelfs nog eenigen tyd, na dat hetzelfde het Hospitaal verlaaten had.

2.

Een jongen van twaalf jaaren uit Oost-Gotland, kwam in 1757. tot het Hospitaal, om geopereerd te worden van eenen steen in de blaas, na dat de Stads-Heelmeeester J. A. TERNELL in *Norköping* hem gefondeerd, en den steen ontdekt had.

Na voorgaande bereiding, wierd de operatie ondernomen met het verborgen mesje van *Frere Cosme*; de jongen wierd gebonden, als het voorgaande meisje, en horizontaal gelegd op eene, daartoe gereed gemaakte, tafel. De uitwendige bekleetselen en de pisbuis wierden geopend met het gewoone mesje, by het steenfnijden gebruikelijk, byna volgens de *methodus lateralis*; de opening wierd begonnen drie lynen van de bilnaads-streep, voortgezet naar de linker zyde, en nederwaarts tegen de *tuberositas ossis Ischii*, waar door de *musculus bulbo-caver-*

cavernosus sinister voor de onderste helft, en naar agteren verdeeld, en te gelyk met de pisbuis doorgesneeden was. Het verborgen mesje wierd gebragt in de sleuf van de *algali* in de blaas; het laatste wierd 'er toen uitgenomen, en het eerste, gesteld zynde op N°. 7., met de regter hand opgeligt naar den boog der schaambeenderen, het mesje wierd naar boven gedrukt, en volgens den loop der uitwendige wonde uitgehaalt. De voorste vinger van de linker hand, gedoopt in oly, wierd gebragt in de blaas, en daar mede wierd de steen aanstonds gevoeld. De tang wierd binnen gebragt, maar, dewyl de steen naar agteren rolde en onbemerktbaar wierd, moest het *gorgeret* gebruikt worden; een weinig gezogt hebbende, wierd de steen gevonden, en te voorschyn gebragt, weegende dezelve drie loot. De toevallen waren drage-lyk. In de derde week liep de pis grootendeels den natuurlyken weg door de pisbuis; op het einde van de vierde week, sieperde de pis nog door eene kleine pypzweer in de wonde, welke scheen calleus te zullen worden; in de pisbuis wierden derhalven gestookten *bougies* van het *empl. diapomphol.* tot voorby de pypzweer. Daarmede wierd de pis op den regten weg gebragt, de verhardingen versmolten, de uitwendige wond wierd zagtjes gedrukt met stukjes pleister en drukdoeken tegen de *bougies* en geneezen; na verloop van vyf weeken ging hy gezond uit het Hospitaal zonder pypzweer.

3.

Een kleine jongen van zes en een half jaar, bleek en ziekelyk van aanzien, maar daarby vrolyk, had, volgens het berigt van de moeder, van de geboorte af aan, tekenen gehad van den steen, met persfingen by het loofen van de pis, waar by het aangezicht gespannen en opgezetz, en het einde van den endeldarm verzwakt wierd. De steen wierd duidelyk in de blaas bemerkt, doch was klein.

In de lente van 1758. kwam hy in het Hospitaal. Na eene voorgaande bereiding wierd de operatie verrigt van den Hr. SCHÜTZER volgens de manier van LEDRAN. Het kind wierd schuins gelegd op eene tafel, by het steensnyden gebrukelyk, en vastgemaakt met de banden van LEDRAN (*les étriers ou liens en chiffre 8.*), de insnyding in de uitwendige deelen wierd gemaakt met het gewoone mesje tot den grooten toetsel, maar de hals van de blaas wierd verwyderd met het mesje van LEDRAN, *couteau à rondache* genoemd. Dit ging schielyk en gelukkig, het *gorgeret* wierd ingebragt, en daarop de tang. De steen, welke na eene groote muscaat-noot geleeleek, verborg zich tusschen de rimpels van de blaas, 't geen vermeerderd wierd onder de persfingen. Na eene voorzigtige onderzoeking wierd de steen aangetroffen; dezelve was zeer bros en brak in twee deelen, waar van de eene helft

na de andere gelukkig te voorschyn gebragt wierd. De wonde wierd verbonden met *Bals. Samarit.*, en, na gewoonte, eene stooving op den buik gelegd.

Aanmerkelyk was het, dat deeze jongen gewoon was, als hy pyn van den steen had, het hoofd naar de regter en linker zyde te schudden met eene onophoudelyke beweeging, als hy wakker was; daar mede ging hy voort na de operatie. Daarenboven had hy eenen zeldzaamen en onleschbaaren dorst, roepende geduurig om drinken, en het was hem om het even, wat men hem te drinken gaf, zoo hy maar na genoeg en daar van drinken mogt,

Syn dorst en begeerte na drinken ging zoo ver, dat hy onder de voorbereiding 's nagts opstond, en onderzocht de drinkglazen der andere zieken, welke met hem in hetzelfde vertrek lagen.

's Nagts na de operatie, schoon syne knien en voeten waren vastgebonden, hielp hy zich zelve uit het bed, en huppelde naar de andere, maar hy wierd wel haast ontdekt, viel op den grond, en men droeg hem in syn bed.

Dit onmaatig drinken veroorzaakte insgelyks een geduurig openlyf, vyf of zes reisen 's daags, in de eerste drie weeken na de operatie, waar door de wonde in het geheel niet of

zeer

zeer weinig veretterde van het begin tot het einde. Anders kwamen 'er geene zwaare toevallen by. De geneezing ging langzaam, deels uit hoofde van de groote quantiteit pis na het onnatuurlyk drinken, deels ook van wegens de afgangen, die het kind uitmergelden.

Eindelyk en in de vyfde week schikte zich alles tot geneezing; de dorst en loop verminderten; de wonde wierd kleiner, doch uit dezelfde liep nog pis; derhalven wierden wederom gebruikt *bougies* van het *empl. diapomphol.* met zulk groot voordeel, dat de pisbuis na agt dagen met behulp van pleister-koekjes en drukdoeken den natuurlyken weg door de pisbuis ging; wanneer het kind kort daarop in goede gezondheid en vergenoegd aan syne moeder overgeleeverd wierd, zynde 'er geene pypzweer overig gebleeven.

4.

Een Weevers-knecht, twee- en twintig jaaren oud, was tien jaaren lang geplaagd geweest met eenen steen in de blaas. Door de gerugten van de wel uitgevallen steensnydingen, zoo buiten als binnen het Hospitaal, aangezet, hield hy aan om hulp, en kwam in den zomer in het Hospitaal. Eene rykelyke quantiteit verrotte slym kwam met de pis uit de blaas.

Na eene voorbereiding van tien dagen, onderging hy de operatie met het verborgen mesje. Na dat hy horizontaal op eene tafel tot aan de schouders gelegd was, wierden de handen en voeten vastgehouden met de banden van LEDRAN. De insnyding in de uitwendige deelen en pisbuis werd gemaakt op dezelfde wyze, als by N. 2., de hals van de blaas werd verwijderd door het verborgen mesje, gesteld op N. 9., en volgens den loop der uitwendige wonde naar buiten gebragt. De voorste vinger van de linker hand werd met oly besmeerd en naar binnen gebragt, wanneer de steen aanstonds tegen den punt stootte; maar dewyl de hals van de blaas gevonden werd te weinig verwijderd te zyn, na de grootte van den steen, 't welk de vinger beeter, dan het werktuig, kon ontdekken, draaide ik het mesje om, zoo dat het op N. 11. stond, bragt het op nieuw in de blaas, opende het, en haalde het volgens de eerste insnyding uit. De vinger werd vervolgens gemakkelyker in de blaas gebragt, en daarna de tang zonder moeite. Intusschen was de steen gerold naar de regter zyde, en had zich in de vouwen van de blaas verborgen, maar dezelve werd aanstonds ontdekt, en gelukkig te voorschyn gebragt. De steen woog 4½ loot, was scherp en ruuw, als een raspl.

De insnyding gaf in den beginne een weinig bloed, maar dit hield op alleen door droog plukfel, welk, na gewoonte, gelegd werd op de

de infnyding , en daarop plukfel en druk-doe-ken , gedoopt in olie en wyn. Daar kwamen geene toevallen by. Op den zesden dag begon de pis van zelve door de pisbuis te loopen. De wonde wierd toen verbonden met *Bals. de Meca, unc. ij. vitell. ovor. n. 2. ol. amygd. dulc. unc. j.* De verettering was goed en ging fchielyk voort. In het begin van de derde week was de wonde meestendeels geneezen, behalven eene kleine pyp-zweer , welke eenige droppelen pis door liet onder de ontlasting van dezelve.

De Bougies van *Empl. Diapomph.* in de pisbuis en eene trapswyze drukking daar boven, deden de pyp-zweer binnen agt dagen geneezen, wanneer hy fris en gezond het Hospitaal verliet.

5.

Een jongeling van negentien jaaren gaf zich aan in het Hospitaal met het begin van 1758 , begeerende hulp tegen den steen. By het sondeeren wierd de steen ontdekt, doch klein bevonden. Deszelfs toevallen waren dragelyk , men gaf hem derhalven dienstige kruiden tot eenen bloedzuiverenden en verkoelenden drank, om te gebruiken tot in de maand Mey, wanneer hy verlof kreeg, om weder te komen. Uit onbekende redenen, liet hy van zich niets hooren voor het einde van October. Hy wierd wederom gefondeerd, en de steen aanstonds tegen

gen den mond van de blaas gevonden. Onder de voorbereiding, die veertien dagen duurde, dronk hy dagelyks ruim een stoop van een afkookfel van de gras-heemst- en venkel-wortelen, met *raf. c. c.* en eenige klein gesneden vygen, waar door hy na agt dagen verloor alle pynen in het ontlasten van de pis; maar dewyl de steen by verscheide onderzoekingen ligt weder gevonden werd, en 'er geen hoop was, dat dezelve door het gebruik van den drank zoude verdwynen, of dat de lyder met gemak een half of geheel jaar nauwkeurig de zeep zoude kunnen gebruiken, om te zien, of dezelve den steen zoude ontbinden, werd de operatie ondernomen.

De lyder werd wederom horizontaal (*) gelegd,

(*) Deeze legging is onvermydelyk, indien het verborgen mesje van *Frere Cosme* zal gebruikt worden, om den hals van de blaas te openen: in eene schuinsche plaatfing zoude het gemakkelyk kunnen gebeuren, dat de blaas, welke reeds onder het sondeeren de pis ontlast had, samenviel tegen den hals of mond, en door het uitspringen van het mesje op meêr, dan eene plaats, doorsneden werd in haare vouwen, niet zonder doodelyke gevolgen; 'tgeen ook kan gebeuren, wanneer de blaas ziek, dik, verhard is, of zich niet laat verwyderen. Een onbekende en de uitvinder van het werktuig, welke grondelyk overwoogen heeft deszelfs voordeelen, meent dat deeze plaatfing en geene andere moet verkoofen worden om de genaamde oorzaaken, behalven om de zwaarte der darmen, welke, gepaard met het schreeuwen, en de persfingen van den lyder, dikwils den boodem van de blaas

druk-

legd, gelyk de eerften; de handen en voeten wierden vastgehouden met den band van LE DRAN. De infnyding en opening van de pisbuis wierd verrigt met het gewoone mesje, by het steensnyden gebruikelyk. De mond van de blaas wierd verwyderd met het verborgen mesje, gesteld op N. II., opgeligt, en volgens de uitwendige opening uitgetrokken, welke eindigde midden voor de *tuberositas Ischii*. De voorste vinger van de linker hand wierd in den endeldarm gestooken, om denzelven neêr te drukken, terwyl het mesje te rug getrokken wierd, welk ik ook niet tot deeze volkome wytte gebruikte, dewyl de grootte van den steen zulks niet scheen te vereiffchen. Dezelfde vinger ontmoette den steen onder voor den mond van de blaas op den kant staande; een kleine tang

wierd

drukken naar derzelver mond, en over het werktuig, terwyl men nog bezig is, met den steen op te zoeken, en uit het lighaam te brengen, vooral wanneer de steen gelegen is onder den hals van de blaas op den endeldarm, waar over verder kan nageleezen worden *Recueil sur la taille Paris 1751. & Observations sur la situation la plus favorable qu'on puisse donner au malade dans l'operation de la taille p 186. seq.* Ik vindt ook, dat de Heer SHARP in syne nuttige *R-cherches critiques sur l'etat present de la Chirurgie pag 269*, met eenige verwondering opnoemd het wezenlyk onderscheid tusschen de steensnydingen, welke in Vrankryk en Engeland geoefend worden, ten opzichte van de legging van den zieken. In Vrankryk word de lyder gelegd, hoog met het lighaam opgeligt, in eenen hoek van 45 graaden met de onderste leden; in Engeland integen-



wierd ingebracht, en daar mede wierd de steen aanstonds uitgehaald. De operatie was dus gelukkig en binnen tien minuten volbragt. De wonde gaf niet meêr bloed, dan na gewoonte, en wierd aanstonds met droog pluksel verbonden, waar over wicken, en drukdoeken, gedoopt in oly en wyn, gelegd wierden. Eene aderlating op den arm wierd verrigt, verkoelende amandelmelken, dunne haverfoepen, stoovingen van roode vriesche lappen, in oly en azyn gedoopt, wierden over den buik en balzak gelegd, en gebruikt, als reeds gezegd is.

De

deel, zegt hy, word hy geheel plat op de tafel gelegd, en het hoofd alleen op een kussen geplaatst. De voordeelen van deeze plaatsing zyn reeds opgenoemd, maar de redenen van het opligten van het lighaam, by de Fransche Heelmeefters in gebruik, vindt ik niet aan de hand gegeven.

De mond van de blaas word daar onder wyder, en de hals korter, waar door men dat voordeel heeft, dat de gesleufde *algali* gemakkelyker ingebracht en bestuurd word na den bilnaad of de uitwendige insnyding: De steen volgt nu met de pis tegen den mond van de blaas zoo veel schielyker. dewyl de drukking van het middenrif en de zwaarte de darmen daar toe veel toebrengen. De blaas leid ook waarlyk minder onder het zoeken met de tang, als dezelve rond en in eene schuinsche legging verkort is, dan wanneer sy met den lyder horizontaal geplaatst is. My dunkt daarom, dat beide plaatsingen haare voor- en na-deelen hebben, zoo dat sy beide zouden kunnen gebruikt worden, na verschil der omstandigheden, en byna in eene en dezelfde operatie.

De operatie geschiede op den middag, den zesden November in de tegenwoordigheid van den Lyf-artz SCHÜTZER, den Hoogleeraar MARTIN, als ook den Heelmeeſter PHEIFS: het overige van den dag en den nagt had hy ruſt en geen aanmerkelyk ongemak. Den zevenden voor den middag had hy vier dunne afgangē. Het verband wierd na vereiſch der zaaken veranderd, als de pis hetzelfde nat gemaakt had. In den namiddag ten vier uren was hy vry van de afgangē, maar zeer vermoeid, en had eene kleine ongeregelde pols; de balzak was buiten gewoonte blauw, koud, en gevoelloos; de wonde friſch, rood, en wel ſamengevallen; de buik zeer zagt. Hy klaagde nergens anders over, dan over vermoeidheid, en was ylhoofdig. Alle middelen wierden in het werk geſteld, om de drygende verſterving voor te komen, maar even na den middag, of agt- en dertig uren na de operatie, ſtierf hy. Een zoo deerniswaardige uitkomst van eene zeer gelukkig in het werk geſtelde operatie, vereiſchte een onderzoek na de oorzaak.

1. Wierd de geſleufde ſonde gebragt door de geheele pisbuis en gemaakte opening in de blaas.
2. Wierden de *musculi ischio- & bulbo- cavernosi* met de pisbuis bloot gemaakt en doorgesneden tot in de blaas. De inſnyding wierd gevonden, ten eenenmaale verdeeld te hebben de linker *accelerator*. De *Isthmus urethræ* was nog ſlap en wyd.
3. Wierd de buik geopend, het celag-

tig weeffel van het buikvlies in het bekken rondom de blaas was ſterk ontſtooken, gevuld met een *ichor ſanioſus*, gewoon by ontſteekingen en het vuur. 4. Wierd de blaas in den grond geopend, en zoo uit- als inwendig geheel natuurlyk en gezond gevonden. 5. Wierd de inſnyding in den mond van de blaas beſchouwd, en ter breette van drie lynen toegegroeid gevonden, aan de linker zyde boven den bovenkant van de linker *proſtata*, ten eenenmaale gelyk, en geneezen, zonder dat eenig ander gedeelte geraakt of gekwetſt was. 6. Waren de balzak, *Dartos*, en ſcheedevormige vlieſen van de ballen en zaadſtrengen weinig minder, dan geſphaceleerd, tot in het gedeelte, dat door de ringen tot aan het celagtig weeffel van de blaas in het bekken gaat, gelyk nu gezegd is.

Eene andere oorzaak van den dood wierd hier niet gevonden. Ongelukkig was het, dat deeze lyder, onder de voorbereiding, veertien dagen lang, woonde in een vertrek en lag tuſſchen twee zwaare *Empyici*, welke in den beginne met derzelver uitteering de lugt zeer ſchadelyk maakten. Ook was het onvoorzigtig, dat ik na de operatie den lyder ſynen zin gaf, om wederom te leggen in hetzelfde vertrek, tuſſchen een' *Empyicus*, en een', die kwikmiddelen gebruikte.

Met een woord, behalven eene verborge geneigtheid tot eene bederving der vogten, welke
wy,

wy , dikwils genoeg , onverwagt ontmoeten na heekundige handwerken , was dit genoegzaam , om de genaamde deelen fchielyk in het vuur te doen overgaan en daar door den dood te weeg te brengen: noch eene bloedftorting , noch het aanraaken van andere deelen met het verborgen mesje , dan die van welke gefproken is , of een onderfcheid van het verband en de midde- len , welke te vooren wel uitgevallen waren , vondt hier onder de oorzaaken van den dood plaats.

Op 's Lyders goed en gezond uitzien , kon men geen zekerder voorzegging over de operatie bouwen ; het gebeurt zeer dikwils , dat die , welke het beft uitzien , de zwaarfte toevallen krygen , eene heevige koorts , eene langzaame of in het geheel geene verettering , eene onverwagte verfterving. Daarentegen fy , die van voorafgaande ziekten meêr aangetaft zyn , en zonder koorts gevonden worden , gemakkelyk de gevolgen van de operatie doorftaan en geneezen worden.





X.


*Calculi Urethræ.**Steenen in de pisbuis.*

Verscheide zulke steenen zyn van tyd tot tyd uitgesneden, en, dewyl daar toe behoord weinig konst en geene gevaarlyke gevolgen, daar na worden waargenomen, zal ik alleenlyk met weinige woorden opnoemen de manier, daar by gevolgd. 1. Heeft eene lange voorbereiding alhier geene plaats, dewyl de lyders in eene aanhoudende pyn zyn, en aanstonds moeten worden geholpen. 2. Heb ik de insnyding gemaakt op den steen, welke meestendeels door de pisbuis en uitwendige bekleetselen gekend word, in evenredigheid met de grootte, altyd aan de linker zyde van de pisbuis en steen, in de lengte van de *penis*, digt onder het linker *corpus cavernosum*. 3. De steen is te voorschyn gebragt met een *curette*, gebooge sonde, of soortgelyk werktuig, naar maate het zich daar toe 't best schikte. 4. De wonde is aanstonds bedekt met fyn plukfel, waar over de *Bals. Samarit.* met fyne compressien, en hegtpleisters gelegd zyn. Zoo dikwils de pis door het verband gedrongen was, is hetzelfde veranderd; de overige oppassing is ten naa-

naasten by gelyk aan die geweest, welke by de steensnyding in de blaas gebruikelijk is.

Zoo de wonde niet gevat heeft, is dezelve tot verettering gebragt met eene ettermaakende zalf uit *Bals. de Mecca* en *vitell. oor.*, vervolgens is de pis door den natuurlyken weg geleid met *bougies* van *Empl. Diapomph.*, altyd met groot nut; en oogenschynelyke geneezing der wonde.





X I.

Retentio urinæ ex fungo caseoso.

Eene opstopping van water, veroorzaakt door een fungus gezwel in de blaas.

Een Boer, uit het Kerspel *Vermdö* in *Roslagen*, een- en veertig jaaren oud, kwam in het Hospitaal in 1753. Hy was verscheide jaaren ziekelyk geweest, en voornamentlyk geplaat by de ontlasting van de pis, welke ontlasting somtyds schielyk gestuit wierd, terwyl de pis somtyds met veel bloed vermengt te voorschyn kwam.

Hy was nu bleek in het aangezicht, gezwollen over den buik van den navel tot het schaambreen; de pols was klein, ras; en hy had eene sleepende koorts, alle namiddagen en den halven nacht. Daar by kwam eene onmogelykheid, om de pis te lossen, en door de prikkeling de allerzwaarste pyn: want eenige dagen verliepen 'er, zonder dat 'er een droppel pis ontlast wierd, en andere dagen volgden daar op, in welken de pis boven maaten en onwillig wierd geloosd; de opstopping vermeederde de gewoone pyn en spanningen in den beneden buik, waar van hy anders verligting had, doch nooit

vry

vry was; de droppelswyze ontlasting verschaft hem inwendig wel verligting, maar door de scherpte der half verrotte pis, welke 's nagts dikwils het glas voor by liep, wierd syn lighaam aangedaan en ontveld, onaangezien men zoo zindelyk, als mogelyk, was.

De pis, welke in het glas kwam, was wit, troebel, als bier-wey, zonder grondzetsel; de reuk daar van was zuur. Het flimste was, dat hy niet kon gefondeerd worden. Zoodra de *catheter* tegen den mond van de blaas kwam, vindt dezelve eenen tegenstand, waar uit aanstonds dun bloed te voorschyn kwam, en langs het werktuig liep, ja eenige uren ontlast wierd.

Met *bougies* lukte dit niet beeter; zoo dat de blaas van het begin tot het einde niet kon gefondeerd word. De *Regio vesicae* wierd bemerkt meêr vol en steviger te zyn, dan natuurlyk is, maar in den hoogsten graad van opstopping wierd dezelve niet vermeerderd, gelyk wanneer de blaas door de opgehoude pis opsteigt, en zeer gespannen word boven het schaambeên.

Pisdryvende middelen wierden, met even weinig vrugt, gebruikt, als de uitwendige verdryvende en versterkende, die over den onderbuik en de blaas gelegd wierden.

Na dat hy agt weeken in het Hospitaal geweest

weeft was, en na dat de overige kragten door eenen loop verminderd waren, zwollen de onderfte leden fchielyk op, gelyk ook de teeldeen en uitwendige bekleetselen van den buik, waar op de dood volgde.

By het openen van den buik wierden meeft alle de ingewanden in eenen ziekelyken ftaat gevonden, en, in de holligheid eenig uitgeftort vogt, omtrent tot de quantiteit van een ftoop. Het net was dun en mager. Het darm-canaal overal geelagtig. In het darmscheil waren veele harde klieren, de lever was groot, geelagtig, en zeer bros. De milt en nieren klein zonder merkelyke verandering.

De pisblaas wierd eenigzins opgezwollen gevonden, niet over het fchaambeen maar tegen den navel tuffchen de darmen. Na dat dezelve was afgezonderd van het celagtig weeffel, welk zich overal aan vafthepte, en vol water was, wierden derzelver uitwendige en vleefchagtige vliefen van dezelfde gefteeldheid gevonden, als het zenuwagtige vlies; wanneer fy te famengevouwen met den vinger gevat wierden, kwam de dikte overeen met geweekt leder.

De *catheter*, die nu beproefd wierd, ging gemakkelyk in de blaas, zonder dat 'er door het buisje eenig water te voorfchyn kwam. De blaas wierd kruiswyze geopend in derzelver voorfte gedeelte en den grond. Twee of drie
lepels

lepels vol pis waren daar in. Derzelver hol-
ligheid was gevuld met losse, en aan de zyden
vasthangende, kaasagtige brokken, zoo wit als
melk, van steevigheid volkomen als doorgedaane
en samengedrukte bier-kaas.

De hals van de blaas was kraakbeenig, en de
vliessen van dezelve rond om de openingen van
de pisleiders hard, knobbelagtig, en bros, zoo
dat ik met het minste geweld den vinger door
de blaas kon steeken. Het zenuwagtige vlies
was zeer ongelijk; en derzelver *cryptæ* en *lacu-
næ* gevuld met gemelde kaasagtige stoffe (*).

(*) De voornaamste oorzaaken van de pisopstopping
in de blaas zyn van den Hr. LA FAYE in syne Aanmer-
kingen op DIONIS pag. 199. en vervolgens duidelyk en
wel voorgesteld. Onder den tytel van uitwassen in de
blaas, als oorzaaken van dit ongemak, raad hy de blaas
te openen in den bilnaad, en door middel van eene borst-
sonde met insputtingen te zuiveren; syne meening is
zonder twyfel door den mond van de blaas, gelyk, wan-
neer men de buigzaame halve *catheter* in de blaas laat na
de steensnyding, om het gruis en de slym uit te spoelen.
In dit geval had zoo eene zuivering mogelyk kunnen
ondernomen worden; maar. 1. kan men door het sondee-
ren niet verzekerd worden van den aart des gezwels,
want is hetzelfde vastgehegt met de vliessen van de blaas
of met de *prostatæ*, gelyk de Hooggeleerde Heer MARTIN
in de Verhandelingen van de Koninglyke Academie der
Weetenenschappen 1758. pag. 222. zoo wel beschreeven
heeft, en ik zelve een en andermaal heb gezien, word
de proef onmogelyk en schadelyk. 2. zoo het gezwel
kankeragtig is, worden de gevolgen binnen korten tyd
doodelyk. 3. Al kan hetzelfde al gelukkig van de zyden
van de blaas wechgenomen worden, zoude egter de oorzaak

overblyven, namentlyk eene ziekeleyke blaas, of verharde *prostatā*, waar uit hetzelfde weder schieelyk zoude opgroeijen. De dertigste Waarneeming van den Hr. WARNER over een gezwel, welk gelukkig uit den hals van de blaas genomen wierd, geeft geene aanleiding om te gelooven, dat hetzelfde van dezelve soort was, maar veel eer eene vliesige slym-prop, gelyk uit het verhaal daar van blykt.

Eene vrouw, namentlyk, van drie- en twintig jaaren, deed den 24. Juny 1747. eene sterke pooging, om een zwaar pak op te ligten. Sy kreeg daar op aanstonds pyn in de lendenen, en eene pis-opstopping, welke toevallen, onaangezien alle middelen, die daar tegen gebruikt wierden, tot den negen- en twintigsten van dezelfde maand aanhielden. Sy riep toen een vermaard vroedmeester, die haar deed wateren door middel van den *catheter*. Voor deeze operatie had sy geduurende agt-tien of twintig uren veel zoutagtig vogt gebraakt, waar onder bloed geweest was. Wanneer sy zich wilde neêrleggen, raakte sy hetzelfde in eene zoo groote quantiteit kwyts, dat sy scheen te zullen stikken. Ook had sy koorts, zoo lang de pis-opstopping duurde. In April 1750. kwam sy by den Hr. WARNER. Hy hoorde, dat sy na het toeval geen droppel pis had konnen loofen, zonder hulp van den *catheter*, en dat sy denzelven daarom drie of vier maalen in vier- en twintig uren had gebruikt; de pyn was aanhoudend; en sy was zeer verzwakt door de groote quantiteit bloed, welke sy eenige reizen was kwyts geraakt, door het geweld, by het inbrengen van den *catheter* gedaan. Na dat hy met veel moeite den voorsten vinger in de pisbuis had gebragt, ontdekte hy een aanmerkelyk gezwel, welk hem vleeschig scheen te zyn. Hetzeive sproot voort uit den onderkant van de blaas, digt by den hals, en met moeite kon hy aan deszelfs wortel komen. Hetzeive kwam een weinig uit de pisbuis, als sy pooging deed om het water te loofen, maar ging wederom naar binnen, zoo dra deeze pooging ophield. Het was omrent even eens gebleeven van het eerste oogenblik, dat

men het had bemerkt. Voor agt-tien maanden had een Heelmeeſter daar in eene kleine opening gemaakt, om dat hy meende, dat 'er vogt in bevat was, doch niets kwam daar uit. 's Avonds voor de operatie gaf men haar een zagt buikzuiverend middel, en liet eenige uren voor dat dit werkte een clyſteer zetten. De endeldarm wierd op deeze wyze ledig gemaakt, en drukte minder op het onderſte gedeelte, en op den hals van de blaas. Dus was het veel gemakkelijker, de operatie te volbrengen, en hy ging toen tot dezelve over. De blaas vol zynde, raade hy de vrouw, poogingen te doen, om te wateren, en daar door kwam het gezwel een weinig te voorchyn. Hy vatte het gezwel, en ſtak door hetzelve op verſcheidde plaatſen eene naalde en draad. Hy poogde toen hetzelve buiten de pisbuis te trekken, maar hy kon daar toe niet komen, uit hoofde van de grootte. Deeze moeyelykheid ſpoorde hem aan, om de pisbuis aan de regter zyde te verwyderen, 't geen hy deed, met dezelve tot op de helft van den hals van de blaas door te ſnyden. Vervolgens het gezwel na zich haalende, kon hy het van onderen vaſtbinden, en den zesden dag daar na wierd dit gezwel los. Het had de grootte van het ey van een kal-koen, en kwam daar mede in gedaante ook eenigzins overeen. De drie eerſte dagen na de operatie klaagde ſy over zwaare pyn in den buik. Van den eerſten dag loosde ſy de pis zonder hulp, en herſtelde vervolgens volkomen.






X I I.

*Ascarides urina ejectæ.**Kleine wormen met de pis geloosd.*

Eene magere, en ziekelyk vrouw van veertig jaaren, had, binnen den tyd van agttien maanden, uitgestaan eene derdendaagfche koorts, welke vier maanden had geduurd; in het kraambedde gelegen; de geelzugt gehad; eindelyk gekreegen eene zwaare *pleuro-pneumonia*, welker zitplaats was op den grond van de regter holligheid van de borst of dicht by het middenrif, en waarfchynelyk naar beneden gemeenschap had met het buikvlies en de lever, dewyl fy toen op nieuw geel wierd. Eindelyk, en, na dat de ftaat van ontfteeking na het gebruik van allerley dienftige middelen door de fluimloofing, en een rykelyk zweet wech genomen was, had fy tot op den vyfden dag geen pis geloosd, met regt denkende, dat het zweet al het water, welk anders door de piswegen afgezonderd wierd, uit het lighaam bragt: wanneer eindelyk de pis in eene geringe quantiteit begon voor den dag te komen, rook dezelve zeer fterk, doch was bleek, en eenigzins met flym vermengt. In de flym beweegden zich veele kleine wormen, kort en puntig aan beide enden,

den, gelyk de gewoone *Ascarides*, beschreeven door den Ridder en Lyf-arts LINNÆUS *Faun. suec.* 1269. Zoo dra de pis koud wierd, waren sy dood. De lydereffe had noch voor, noch na dien tyd, eenig ongemak van deeze diertjes gehad. Ik geloofde in het begin, dat sy uit den endeldarm konden komen, en met de pis vermengt worden; maar wanneer men dit nauwkeurig onderzocht, wierd ik eindelyk volkomen overtuigd, dat sy met de pis uit de blaas kwamen, en dat wel in eene zoo groote quantiteit, dat sy met de slym wel een agtste gedeelte van de pis uitmaakten. Na dat het zweet verminderde, en de kragten eenigzins begonnen weder te komen, veranderde zich ook de pis, verloor den verrotten stank, het grondzetsel, en de wormen, waar na sy wederkreeg haare gewoone en zwakke gezondheid. My dunkt, soortgelijke aanmerkingen van den oorsprong van wormen in de pisblaas, als eene oorzaak van de opstopping van water, by verscheide schryvers gelezen te hebben, maar kan my nu geene andere te binnen brengen, dan die, welke aangehaald worden door N. ANDRY *Tract. de generat. verm. in corp. hum.*, D. CLERICUS in *Hist. lat. lumbr.*, JOH. SALZMAN in *Diff. de verme naribus excuss.* p. 1. GUL. CÆSAR. CLAUDINUS in *Rep. med.* 40. ED. BARRIS *act. Edimb. Tom. V. P. I. pag.* 988. *Alt.* 1752. MANGET in *Bibl. Chir. T. IV. p.* 323. FABRICIUS HILDANUS *Cent. I. obs.* 53.





X I I I.

*Vesica retentione lotii distenta & casu
disrupta, eventu lethali.*

*Eene toevallige openbersting van de blaas by eene pis-
opstopping met een doodelyk gevolg.*

Een oud man, van zeventig jaar', was dikwils geplaagd geweest met opstopping van water; terwyl de witte, flymerige, aambeijen, die hem veele jaaren lastig waren geweest, somtyds de *vasa hypogastrica* en klieren in den endeldarm aandeeden, als ook de *prostatæ* te gelyk met de *substantia glanduloso-spongiosa*, in den hals van de blaas en de pisbuis opzette (*).

Door

(*) Behalven deeze oorzaak der pisopstopping, welke eigen aan deezen lyder was, konden allerhande omstandigheden daar toe gelegenheid geeven. Nauwelyks heeft eenig Schryver over de beoeffening der Heelkunde duidelyker en beeter dezelve afgeschilderd dan de Hr. LA FAYE, in syne aanmerkingen over DIONIS van pag. 200. tot 213. Eene ontsteeking van den hals van de blaas, eene verlamming der blaase, het zy uit ouderdom, het zy uit eene aandoening der hersenen, vreemde lighamen in dezelve, welke den loop van de pis beletten, geiyk zyn geronnen en met een' korst bedekt bloed, waare steenen, sponsagtige vleeschgewassen, lang opgehouden en verrotte pis, taaye slym, wormen, eene opzwellling van
de

Door het gebruik van bekwaame middelen was hy te vooren eenige reizen geholpen van dit ongemak, zoo dat de pis den vryen loop wederkreeg; maar de laatste reis in de lente van het jaar 1758. en wanneer de blaas tot op het uitterste gespannen was, zoude, onder andere middelen, een verzagtend clysteer gezet worden, waar by het gebeurde, dat hy, die het clysteer zette, en niet dacht op de half ronde en sterke uitzetting van de blaas tegen den endeldarm, zoo wel als over het schaambeen, met meêr kragt eenen weg wilde maaken voor het pypje, meenende, dat de tegenstand voortsproot van harde drekstoffen, door welke het pypje moest voortgestooten worden. Het clysteer wierd gezet, en daar by voelde de lyder eerst zeer schielijk pyn, en kort daar op eene aanmerkelyke verligting van de pis-opstopping, zonder dat het regte oogmerk, waarom het clysteer gezet was, daar aan eenig deel had. De opzetting van de blaas boven het schaambeen verdween, en alle toevallen verminderden; maar na verloop van twaalf uren openbaarde zich op nieuw ongemak in


de *prostate*, opzetting van den hals van de pisbuis, als ook eene vereeniging van denzelven, eene drukking van de vrugt, of eenig ander uitwendig gezwel op den hals van de blaas, kunnen, elk voor zich, de pisopstopping veroorzaaken. De genoemde Schryver brengt ook by de beste manieren, om de pisopstopping wech te neemen, en verwerpt met regt het gebruik van invreetende bougies.


in den buik, verzeld met eene magteloosheid, koud zweet, verlies van gevoel, en spraak, waar op de dood binnen vier- en twintig uren volgde.

Ik hield de openberfing van de blaas verdagt, en was begeerig, om door het openen van het lyk daar van verzekerd te worden.


Zoo dra de spieren van den buik en het buikvlies geopend waren, bemerkte men eene fcherpe en vlugge reuk van de pis, welke overal in de holligheid van den buik tuffchen de darmen liep, en ook onder in het bekken was. Dezelve wechgenomen zynde, wierd de blaas bezigtigd, welke voor de helft was ingevallen na de eerste uitzetting. Aan den agterkant, twee overdwarfche vingers boven de regter pislyder, wierd eene spleet gezien door den uitwendigen, en den spieragtigen rok van de blaas, eenen overdwarfchen duim lang, welke eindelyk door den inwendigen zenuwagtigen en ruigen rok met eene opening, zoo wyd als eene groote ganfpen, drong; hier had zich de bevatte pis uitgestort. De endeldarm wierd bezigtigd, of 'er geene opening of teken van kneufing aan de uitwendige vlielen kon gezien worden, maar men vondt 'er geene, zoo dat, als het voorgevallene, en de uitwendige gesteldheid van de openberfing niet getoont hadden, hoe het geval was gebeurd, men gemakkelyk had kunnen gelooven, dat de openberfing van de blaas alleen

leen door de ophooping van de pis veroorzaakt was, 't geen niet zonder voorbeeld zyn zoude. De volle en opgespande blaas bood hier meêr tegenstand, dan de endeldarm, en moest derhalven door de drukking van het pypje bersten uit dezelfde oorzaak, als in sommige gevallen de beenderen in het menschelyk lighaam door eenig geweld, uit hoofde van den tegenstand, breeken, terwyl de uitwendige en weeke deelen mede geeven, en onbeschadigd blyven.






HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



VIERDE HOOFDSTUK.

VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN DE BOVENSTE LEDEN.




I.

Spina ventosa cum Pedarthrocace.

I.

Spina ventosa in flexura cubiti.

Een Wind-doorn in de buiging van den elleboog.

 Een afgedankte Artelerist, zes- en twintig jaaren oud, had veele jaaren agtereen, om den anderen dag, koude en koortfge hitte gehad, welke eindelyk overliet een' droogen uitslag (*scabies lichenosa*) over het geheele lighaam, het aangezicht uitgezonderd.

Voor-

Voornamentlyk had de fcherpe ftoffe zich bepaald op den regter elleboog, en deeze geheele geleding, waar na fy de beenderen, kraakbeenderen en banden aandeed, als mede het lid deed zwellen tot de middenlyn van eene halve el, genomen van de vier hocken. De opperhuid was opengeberften, en de huid in een witte fponsagtige zelfftandigheid veranderd. De onderfte arm was zeer gezwollen tot het einde der vingers; de pols was aan de hand duidelyk en kenbaar, maar niet in de buiging van den elleboog.

In deezen ftaat kwam hy in het Hospitaal in 1753. Behalven het afzetten van den arm boven den elleboog kon men geen ander middel ter geneezing voorftellen. Dit wierd van den lyder toegeftaan, en in het werk gefield.

Het Tourniquet van den Hr. PETIT wierd onder den oxel aangelegd. De infnyding gefchiede in twee reifen, namentlyk, eerft door de huid en het vet, welk naar agteren getrokken wierd, vervolgens door de fpieren, en het beenvlies; eene goede overdwarsche hand boven de zwelling. Na dat het opperarm-been afgezaagd was, wierd de *arteria brachialis* met naalde en draad toegebonden volgens gewoonte. De verettering was den zevenden dag beoorlyk.

Zonder eene aanmerkelyke affchilfering van
 X het



het been, was de wonde geneezen in de negende week. De laatste drie weeken wierden alerhande bloedzuiverende middelen gebruikt tegen den uitslag, zoo wel in- als uitwendig, gelijk een *Decoct. ex Rad. Sarsæ. unc. iv. Bardanæ, Chinæ, ä unc. ij. polyp. unc. j. sem. Fænic. dr. ij. cum aq. fluv. cong. ij.* tot op de helft gekookt; dagelyks wierd daar van een stoop gegeven. Daar by 'smorgens en 'savonds, ja somtyds drie reifen 'sdaags, een half dragma van het volgende: *Aethiops. min. unc. j. Diagrydii sulphur. Resin. Guajaci ää. dr. ij. Aloës Gum. dr. ß. Rhei Alex. dr. jß. Sacchar. alb. unc. j. m. f. pulv.*

Na dat deeze middelen agt dagen gebruikt waren, wierd de uitslag gesmeerd met *ung. citrinum. Edimb.*, waar door de uitslag op de slimste plaatsen verdoofd wierd; alwaar de kloove en uitslag famenliepen, wierd het *Empl. Stict. Hamb.* gelegd, en om den anderen dag met veel voordeel veranderd.

By het wechgaan was hy in een' dragelyken toestand: een jaar daar na vertoonde hy zich op nieuw, wanneer de linker hand, en de einden der vingers tot over het gewrigt, door voortgelyke zwellling aangedaan waren, als de rechter arm het jaar te vooren, maar alleenlyk in het celagtig weeffel en de huid; de hand had dus een *oedema erisipelatodes*. Hy wierd geraaden; 1. alle week in den zomer eens in het damp-bad te gaan; 2. het bovengenoemde afkooksel

kookfel met de helft melk te drinken. 3. de hand 'smorgens en 'savonds te smeeren met *Spir. vin. Gall. Bjj. Tinct. fetid. Lond. unc. j. Spir. sal. Ammon. dr. ij. mell. alb. unc. ij.* 4. daar over te leggen zakjes met kruiden van *summit. Absynthii, abrotani, scordii, pulegii, rad. levistici.* enz. 5. het bovengenoemde poeder te gebruiken, als te vooren. 6. zich alle twee maanden aan het Hospitaal te vertoonen, na dat hem de geneesmiddelen om niet gegeven waren. Binnen drie maanden was het gezwel ten eenenmaale verdweenen van de handen, en de uitslag met de jeukte byna geneezen.

Dit laatste is egter vervolgens van tyd tot tyd wedergekomen; maar de eene hand gebruikt hy onverhinderd, en is gezond. De ontaarting der beenderen van den opper-arm, de *ulna* en *radius* konnen gezien worden in de Verhandl. van de Koninglyke Sweedſche Acad. der Weetenſchappen, voor den jaare 1754. Tab. VIII. fig. 4. 4°. (De afbeelding daar van is ook agter deeze vertaaling gevoegd.)

2.

Spina ventosa ossis humeri cancroſa.

Een kankeragtige Wind-doorn van het opperarm-been.

Een Boeren-knegt uit Westmanland, vyf- en twintig jaaren oud, had, na eene zwaare heete ziekte, in den tyd van tien weeken gekreegen



een gezwel in synen linker arm, welk begon in het opperarm-been en hetzelfde uitzette, zoo dat hetzelfde binnen den tyd van twee jaaren tot eene middenlyn van vier en eenen halven duim uitgezet was.

In 1756. kwam hy in het Hospitaal, en, dewyl het opperarm-been niet alleen aan eene zyde een uitwas had, maar geheel en al uitgezet was, zoo kon 'er niets beproefd worden, dan hetzelfde boven de zwellings wech te neemen. Dit wierd dan in het werk gesteld.

Eerst wierd het Tourniquet van den Hr. PETIT aangelegd, en daar na wierd de insnyding, gelyk boven gezegd is, in twee reisen gedaan. De opzetting van het opperarm-been begon om of eindigde zich onder de vasthegting van de *musculus Deltoides*; derhalven wierd een derde gedeelte van het onderste van deeze spier losgemaakt van het opperarm-been, om dat de overige spieren rondom doorgesneden wierden; de lap wierd opgeligt, de ronde sneede rondom den arm geschiede, twee of drie overdwarsche vingers meêr naar boven, alwaar het been afgezaagd wierd. De slagader wierd onderschept, en het hoofd-verband (*le capeline*) aangelegd.

Het bovenste afgezaagde gedeelte van het opperarm-been zag 'er zeer fris uit; het wechgenome gedeelte was rondom opgezet, van buiten hard, maar van binnen opgevuld met eene
stin-

stinkende, rottige, stoffe in de veelvuldige celletjes van het been; het verband bleef droog; de eerste vier- en twintig uren waren dragelyk. De gewoone in- en uitwendige middelen wierden nauwkeurig gebruikt. Na verloop van vier- en twintig uren, tegen den nacht, kreeg hy eene ondragelyke pyn in den stomp met trekkingen, welke zelfs niet met de hand konden belet, en gestuit worden: Binnen den tyd van twee uren, wanneer ik hier van kennis gekreegen had, en naar het Hospitaal gekomen was, was het geheele verband, en het hoofdkussen, welk by den stomp lag, doortrokken met een groen, scherp en zuur riekend water. Het verband werd afgenomen, en toen bemerkte ik met verwondering, dat het vleesch in eenen ronden kring vier vingeren hoog opgezet was; plukfel besproeid met *Bals. Fioraventi* wierd daar over gelegd, en daar na compressen met *ol. ceræ*, om de verrotting tegen te staan; alle pleisters wierden wechgenomen, en een los verband aangelegd. Syne pyn was even zwaar; de trekkingen in den stomp strekten zich met eene huppeling der spieren en peesen uit, tot agter aan het schouderblad, tot voor aan den hals, tot boven het oor, en de onderste kaak, welke meêr en meêr tegen de bovenste begon te fluiten; de pols was klein en langzaam; inwendig wierden verzagende middelen voorgeschreeven.

Den volgenden morgen, den derden dag, was hetzelfde wederom doortrokken met een groen-

agtig water, wanneer het veranderd wierd. In den namiddag ten vier uren was het wederom zoo nat van een groen uitgelekt water, als of het in groen vitriool-water gedoopt was. Dit wierd wechgenomen en veranderd. De toevallen waren meêr vermeerderd, dan vermindert: het vleesch was zeer bleek en sponsagtig, de trekkingen dezelfde, de pols een weinig raffer, dan den voorigen dag; de kragten verminderten gestaadig.

Op raad van den Lyf-artz en Ridder Rosén, aan wien ik toevallig dit geval verhaalde, wierd den zieken den volgenden dag gegeven de volgende flikbrok: *R. Castor. opt. gr. xij. moschi gr. vj. camphoræ gr. viij. mass. pill. anod. N. D. A. & Eq. R. gr. iv. conserv. rosar. rubr. q. s.* twee maalen 'sdaags, en daar tusschen eene amandelmelk met kina, als ook flappe wyn-soepen tot voedsel. Daar mede wierd drie dagen met de grootste oplettenheid voortgegaan.

Doch de stomp zwol langs zoo meêr op; waar by het uitsieperende groene water in kleur en stank toenam, zoo dat men nauwelyks het verband kon naderen. Hy stierf den zesden dag; na dat alle toevallen hem onveranderd bygebleven waren tot den laatsten adem.

Na den dood wierd het uiteinde van het been bloot en van de spieren los gevonden, byna tot aan het gewrigt, het vleesch wit, met water opgezetz,

gezet, en even als van het been af naar buiten gedraaid.

Als nu deeze alleen door trekkingen aangedaan was geweest, zoude ik allerhande flegte gisfingen daar omtrent gemaakt hebben, als dat de zenuw met de flagader toegebonden was, dat de fpieren te dicht by derzelver oorsprong waren afgesneed, en foortgelyke meêr. Maar, ten opzigte daar van was het wel goed, doch anders beklagelyk, dat twee andere lyders, by wien de afzetting was verrigt, op denzelfden tyd met hem lagen in hetzelfde vertrek, en dat deeze zonder tekenen van eene vernieuwde kanker zulke trekkingen kreegen, dat fy niet konden gestuit worden, gelyk beeter onder by het afzetten van de beenen zal gezegd worden.

3.

Spina ventosa carpi & metacarpi.

Een Wind-doorn aan de voorhand.

Een afgedankte Soldaat, agt en dertig jaaren oud, had langzamerhand in den tyd van anderhalf jaar gekreegen eene zwelling in de regter hand, welke reeds zederd tien maanden dezelve onbruikbaar had gemaakt, zoo dat hy die in een' armband moest draagen.

Hy kwam in het Hospitaal in 1755. De gele-

ding en het bovenste van de hand waren voornamentlyk aangedaan, onbeweegelyk, zoo hard, als been, buiten maaten gezwollen, de vingers glinsterden en waren styf. De huid was overal los, gebersten, verzworeen, en uit de zweetgaten kwam bestendig vogt. Eenige pyp-zweeren wierden gevonden zoo boven als onder het ongemak, welke alle naar het bedorven been liepen.

Men besloot, de hand wech te neemen, en dit geschiede na eene voorbereiding van eenige dagen. De operatie en het stuiten der bloedsstorting met eyken-zwam wierd volbragt zonder eene nieuwe bloeding. Geene toevallen kwamen 'er by; nauwelyks wierd de etterkoorts bemerkt. Op den zevenden dag wierd de zwam los gemaakt, gelyk ook het geheele verband. In de agtste week was hy geneezen. De beenderen van den *Carpus* waren in eene kraakbeennige stoffe ontbonden; de beenderen van den *metacarpus* boven maaten gezwollen met derzelver agterste deelen.

Hy wind nu tamelyk wel de kost met te speelen op de viool, en heeft aan den stomp een boog van staal, welke na vereisch vastgeschroeft word aan den strykstok.

4.

Osteosteatoma feu Spina ventosa digiti annularis sinistri.

Een Wind doorn op den ringvinger van de linker hand.

De zoon van een' Boer uit het Kerspel *Fasta* in *Roslagen*, een- en twintig jaaren oud, kwam in 1754. in het Hospitaal.

Hy was zederd drie jaaren geplaagd met een gezwel op het tweede lid van den linker ringvinger, welk zoo groot was, als eene Renetappel. Hy wist de allerminste oorzaak daar van niet, noch of de grond daar van inwendig of uitwendig was. Het gezwel sproot voort van den binnenkant van het tweede beentje van den genoemden vinger, was zoo hard, als het been, met hetzelfde beweegelyk, geheel rond, van 2½ duims middenlyn, zoo vast aan het been, als een gal-appel aan een' Eyken, behalven dat het gezwel met de beenderen van het gewrigt dezelve gemeenschap en ook dezelve uitwendige bekleetselen had. Daar was van het begin geen pyn by geweest, of eenig ander ongemak, dan een beletfel by het werk en eene geweldige verwydering van den kleinen vinger.

Het wechneemen was het eenige middel ter
X 5 hulp.

hulp. De vinger wierd in het gewrigt met het *os metacarpi* los gemaakt, waar by de huid door twee insnydingen op zyde wel bewaard wierd, om het hoofd van dit been te bedekken.


Op het einde van de vierde week was de geneezing grootendeels volbragt; doch toen begon het *os metacarpi* fchielyk te zwellen, en kreeg een *tophus*, zoo groot, als een hoener-ey, zonder aanmerkelyke pyn of gevoel. Deeze wierd besmeerd met een mengfel van *Spir. vini Camphor. unc. iij. Tinct. fœtid. Lond. unc. ss. Spir. sal. Ammon. dr. ij. ol. C. C. fœt. gtt. xx.*; en om de andere reis afgewasschen met franschen wyn en brandewyn, van elk even veel. Een kruiden-zakje van *summit. Absinth., scordii, pulegii* ää. *unc. j. Gum. affæ fœt. sal. tart. ää. dr. j.* wierd daar over gedraagen.

Na dat decze middelen drie weeken lang gebruikt waren, verdeelde zich het gezwel geheel en al, en de wonde wierd insgelyks geneezen, zonder affchilfering van het been, gaande hy gezond naar huis.

Het beenagtig gezwel, blootgemaakt zynde, deed zien, dat deszelfs geheele buitenste gedeelte was eene voortzetting van de beenlagen, voortkomende van de *lamellæ* van den vinger, zonder dat dit beentje daarom iets meêr of minder groot was. Het gezwel was dus uitwendig geheel en al met been bedekt, inwendig
hol,

hol, voorzien met eene celagtige beenagtige zelfstandigheid, in welker holligheden gevonden wierd eene foortgelyke rottige stoffe, als in de holligheid van het opperarm-been, gelyk gezegd is in eene andere waarneeming over deeze wind-doorns, ontdekt te zyn. Ik heb kortlings met blyfchap uit het genoemde Kerspel vernomen, dat hy zederd geen gevoel daar van gehad heeft.

Men zoude nog meêr gevallen van deczen aart kunnen bybrengen, welke toonen, hoe onzeker de uitkomst der zaaken is, welke voor de operatie byna elkander gelyken, maar naderhand zoo geheel en al anders uitgevallen. Van de wind-doorns, die op de onderfte leden voorkomen, zal omftandig op de behoorlyke plaats gehandeld word.





I I.

Caries humeri exfoliatione curata.

Eene been bederving aan het opperarm-been door eene afschilfering geneezen.

Een Boeren-knecht van *Westmanland*, zes- en twintig jaaren oud, kwam in 1756: in het Hospitaal. Voor vyf jaaren had hy gekreegen een gezwel voor op den regter arm even onder den oxel, waar door het armbeen langzamerhand uitgezet wierd, tot eene veel dubbele dikte. De pijn was den geheelen tyd, in welken het gezwel in grootte had toegenomen, dragelyk geweest, zoo dat hy syn dag-werk zonder moeite had kunnen doen.

Voor twee jaaren was de pijn vermeerderd, eene hitte en verzweering daar by gekomen, zonder eenige andere hulp, dan die de zieke zelfs, door het afdroogen van de etter, kon verschaffen. Het ongemak was nu gekomen tot die hoogte, dat een los en hol rond stuk van her been stondt regt op door de *musculus deltoïdes* tot drie overdwarsche vingers boven de huid; daar uit kwam een sterke stank, zoo dat de kamer daar mede wel haast gevuld was.

De

Den arm kon hy eenigzins beweegen, met denzelven af en aan het lighaam te brengen, maar niet opligten.

Na dat de flank wechgenomen was door stoo-
vingen met een afkookfel van Alfem, hop, en
tabak in water, wierd beproeft het been wech
te neemen. Deszelfs onderfte gedeelte zat zeer
vast, of met den arm-pyp of met het hard ge-
worden been-fap onder de *deltoides*; deeze spier
wierd derhalven naar onderen doorgesneeden,
waar na het been, na hetzelfde eenige reifen heen
en weder bewoogen te hebben, uitgehaalt wierd
ter lengtte van vier duimen: het bovenfte ge-
deelte had, gelyk gezegt is, de gedaante van
een fluit, en het onderfte was rond, namentlyk
de arm-pyp zelve.

Deeze affchilfering was even onder het hoofd
van het opper-arm-been, en liet na, het ftuk
wechgenomen zynde, eene groote opening in
het been, waar in gemakkelyk drie vingers konden
gestooken worden. Meer losse ftukken wierden
niet bemerkt. Uit hoofde van de goede gesteld-
heid der vogten, en de kragten van het lighaam,
door bekwaame middelen ondersteund, verwag-
te ik eene fchielyke opgroeiing van het been
in de opering en eene fpoedige geneezing. De
grond van de opening wierd verbonden met ge-
lyke deelen *Tinct. Aloes* en *Effent. Succini*; de
wonde van het vleefch dan met den *Bals. arcae*,
dan droog.



Na vyf weeken was de uitwendige wonde meestendeels geslooten, en vast, binnen in de leedige beenholte, maar op eens kwam de kwaade lugt weder; tot een teken van eene nieuwe verrotting en afzondering van het been; de eerste plaats was toegegroeit met kraakbeen en vleesch; met eene borst-sonde kon ik door de overgebleeve pypzweer duidelyk ontdekken een los beentje aan den onderkant van den *humerus*, even onder den oxel, over of dicht by de *arteria brachialis*.

Dit stukje been moest wechgenomen worden, zoo men eene spoedige geneezing zoude verkrygen, maar de plaats was ongemeen gevaarlyk, om aan te tasten: 1. wierd de bovenste opening met *rad. gentianæ*, en plukfel, drie dagen lang, geslooten. 2. Wierd aan den onderkant gelegd een weekmaakende pap van haver-gort. 3. Na drie dagen wierd de wonde gesuivert, en toen wierd het stukje van het been gemerkt, gelyk te vooren gezegd is, in de diepte; bellettende het einde van de sonde te gaan aan de tegenovergestelde zyde. 4. Op dat het stukje van het been zoude kunnen gebragt worden uit syne plaatsing tegen de huid, wierd daar in gestooken een afgesneeden pen met het geheele einde naar beneden; het bovenste einde wierd voorzien met bereide spas, om de etter binnen te houden, en vervolgens gedrukt met plukfel, een lood plaatje, drukdoeken, en zwagtel zeer sterk; noch de omloop van het bloed noch het ge-

gevoel hadden daar van eenige hindernis , of-
fchoon de lyder anders genoeg ongemak had van
drukkingen.

Na twee dagen wierd het geheele verband los
gemaakt, en toen bemerkte ik , dat het beentje
tegen gewoonte beweegbaar was.

Het gelukte ook , met de borst-fonde, te
komen voorby het beentje en te ftooten tegen
de huid , aanftonds wierd eene tegenopening
gemaakt op het einde van de fonde, waar aan een
draad vaft gemaakt wierd, die door den arm pyp
wierd heen getrokken. Door deeze draad
wierd de infnyding dagelyks met de grootfte
omzigtingheid in de bekleetselen verlengd , tot
dat dezelve eenen vinger lang was, ruim eenen
vinger breed van de uitwendige zyde der slag-
ader.

Eindelyk was de infnyding gekomen tot on-
der aan het beentje, en toen wierd het voor-
zigtig wechgenomen: de lyder klaagde daar by
over eene doofheid en zwaarte in den geheelen
arm en de vingers, veroorzaakt door de prikke-
ling en aandoening der zenuwen.

Het ftuk van het been was vier duimen
lang, smal aan beide einden , hol en breed in
de midden , zederd dien tyd was de genee-
zing gemakkelyk , en binnen drie weeken vol-
bragt. Hy kon fynen arm opligten en be-

wee-



weegen, wanneer wy met genoeg van een scheiden.

2.

Caries Humeri exfoliata

Eene afschilfering van het Opperarm-been.

Een jongeling van *West-Bergslagen*, zestien jaaren oud, kwam in den zomer van 1758. in het Hospitaal.

Eene groote scherpte in syne vogten had voor zeven jaaren zich geopenbaard door eene groote en kwaade verzwearing op de linker schouder, welke eindelyk gencezen wierd, volgens berigt, zonder kwik-middelen, of eene kwyling. Kort daar op was de regter boven-arm zeer gezwollen en zeer dik geworden. De zalven en stoovingen, welke daar voor gebruikt waren, hadden eindelyk op deeze plaats eene verzwearing verwekt. Uit de wonde, daar op gevolgd, waren in vyf jaaren eene stinkende zwarte etter ontlast met grooter of kleiner beentjes.

Tu wierd eene nauwe en vereelde pyp-zweer gevonden midden op den voorkant van den boven arm, door welke de sonde tot in de holigheid van het been ging, en twee of drie duimen op en neder daar in kon bewoogen worden.

den. De pyp-zweer verwyderd en het been bloot gemaakt zynde, wierd in het zelve gevonden eene opening, gelyk gezegt is, in de midden, onder de *musculus brachialis*, en buitensten kant van de *biceps*, zoo groot, dat het einde van den vinger gemakkelyk daar in kon gestookten worden, gelyk een vogel-nest in een' boom. De vleesch-vezelen van de genoemde spieren waren kraakbeenig, en ook zonder bloed by de opening, maar eenen overdwarschen vinger van daar in den omtrek gezond.

Het was merkwaerdig, dat hy alle beweegingen met den arm maakte zonder moeite. Zonder eene sterke afschilfering kon deeze been-bederving niet geneezen worden.

Voor de Exfoliativ-trèpaan was hier geene plaats, derhalven wierd een heet yzer gebruikt; dit wierd gemaakt na de gesteldheid van de plaats en drie of vier reizen in den tyd van zestiën weeken gebruikt, zoo wel op de buitenste kanten, als binnen in het been. By elke Operatie moest de wonde verwyderd en het been bloot gemaakt worden, dat men zoude branden en doen afschilferen.

Intusschen en naderhand wierd de wonde verbonden deels droog, deels met *Bals. Fioraventi. unc. ij*, *Ess. succini. Tinct. myrrh. ää. dr. ij.*

Na dat de omtrek van de opening in den arm rondom wechgenomen was, zat 'er nog een lange beensplinter in de holligheid van het been onder de opening: maar zoo, dat deszelfs einden verder op en neder gingen, dan dat dezelve door de opening kon worden uitgenomen. Door dit beentje dagelyks heen en weder te beweegen, wierd het meêr en meêr los, tot dat het met een bekwaam tangetje en de hand opgeligt wierd. Daar op wierd wederom een gloeyend yzer in de holligheid van het been gezet, om eene nieuwe bederving voor te komen, op deeze geweldige doch onvermydelyde beenbederving. Vervolgens schikte zich de wonde dagelyks beeter; het been wierd gevuld en geflooten met een diep en vast litteeken, en hy reisde naar huis.

3.

Caries radii & ulnæ exfoliata.

Eene bederving en afschilfering van de onderste arm-beenderen.

De afschilferingen van het been zyn niet zeldzaam, in het byzonder alwaar de deelen door twee beenderen ondersteund worden, gelijk de beenen en voorarmen: De voorbeelden daar van zyn genoeg bekend. Meestendeels gebeurt het, dat zulke beenderen van hunne uiteindens of *Epiphyses* afscheiden, terwyl de midden-

denſte deelen, of *Diaphyſes*, afſchilferen. Maar het volgende geval toont, dat ook daar by veranderingen plaats hebben.

Eene vrouw van vier- en dertig jaaren uit *Södermanland* kwam in 1754. in het Hospitaal. Het gewrigt van haare linker hand was buitenge-
meen breed, rond, en gezwollen, en had tef-
fens eenen ondragelyken ſtank. Voor drie maan-
den had zich eene roosagtige uitſlag gezet op
deeze plaats, waar op dienſtige en ſchadelyke
pappen zonder onderſcheid gelegd wierden.

Eindelyk was het gezwel tot verettering over-
gegaan, en had door veele openingen eene groo-
te quantiteit ettergegeeven, van welke eenige,
te gelyk met de hand en derzelve gewrigt, met
theer bedekt en geſlooten waren.

De hand met boom-oly gezuiverd zynde,
wierd aan den buiten en binnenkant van den
carpus een loſbeen gezien, welke door de huid heen
drongen, offchoon ſy niet ſcherp of hoekig waren,
deeze waren de onderſte deelen van de *ulna* en
radius, welke reeds afgezonderd en door nieuw
been verwiffelt waren. Beiden wierden ſy
wechgenomen, door bekwaame openingen in
de huid; de *radius* met de *proc. ſtyl.* was eenen
duim lang, maar de *ulna* drie overdwarfche vin-
gers.

De hand bleef vry wel, de klopping van de

radialis wierd bemerkt, maar niet van de *cubitalis*, uit hoofde van de sterke zwelling; de vingers stonden half geboogen, konden wel bewoogen, maar noch toegedaan, noch uitgestrekt worden. De insnydingen wierden de eerste reifen droog verbonden, en vervolgens met de *Essentia Balsam.* tot de volkomen geneezing. Een verdeelende pap wierd de eerste agt dagen gelegd om de hand, bestaande uit *farin. secal. lib. ij. summit. absinth. unc. ij. sem. cumin. unc. ij. Pulv. gum. assæ fætidae, unc. ß.* met bier azyn. Na dat het gewrigt van de hand merkelyk verkleind was, wierd hetzelfde bedekt met *Empl. diaph. myns. d. styrace ä unc. ij. ol. ceræ gtt. xx.*, tot dat de peesen kenbaar wierden, uit de zwelling te voorschyn kwamen, en de vingers begonnen te beweegen, zoo dat sy konden geboogen en uitgestrekt worden.

De kloppingen van de *arteria cubitalis* waren nu duidelyk; een spalk wierd den geheelen tyd onder het gewrigt van de hand voor alle zekerheid gelegd, waar mede sy ook geraaden wierd, drie maanden lang voort te vaaren, wanneer sy naar huis reisde.

4.

Caries radii exfoliatione curata.

Eene been-bederving aan den radius door de afschilfering geneezen.

Een knecht van twintig jaaren uit de Stad *Vaxholm*

holm gaf zich aan by het Hospitaal in 1753, uit hoofde van eene pypzweer in het gewrigt van de regter hand.

Dezelve was een gevolg van eene voorafgaande zwelling en verettering, welke van zelve opengegaan, en in eene pyp-zweer veranderd was. Het gezwel was in de diepte begonnen, en had toegenomen met onbeschryfelyke pyn, waar by de vingers in de hand gekromt waren, terwyl het gewrigt merkelyk opgezet was aan den onderkant. Zonder twyfel was de ontsteeking begonnen in het vetvlies op de *musculus pronator quadratus*, waar van ik te vooren een aanmerkelyk voorbeeld gezien heb, 't geen beter hier na zal voorgedragen worden.

Nu wierden 'er twee pyp-zweeren gevonden, de eene boven de andere, onder en twee overdwarsche vingers van den *carpus*, welke tuschen de beenderen liepen, en zoo dicht aan den *radius*, dat het beenvlies verteerd, en het been bloot was. Het ongemak kon derhalven niet geholpen worden zonder afschilfering van het been, doch deeze was uit hoofde van de plaats, en de tederheid der deelen moeijelyk te bevorderen. De *arteria radialis* liep juist onder of in de onderste opening, alwaar de pols gewoone-lyk gevoeld word, derhalven kon deeze niet zonder klaarblykelyk gevaar met het mes in de diepte geopend worden; ook kon hier geene sterke verwydering met de spons of gentiaan-wortel

worden uitgestaan, dewyl de lyder zwaare pijn in de hand had.

De bovenste opening was niet evenwydig met de onderste, zoo dat noch de sonde noch inspuitingen daar in konden gebragt worden. Deeze wierd derhalven, als minder gevaarlyk zynde, met bereide spons en gentiaan-wortel voorzigtig verwyderd tot op het *ligamentum interosseum*, niet zonder zwaare pijn, maar zonder zulke gevolgen, welke zoo wel ik als anderen, voor dat de Hr. HALLER syne gedagten omtrent de ongevoeligheid der peesen had bekend gemaakt, toegeeigend hadden aan derzelver geweldige aanraaking en drukking. Want een bondel peesen lag gansch bloot aan den buitenkant van de opening, en dezelve werden verscheide reifen geprikkeld of gekneepen.

Zoo dra de opening langzamerhand gekomen was tot de lengtte van het middenste Lid van den vinger langs den *radius*, en de sonde kon gebragt worden van vooren onder den band tot de benedenste opening, wierd aanstonds een draad daar door gebragt, welke ook by geval kwam tusschen de *arteria radialis* en *radius*. Deeze wierd bestreeken dan met *Bals. Peruv. n. dr. j. ol. ceræ dr. ß.* dan met *mell. rosar. inspiss. unc. ij. pulv. aloës scr. j.* alleen aan die zyde, alwaar de *carieuze* plaats was.

Daar mede wierd de lyder uit het Hospitaal ge-

gelaaten, en overgegeeven aan den kundigen Heelmeester JACOB ROAN. En dewyl deeze affschilfering van het been tyd noodig zoude hebben, had hy vryheid, alle drie maanden naar het Hospitaal te komen, 't welk hy naauwkeurig na kwam. Ruim anderhalf jaar had hy de seton gedraagen, toen hy, by syn gewoone bezoek, vertoonde een beentje, welk van den *radius* los ging, en den Hr. ROAN noodzaakte, om de seton wech te laten, met de spons de opening te verwyderen, en het been uit te nemen.

Deeze langduurige pyp-zweer was nu geneezen drie weeken na de affschilfering van het been, welke op eene zoo ongemakkelyke plaats, alleen door eene goede oppassing en met geduld van de medewerking der natuur kon verwacht worden.





III.

Fractura humeri insanabilis vel Pseud-articulata.

*Eene valsche geleding na eene ongeneeslyke
been - breuk.*

Eene enkelvoudige breuk van het opper-arm-been is van de gemakkelykste zoo om te verbinden, als om te geneezen; de zwaarte van den onderarm houdt het opper-arm-been altyd in eene maatige uitrekking, zoo dat de einden van het been niet kunnen over elkander schuiven. Daar by word egter vereischt rust en ondersteuning van den onder-arm, die in een' armband gelegd moet worden, zoo de geneezing niet ten eenenmaale kwalyk zal uitvallen.

De vrouw van een Onderofficier van de Gardes had voor vyf maanden in eenen ongelukkingen val op het gladde ys, den linker arm overdwars gebrooken. Haare vrienden hadden, zonder verder hulp te begeeren, het kleed en een' band om den gebrooken arm gewonden. Een armband was niet gebruikt; maar de arm had meestendeels langs de zyde gehangen, waar door de onderarm aanmerkelyk gezwollen was, en de einden van het been zich van een hadden geschei-

scheiden. In het zelfde jaar 1755. kwam fy eindelyk hulp zoeken in het Hospitaal. Eene duidelyke scheiding kon in de breuk van het opperarmbeen tusschen beide einden gevoeld worden.

Sy kon den arm niet opligten zonder hulp van den regter, want de breuk was even onder de vasthegting van de *Deltoides*. Als de beneden arm opgeligt was; kon fy dezelve buigen, en beweegen, zoo om de *pronatie* als *supinatie* te doen, waar by de onderste deelen van het opperarm-been steunden tegen de bovenste, maar aanstonds daar weder afvielen; zoo dra de spieren ophielden te werken.

De beneden arm en hand waren sterk gezwollen, doch dit verdween schielyk door stilte en verdeelende kruiden-zakjes: de afgescheide beenderen wierden tot een gebragt en samengehouden; maar derzelver vereeniging wierd te vergeefs gewagt; het beensap had reeds beide einden verhard, en kon dezelve niet meêr aan elkander lymen,

Tot steevigheid van den arm wierd een kwaame spalk met een zwagtel rondom de breuk gedaan, en sy ging ongeneezen uit het Hospitaal.

Drie soortgelyke zyn in het Hospitaal gekomen, waar van de een, een Timmerman, twee

reizen op eene en dezelfde plaats het deybeen gebrooken had, boven de knie, zynde de breuk de laatste reise zoo flegt geweest, dat de eindens van het been, na verloop van een jaar, van elkander stonden, en elk afzonderlyk beweegelyk waren; hy moest derhalven zich voortsleepen met twee krukken, geduurende synen overigen leeftyd.

De een der twee anderen had eene valsche geleding in den arm, en was, even als de derde, ongeneeslyk.





I V.

Fractura humeri syphilitica.

Eene breuk van het opperarm-been uit eene venerische oorzaak.

Eene soldaaten-vrouw, veertig jaaren oud, kwam in de lente van het jaar 1757. in het Hospitaal, om geneezen te worden van eene breuk in den linker boven arm, welke sy zyde voor veertien dagen gebeurt te zyn, zonder eenig uitwendig geweld.

By het beschouwen van den arm vindt men den opperarm in de midden gebrooken, maakende een geluid by de breuk, als of de beenderen geheel en al verbryfeld waren.

Sy berigte, dat de gebrooke plaats voor een jaar gezwollen was, waar by eene aanhoudende pyn 'snagts was geweest; dit bragt my ligtelyk op de gedagten, dat op eene *exostosis venerea*, eene *caries humeri*, en beenbreuk gevolgt was.

Ik wierd hier in nog meêr versterkt door eene spekagtige rottige verzwearing, welke reeds het *velum palatinum* even boven het lelletje doorgeeten had. Andere toevallen van de *lues* waren niet tegenwoordig, en sy wist ook niets te zeggen

zeggen van sommige, die vooraf zouden gegaan zyn.

De beenbreuk wierd verbonden en verzorgt op de gewoone wyze. Te gelyk wierd den lydereffe gegeven dagelyks een of twee greinen van de *panacea mercurialis* met het *extr. Theriacale*, benevens een *decoctum lignorum balsamicum*. De verzwearing in de keel wierd schielyk gezuiverd, geneezen, en liet na twee kleine openingen in het *palatum molle*.

In de zevende week had zich ook het weer by de breuk van het opperarm-been zoo sterk gezet, dat sy met den arm iets kon aanvatten en opligten, en dit alles zonder dat 'er in de huid eene opening kwam, of het been affschilferde. Hier mede wierd sy uit het Hospitaal gelaaten.


Eenige maanden daarna kwam sy weder, en vertoonde twee *tophi* of liever *nodi venerei*, een aan elke zyde van het linker dey-been, niet vereenigt met het been, want sy konden eenigzins verschooven worden, maar moesten in het beenvlies of de *cellulosa vastorum* zyn. Deeze wierden verzeld met zwaare pynen 'snagts, en dreigden het heupbeen met bederving.

Daar verliep eenigen tyd, eer 'er voor haar deeze tweede reis in het Hospitaal plaats was. Intusschen wierd daar op gelegd *Empl. de ran. cum merc. quadrupl.* en sy kreeg een' bloedzuiverenden

den drank als ook kwik-pillen, om op de opgegeeven wyze te gebruiken. In den zomer van 1758. kwam fy op nieuw in het Hospitaal. De breuk van het armbeen, en de verzweering in de keel waren geneezen. De *tophi* op het linker deybeen insgelyks, doch 'er was bygekomen een nieuwe *exostosis* op het linker scheen-been, met zwaare pynen 's nagts verzeld. Nu begon men, na eene zachte buikzuivering, en twee baden, te gebruiken, volgens den raad van den Heere VAN SWIETEN *Solut. merc. subl. spir.* tot twee lepels daags, telkens daar op drinkende een halve stoop gerften-water; fomtyds wierden drie of vier lepels gegeeuen, al na dat het middel werkte door de vermeerderde afgang, walgingen, kwyling of misselykheid; kleine of dunne roofjes kwamen ook in den mond, waarschynelyk door den kwik, die intusschen gebruikt was.

In de twaalfde week was fy volkomen vry van de knobbels in het been, en de overige toevallen van venus-ziekte, en toen verliet fy het Hospitaal.





V.

*Fractura ulnæ & radii comminuta.**Eene beenbreuk van den onderarm met verbryfeling.*


Een Timmerman van zes- en veertig jaaren was bezig met iets te leggen op de tanden van een rad in een Moolen, in 1754.

Door een ongeluk en onverwagt, begon de moolen, door bykomen van het water, te gaan, terwyl de timmerman den regter arm in het wiel had, en zich daar uit niet zoo fchielyk kon redden. De vingers, hand, onder-arm en de helft van het opperarm-been wierden elendig verbryfelt; eer hy 'er zich kon uitredden, of door het wiel op den grond geworpen werd. Hy werd opgenomen en in huis gebragt. Den derden dag kwam hy in het Hospitaal. De geheele arm, tot aan de helft van het opperarm-been, was hard, paerſch, gezwollen, en opgezét, als een verſtorven lighaam, dat uit het water gehaald is. Geene klopping van de slagader wierd bemerkt, dan van de *arteria axillaris* en *brachialis*, welke geſpannen en waggelende was. Aan den linker arm was de pols vol en hard.

De

De afzetting was hier het eenigste middel. De Tourniquet en band wierden aangelegd, en daarna werd de arm op de gewoone wyze afgezet onder de vasthegting van de *deltoides*, welke onbeschadigt was. De slagaderen wierden onderschept met de *futura nodosa*: de verettering en geneezing gingen goed voort, zoo dat de lyder in de agtste week het Hospitaal kon verlaten.

De afgezette arm werd geopend, en vol geronnen bloed gevonden; de slagaderen waren door de splinters van het been doorgesneeden, en als in eene valsche slagaderbreuk door geronnen bloed losjes gesloten.



V I.

Fractura ossium metacarpi en carpi.

Eene breuk der beenderen van de hand.


In 1756. wierd een Boer uit Dalercarlien, welke eenen steen deed springen, beschadigt door een' schoot in syne regter hand. De schoot ging af, terwyl hy laadde, waarop de laadstok, laading, kruid en steen de geheele hand verbryfelden. Twee dagen daarna kwam hy in het Hospitaal.


De hand was zwart, koud, en in stukken gescheurd. De peesen der spieren, welke de vingers uittrekken, waren buiten de huid met de *ossa carpi*, en afgescheiden. Deeze waren van eene natuurlyke kleur, en vereenigt met de spieren. De duim hing alleenlyk aan een stukje vel, deszelfs afgescheurde peesen daar by.

Dewyl nu de hand onbruikbaar was, en niet kon gered worden, wierd dezelve los gemaakt in het gewrigt, de beenderen van den *carpus* daar onder begreepen. Van de huid, welke zeer beschadigt was, kon niets gespaard worden.

De *arteria cubitalis* gaf weinig bloed, en het zelve wierd gestuit met den eyken zwam, maar de *radialis* bloedde niet: de geneezing was gelukkig, en in de zevende week volbragt.

Eer dat de hand wechgenomen wierd, beproefde ik met een tangetje de peesen te knypen en op te ligten, welke bloot op den *carpus* lagen, en nog met de spieren samen vereenigt waren, maar de gekwetste gaf geen teken van vermeerderde pyn; ook waren de toevallen by deeze scheuring der peesen niet zwaarder, dan die gemeenelyk by gekneusde en geschoote wonden zyn.





V I I.

*Fractura phalangium & ossium metacarpi
digiti annularis & medii.*

*Eene breuk van den middensten en ring-vinger met
de beenderen van den metacarpus.*

Een andere Boër uit Dalecarlien had, in het zelfde jaar, by het springen van eenen berg, syne regter hand op dezelfde wyze beschadigd.

De twee middenste vingers, *medius* en *annularis*, met de daartoe behoorende *ossa metacarpi*, en twee *ossa carpi* van de tweede rey waren in stukken gebrooken, en uit derzelver plaats gedreeven. De peesen binnen in de hand waren bloot en verscheurd; de overige deelen van de hand door het kruid verbrand, en de opperhuid in blaasen opgeligt.

Na dat men de blaasen geopend en de toestand eenigzins onderzocht had, wierden de genoemde vingers en uit-eindens van het been, tot op den *carpus*, van de voorste rey met het mes afgezonderd en wechgenomen. De operatie was moeyelyk en pynelyk uit rede van de klemming,

ming, tusschen de peesen vanden naaften vinger, de *ossa metacarpi* en de vaste vereenigingen der *ossa carpi*.


Driemaal zoo schielyk had de geheele hand kunnen worden wechgenomen met veel minder pyn; maar nu behield hy eene bruikbaare hand met drie vingers. De wonde bloedde niet, wierd met zwagtels vereenigt, en op de gewoone wyze geneezen.

De duim behield de beweeging, maar de voorste en agterste vinger waren binnen de hand geboogen.

By dit ongemak wierd wederom de gevoeligheid der peesen beproefd, vooral van de gezonde vingers; de vingers, het tangetje, ja de punt van het mesje maakten, als sy de deelen aanraakten, geene kenbaare verandering in de pyn van den lyder.

In de vyfde week ging hy uit het Hospitaal tot syn voorige werk.





V I I I.

Aneurysma spurium.

Eene valsche Slagaderbreuk.

In het begin van Mey des jaars 1754. werd een arm man uit het Distrikt van Stockholm op het land adergelaten van een oud wyf, op de regter arm.

Agt dagen daarna begon de plaats, alwaar de ader geopend was te zwellen, hoger en blauw te worden. De lyder, die daar van geen kwaad vreesde, ging met syn werk voort, zonder dat de arm verbonden was.

Nauwelyks drie weeken na de aderlating verloopende, brak het gezwel open en gaf zoo veel bloed, dat het verlies daar van, de flauwte, en het gebruik van tintel alleenlyk in staat waren, het bloed te stempen; hier door wierden de kragten verminderd, zoo dat hy zich drie weeken lang in het bed moest houden: Intusschen waren de onder en boven arm begonnen te zwellen en blauw te worden.

Wanneer de wonde voor de tweede reise openbrak gaf dezelve wederom zeer veel bloed met

met dezelfde gevolgen, als de eerste reis. Ik weet niet, uit welke oorzaak men als nog geene hulp voor hem zocht.

Wederom moesten 'er drie weken verloop-
pen, en met de derde zwaare bloedstorting
geëindigd worden.

Veertien dagen na het midden van den zomer werd hy eindelyk in het Hospitaal gebragt, bleek en gezwollen in het aangezicht; het lig-
haam was uitgeteerd; de voeten gezwollen, de pols
ras en klein, vooral tegen den nagt: de bescha-
digde arm was opgezet met eene dikke, bruine,
zwellung van het gewrigt van de hand tot de
schouder. De klopping van beide de slagaderen
aan de hand wierd wel bemerkt, doch was zeer
zwak. De lyder was dus ongemeen kragteloos,
maar de vrees voor eené nieuwe bloedstorting
maakte, dat ik de operatie niet wilde opschor-
ten, zoo veel te minder, dewyl het gezwel zeer
hard of gespannen, en met eenen kleinen prop
van geronnen bloed in de opening, waar uit het
bloed was gekomen, geslooten was. Eenige ver-
storve plekken buiten op de huid dreigden ook
eene onverwagte openbersting en bloedstorting.

Het Tourniquet en de band wierden aange-
legd rondom de *arteria axillaris*: het gezwel
wierd geopend, in de lengtte, met eene groote
insnyding. Veel geronnen bloed, welk op een
gehoopt lag, wierd wechgenomen: eindelyk,

terwyl de grond gezuiverd wierd, stroomde het bloed uit de *brachialis* twee overdwarsche vingers boven de buiging van den elleboog.

De slagader was niet uitgezet, gelyk veele zich by eene valsche slagader-breuk voorstellen, maar dwars afgebrooken, 't welk ik voor de derde reise zag; en dewyl het einde van de slagader zeer duidelyk wel anderhalve lyn hooger dan de grond stondt, wierd dezelve aanstonds onderschept, en met de *futura nodosa* toegebonden, waar by de bloedstorting ophield. De futuro wierd ondersteund met drukdoeken; en de holte gevuld met plukfel. Het overige van het verband wierd volgens gewoonte aangelegd. In twee of drie uuren kon 'er geene pols aan de hand bemerkt worden, dezelve wierd gestoofd met warmen wyn en franschen brandewyn.

Eindelyk wierd de klopping bemerkt, eerst van de *radialis* en daarna van de *cubitalis*, tot een bewys, dat de zydelyke slagaderen dienst konden doen in plaatse van den stam, die vernietigd was. De kragten van den lyder wierden ondersteund met bekwaame dunne voedfels en amandelmelken. Den vyfden dag had de verettering in den bovensten hoek van de wonde het meeste plukfel los gemaakt; de volgende dagen vermeerderde de verettering sterk; de pols en de toeneeming der kragten beloofden de beste uitkomst; maar eene al te vroe-


ge gerustheid en de onachtzaamheid van den oppasser verydelden op den agtsten dag alle hoop.


De ligatuur had onder de verettering beginnen los te gaan, voor dat de slagader ten eenenmaale samengegroeid was, waar door het bloed uitberste, en den weinigen voorraad, welke het leeven onderhield, wechnam. Niemand was 'er tegenwoordig, en het Tourniquet tegen de gegeeve orders wechgenomen.

Aanmerking.

Men moet het derhalven niet te ligt laten aankomen op de zekerheid van de ligatuur; veele oorzaaken kunnen, gelyk als hier, onder de beste hoop bedriegen. 1. Zoo de slagader niet ver genoeg boven de opening gevat is. 2. Als de slagader styf en kraakbeenig is, en met moeite kan samen gedrukt worden, vooral zoo 'er veel vleesch in den band genomen is. 3. Zoo 'er trekkingen of krampen den stomp aandoen, welke de slagader uit den band trekken. 4. Als de wonde schielyk, dat is op den derden dag, veretterd, dan smelt het celagtig weeffsel wech, en de band word los, eer de slagader heeft kunnen toegroeijen, en het bloed de zydelijke vaten verwyderen. 5. Indien het bloed dun en ontbonden is, en het vleesch als half verrot, bied het laatste aan den band geenen genoegzaamen tegenstand, deeze

zakt af, terwijl het bloed dringt door den losgaanden band, de ope zydeleyke vaten en het vleesch zelve, waar door dikwils eene doodelyke bloedstorting veroorzaakt word. 6. Zoo de slagader zeer verwyderd, styf is, en zich niet in het vleesch intrekt, gebeurt het, dat de draad door de gewoone verettering op den regten tyd losgaat, terwijl de eindcn van de slagaders nog niet toegegaan zyn. In alle deeze, en meêr gevallen van soortgelyken aart, kan 'er eene gevaarlyke bloedstorting bykomen, waar van eenige voorbeelden beeter hier na by het afzetten zullen opgegeeven worden.





I X.

Atheroma ad Carpum.

Een zakgezwel aan de voorband.

Van Joh. El. Sjöström.

Eene meid van zeven- en twintig jaaren, in Stockholm woonende, wierd in het Hospitaal in 1756. genomen met een groot zakgezwel in de vlakke van de regter hand, strekkende zich twee overdwarsche vingers uit over den *carpus*. Voor drie jaaren had het gezwel zich 't eerst vertoont onder de *basis* van het eerste *os metacarpi* met pyn, en na dien tyd was het zoo groot geworden, als een ey, en zette den palm van de hand voor uit onder de *musc. Thenares Pollicis*.

Een ander Heelmeeſter, waar aan ſy zich toevertrouwt had, had het gezwel geopend, de bevatte ſtoffe laaten wechloopen, en vervolgens de wonde geneezen, wanneer ongetwyfeld de zak niet volkomen was wechgeſmolten, waarom de ſtoffe zich op nieuw verzamelde op dezelfde plaats, en dezelve niet alleen opzette tot dezelfde grootte, als voorheen, maar ook neêrzakte, onder het *ligamentum annulare*

carpi, en de *flexores quatuor digitorum*. Deeze wierden ook te gelyk met de *arteria radiæa* en *cubitæa* tot de grootte van eene vuist opgezet.

Midden tegen de genoemde plaats, omtrent tusschen de *musc. adduct. dig. min.* of *metacarpicus Winslowi* en de *Palmaris brevis* wierd een foortgelyk gezwel gezien, zoo groot, als een walnoot, welk met het andere vereenigd was. Door alle deeze verhevenheden kreeg de hand eene mismaakte gedaante, de vingers lagen altyd in de hand gebogen, door de opzetting der peesen van de spieren, welke dezelve buigen, en konden niet uitgestooken, maar iets meer naar binnen geboogen worden, de duim en voorste vinger uitgezonderd, welke tamelyk vry tegen elkander konden bewoogen worden. De *musculus abductor digiti indicis* en de *antithenar* seu *semi-interosseus pollicis* waren niet begreepen in het gezwel, en daarom geschiedde de beweeging gemakkelyk.

De pyn, welke byna altyd de lydereffe plaagde, gaf aanleiding om te denken, dat 'er een wind-doorn tegenwoordig was, welke de operatie, zoo dezelve mogt ondernomen worden, met zwaare gevolgen dreigde. Maar dewyl de geneezing van de lydereffe op de eene of andere wyze moest gezogt worden, zonder dat de hand wechgenomen wierd, geloofde de Hooggel. Heer ACREL, dat het zekerste was, om eerst te openen het eerste gezwel, daar uit deszelfs
eigen.

eigenschappen te leeren kennen , vervolgens de operatie te volbrengen of het daar by te laten, na verschil der omftandigheden.

In de tegenwoordigheid van den Lyf-artz SCHÜTZER wierd het gezwel geopend, en daar by liep uit hetzelfde eene groote quantiteit van eene breyagtige ftoffe, de gedaante hebbende van opgezwollen *sago* of *caviar*. Daar uit bleek, dat het gezwel een *atheroma* van eene byzondere foort was, in verfcheide vakken verdeeld. De operatie wierd voortgezet. By het onderzoek zag men, dat alle gezwellen gemeenfchap met elkander hadden. Het voornaamfte oogmerk moest derhalven zyn, om door eene tegenopening aan de ftoffe eene meêr gemakkelyke ontlasting te bezorgen, en dan een feton daar door te brengen, zonder welke de zak nooit kon wechgenomen of verteert worden. De peefen en slagaderen, welke het eerfte gezwel bedekten, maakten, dat dit moeyelyk was in het werk te ftellen.

Eene groote en regte hegtnaalde, waar van de punt bedekt was met een ftukje was, wierd door de infnyding voor de *thenar* naar boven gebracht, en onder het *ligamentum annulare carpi*; en, na dat de *arteria radiæa* met den vinger naar de zyde gedrukt was, wierd de naalde tuffchen de slagader en de peefen doorgestooken, waar op de *feton* volgde, welke in de wonde bleef. De kleine opening wierd voorzigtig tot de lengtte van eenen halven vinger verwyderd. De zak
ftrekte

strekte zich uit, gelyk gezegd is, onder alle de zenuwen, tot de *ulna*, en vereischte derhalven nog eene opening aan den onder of buiten kant.

Eene meer kromme naalde, voorzien met een linnen lapje en op den punt bedekt met was, wierd van de eerstgemaakte opening onder de *flexores digit.* tot tegen de huid gebragt, tusschen de *arteria cubitalis* en *tendo. musc. cub. interni*; de naalde wierd daar uit getrokken, en de seton overgelaaten. Kundigen zouden wel eene zoo gevaarlyke onderneeming kunnen afkeuren, maar de onvermydelyke noodzakelykheid aan den eenen kant, zoo de lydereffe zoude geneezen worden, en het duidelyk gevoel van de huid tusschen het einde van den vinger en den punt der naalde, tusschen de klopping der slagader en de pees, maakte de steek voorzigtig, gelukkig, en nuttig. Daar by liet men de Operatie voor deeze reis, en de lydereffe wierd in rust gelaaten, wordende tegen den avond adergelaten. Eene amandelmelk met salpeter, en dunne doorge-daane afkookfels van gort wierden voorgescreeven, zonder ander voedsel.

De drie volgende dagen liepen wel af, zonder merkelyke koorts, maar niet zonder pyn en steekingen in het ongemak, welke den geheelen tyd dan wechgingen, dan wederkwamen. Den vierden dag was de wonde in volkome verettering en gaf goede etter, in den grond wierd

de-

dezelve verbonden met *Bals. arcæi unc. ij. Solut. sulphur. unc. j. ol. ceræ dr. j.*, de seton wierd met dezelfde zalf besmeerd, en dagelyks bewoogen: over het verband wierd een weekmaakende pap gelegd, welke eenige reifen 's daags veranderd wierd.

Dus wierd fy drie weeken behandeld, in welken tyd de verhardingen wechsmolten, de gezwollen neêrzakten, en de wonde gevuld wierd; maar dewyl dit *Atheroma* vier hoorens had, waar van 'er reeds drie geopend waren, de zak verteert, en de grond tot eene goede geneezing gebragt zynde, zoo wierd nu ook de vierde onder handen genomen, welke op geene wyze zich tot geneezing wilde schikken, dan na dat dezelve even als de andere behandeld was. Deeze hoorn was in den palm van de hand, onder de *metacarpieus*, waar uit nog dagelyks gedrukt wierd eene voortgelyke stoffe, als uit het geheele gezwel gekomen was.

De eerste seton tusschen het begin van de *thenar* en het onderste gedeelte van den *radius* boven den *carpus* wierd wechgenomen; 'er wierd een nieuwe gemaakt van den wortel van de *thenar* onder de *aponeurosis palmaris* naar boven door of dicht by de *metacarpieus*, met dezelfde soort van naalde; de huid wierd even voorzigtig verwijderd en de bezorging naderhand was, als by de eerste openingen. De andere seton onder het *ligamentum carpi* wierd agt dagen daarna wechge-

no-


nomen. Eene aanhoudende drukking met trappwyze compressen en plukfel wierd gemaakt over het groote gezwel, waar door hetzelfde ten eenenmaale neder gedrukt wierd, de pypzweeren wierden voorgekomen, en de toegroeiing van de bovenste wonde bevorderd; de hand kreeg eindelyk de natuurlyke gedaante en beweging weder.


Na verscheide kleine verzweringen, zoo binnen als buiten op de huid, en eenige kleine infnydingen, hield de verettering eindelyk op. De wonde wierd droog en was geneezen, wanneer sy na verloop van dertien weeken, in eene volmaakte gezondheid, het Hospitaal verliet.

Geduurende deezen geheelen tyd was de pyn en spanning in den geheelen arm nog aanmerkelijk, vooral langs den binnenkant tot den *condylus internus humeri*, van waar de spieren haar begin namen. Doch sy kwamen niet in aanmerking ten opzigte van de voorheen zeer zwaare pyn, welke men voor den tyd van den Hr. HALLER aan de peesen toeschreef, wanneer sy ter eeniger tyd, zonder geheel vernietigd te worden, wierden geprikkeld, zoo was dit voorzeker hier, daar sy dagelyks deels met instrumenten, deels met de seton gewreeven wierden, zonder gevolgen. By en na derzelver vertrek wierd de drukking op de hand nog voortgezet. Dagelyks wierd de hand eens bevochtigd met een mengsel van witten franschen wyn *unc. vj. spir. matriç.*

tric. unc. j. sapon. liquid. unc. ss, om de huid zuiver en levendig te houden. De vingers kregen insgelyks hunne volkome beweeging wederom.

Hier uit ziet men, dat ongemakken, welke op het uiterlyk aanzien met regt aangemerkt worden als ongeneeslyk, kunnen geholpen worden, zoo men zulks grondig beproefd, en het ongemak niet word onderhouden door eene verborge kwaade stoffe in het bloed. Dikwils komen 'er zoo in de Heel- als Genees-kunde gevallen voor, welker kentekenen als nog onduidelijk zyn, en niet zonder zwaarigheid kunnen beoordeeld worden, zoo ten opzigte van de gesteldheid als de uitkomst. Zoo het niet toe te staan was, eene voorzigtige proef in een Hospitaal te maaken, hoe veele zouden dan niet voor altyd ongeneeslyk moeten gelaaten worden?





X.

Abscessus occultus supra muscolum pronatorem quadratum prope carpum.

Eene verborge verzwearing boven den musc. pronat. quadr. digt by den carpus.

Wanneer ik in 1743. by het Fransche Veld-Hospitaal in Lauterburg aan den Rhyndiende, kwam my onder andere merkwaardige gevallen, welke meest wonden waren, ook het volgende voor, welk ik op dien tyd met meer andere aan den Koninglyken Lyfartz ABRAHAM BAECK, toen zich in Parys ophoudende, overzond.

Een Dragonder, by de veertig jaaren oud, droog en mager, maar bloedryk, wierd uit het leger in het Hospitaal gebragt, hebbende eene anderendaagsche koorts: Op eene sterke huivering was eene hitte gevolgd, welke nog aanhield, schoon in het begin aanstonds eene aderlating verrigt was. De ader wierd wederom geopend. De geneesmiddelen en levensregeling wierden volgens het gebruik deezer natie behoorlyk in acht genomen. Hy klaagde te gelyk over eene brandende hitte in de linker

voor-

voorhand, met eene zoo zwaare drukking, als of eene heete yzere band daarom gespannen was; hy kon, zonder de pijn te vermeederen, noch de hand opligten, noch de vingers beweegen; ik giste, dat het een jigt-gezwel zyn zoude, welk in het kort zich zoude vertoonen, en, onder het aanhoudend gebruik der gewoone middelen tegen de koorts, raadde ik hem, de hand op het bloote lighaam te houden onder het hemd, om de uitwaasfeming te bevorderen; de pijn nam des niet te min toe, en hy had dag noch nacht rust. Na agt dagen, zich geen het minste gezwel in het gewrigt van de hand vertoonende, wierd beproeft, het ongemak te resolveeren door een mengfel van azyn, witten wyn, kampher-brandewyn, en venetiaansche zeep, waar in linne lappen gedoopt, uitgedrukt, en daarna omgeslagen wierden: de pijn vermeederde meêr en meêr, de omslagen wierden veranderd in kruiden-zakjes, van hop, alfem, kamillen-bloemen en lynzaadmeel, gekookt in kalkwater en wyn, welke eenige reifen 's daags veranderd wierden, maar zonder de minste verligting. In de derde week was de koorts meest verdweenen, behalven eene beweging in de pols, welke veroorzaakt wierd door de pijn en prikkeling der zenuwen. De lyder was kwaadaartig, haastig, twyfelmoedig, en riep dagelyks *coupez mois la main & jettez la au D...* Inwendige verdoovende middelen verwekten wel slaap, maar geene verzagting van pijn.

Eindelyk begon, in de vierde week, het gewrigt aan den onderkant hooger en breeder te worden, de peesen wierden opgeligt, de vingers kromden zich, en het gezwel ſteeg op tot de zyde over de arm-pypen, verminderende de pyn dagelyks. Nu wierden 'er weekmaakende pappen opgelegd van roggen-meel, *farina fab. sem. lupin & lini* gekookt in water, met een derde gedeelte wyn vermengt. Eindelyk wierd in de zesde week uit de gewoone tekenen bemerkt, dat 'er eene verzwearing voor handen was; en nu wierd 'er nog een pap van gewreeven brood en melk, met het *ung. altheæ* vermengt, over het gezwel gelegd. In de zevende week had de etter zich eenen weg gemaakt door de huid op twee plaatſen, en, gelyk ik by het openen dagt (*), was de eene tuſſchen de *tendo rad. inter.* en de peesen der *flexores*, de andere aan den onder of uitwendigen kant van den *carpus* tuſſchen de *tendo cubitalis intern.* en *ulna*. Na een nauwkeurig onderzoek, en ontdekking, dat de ſlagaderen en peesen van de bovenſte opening afgeſcheiden waren, opende ik beide plaatſen ter lengtte van een lid van een' vinger aan beide zyden, waar na drie of vier lepels vol geele etter te voorchyn kwamen. De uitwendige wonde wierd verbonden met den

Balf.

(*) Wanneer de deelen gezwollen, en uit de natuurlijke plaatſen gedrukt zyn, kan men onder het ſnyden, vooral op een levendig lighaam, dezelve niet zoo wel kennen en onderscheiden.

Bals. arcæi en eenige druppelen *ol. ceræ* op het plukfel. Rondom de hand en het gewricht wierden gelegd compressen, bevogtigd in een *vinum aromaticum*, bereid van roode roosen, salie, kruis- en munt, en kamillen-bloemen met witten wyn. Uit de openingen kwamen stukken van het verteerde vetvlies, gelyk gewoon is in de *Furunculi* of eerste soort van *Panaritium*. De vingers, die nu vyf weeken lang in de hand geboogen waren, begonden nu uitgestrekt te worden; de opgeligte peesen der *flexores* wierden dagelyks nauwkeurig neêrgedrukt. Met het einde van de negende week waren de openingen gesloten; de hand en vingers, welke hunne vrye beweeging nog niet hadden weêrgekreegen, wierden 's morgens en 's avonds gebaad in pens-nat, 's daags gewonden in het vel van een schaap, en 's nagts tegen het bloote lighaam gelegd. In de elfde week was hy gezond, en ging uit het Hospitaal.

Ik heb noch voor noch na dien tyd ooit hooren spreken van eene verzwearing op deeze plaats, welke ongetwyfeld was in den vetrok tusschen *de musc. pronat. quad. en ten. extens. digit.* Maar de voortreffelyke aanmerkingen van den Hr. LA FAYE en DIONIS by de derde soort van *Panaritium* p. 721, en de drie- en twintigste Waarneeming van den Hr. GARENGEOT *Operat. de Chir. Tom 3. pag. 318*, insgelyks by gelegenheid van de derde soort van *Panaritium*, bragten my, behalven 't geen ik zelve daar omtrent ge-

zien had , op de gedagten , dat in dit vet eene plaatselyke ontfteeking kon zyn , welke eene verettering te weeg bragt ; waar mede ik zoo wel my als den lyder troofte , tot dat de uitkomst dit gelukkig bevestigde. De opening was op verre na zoo moeyelyk niet, als die, welke de Hr. ARNAUD in de laatst genoemde operatie ondernam, want de etter had reeds op eene plaats de anders dicht aan elkander leggende peesen van een gefcheiden, en deeze weg wierd zonder veel moeite na vereifch der zaaken verwyderd, om de etter te doen ontlasten, gelyk reeds gezegd is.





X I.

Ganglion tendineum.

Een Pees - Knoop.

Ganglion articulare, Synoviale.

Een Pees - knoop in het gewrigt.

Onder den naam van *ganglia* worden beschreeven zoodanige gezwollen, welke komen op de leden, wanneer de scheede van een pees door de geweldige spanning word verzwakt, en aan de *gelatina vaginalis* vryheid geeft om zich te verzamelen, en dik te worden, even als in eenen byzonderen zak. Deeze, zonder tegenzeggen op de gegeeve wyze voortkomende, kunnen egter zonder nadeel der peesen of derzelver styfwording, worden geopend, uitgedroogd en geneezen, hoewel men evenwel weinige of in het geheel geene voorbeelden van deeze operatie heeft. De Hr. WARNER haalt in syne vyftiende, zestiende, en zeventiende waarneming wel drie gevallen aan van geopende en geneeze *ganglia*, maar ik vindt niet, dat derzelver oorsprong, omstandigheden, en uitsnyding beantwoorden aan het begrip van de uitzetting

der scheede van de pees , maar fy schynen veel eer te behooren tot de *tumores articulorum synoviales*.

Een *Ganglion articulare synoviale* word door my genoemd een gezwel , welk zich plaatst op de gewrigten van handen en voeten , en 't meest voorkomt op de eerstgenoemde : het ontstaat even eens [na eene geweldige uitrekking van het gewrigt, wanneer de banden (*ligamenta*) of de *capsula articuli* al te zeer uitgerekt, verzwakt worden, of openbarsten. Het Lede-water dringt dan daar door, en maakt even als eene *hernia articularis synovialis*. Uit eene inwendige oorzaak komen deeze *ganglia* , of *nodi articulorum* , voort, gelyk in het algemeen bekend is in eene *arthritis nodosa* en *podagra tophacea*, fy worden eindelyk hard na veele en langduurige aanvallen, groeijen vast aan de buitenste banden en peesen, waar door fy de beweeging der deelen hinderlyk zyn, en in het vervolg niet kunnen wechgenomen worden. In het begin zyn fy, gelyk derzelver oorzaak, eene jigtagtige scherpte, die van de eene plaats naar de andere gaat, wechgaat, en wederkomt, houdende zich eenige maanden na elkander op, voornamentlyk, op den *carpus* , en vervolgens voor even langen tyd verdwynende. By toeval te sterk uitgerekt of gedrukt wordende, berst het zakje open, het dik geworden ledenwater word uitgestort, opgeslorpt, en het gezwel verdwynt. Terwyl fy in grootte toeneemen en zich vermeerderen,

wor-

worden de peesen of banden, welke over het gewrigt van de hand en voet loopen eenigzins naar de zyden gedreeven, maar derzelver scheeden worden door het algemeen vetvlies dikwils zoo dicht aan de uitwendige zyde van den opgezeten zak vast gehegt, dat men byna zoude gelooven, dat het gezwel eene uitzetting was van de pees zelve, daar de peesen egter zonder eenig ongemak zyn, in de scheede geen vogt bevatten, maar het gewrigt van het dik geworden leden-water ongemak heeft. Als sy of van zelve niet verdwynen, of toevalliger wyze openbersten, word het bevatte vogt meêr en meêr dik, en eindelyk hard, wanneer het door de operatie kan wechgenomen worden. De volgende korte aanmerkingen strekken tot opheldering hier van.

I.

Eene vrouw oud agt- en dertig jaaren, en van eene onbestendige gezondheid, kreeg in haaren eersten kraam een klein knobbeltje, zoo groot als een muscaat-noot, op het gewrigt van den linker voet. Agt dagen na dat sy zeer haastig den voet uitgestooken had, was hetzelfde ontstaan. Het was hard, beweegelyk naar de zyden, vereenigt met het onderste gedeelte van de peesen der *extens. dig. com.*, en scheen synen oorsprong te hebben uit het gewrigt zelve tusschen de *tibia* en *astragalus*. In den tyd van vyf jaaren had sy veele middelen vrugteloo-

beproefd, om het gezwel te verdeelen, en in twee zwangerheden zoo veel ongemak daar van geleden, dat fy eenige maanden genoodzaakt was geweest, zich in het bed te houden, en fy meende, dat door de ondragelyke pyn haare verlossing in de zevende of agtste maand van een dood kind verhaast was. Eindelyk besloot fy het gezwel te laten wechneemen.

De huid wierd eerst geopend en voorzigtig van het gezwel afgescheiden langs de zyden tót dat ik kon komen onder de genoemde peesfen. Vervolgens vatte ik het gezwel met een haakje, ligte het op naar boven, terwyl reeds eene dikke geley langs hetzelfde doordrong; met het mesje wierd de wortel of het onderste deel by het gewrigt los gemaakt. De operatie was volgens haar zeggen zeer dragelyk naar maaten fy gedacht had. De wonde wierd met plukfel gevuld, en dus vyf dagen gelaaten. De deelen wierden gestoofd met water en azyn, den vyfden dag was de verettering bepaald, het plukfel los, en dit wierd wechgenomen. Nieuw plukfel wierd 'er wederom ingedaan, waar op eenige droppelen *ol. ceræ* waren gegooten; een pleister en verband wierden volgens gewoonte gebruikt, De geneezing was, zonder het gebruik van andere middelen, op het einde van de derde week volbragt.

2.

Eene Boerin uit *Södermanland*, veertig jaaren oud,

oud, kwam in 1754 in het Hospitaal, fy had boven op het gewrigt van de linker hand een foortgelyk gezwel, van grootte als een hoener-ey, ongelyk in hoogte, van dezelfde kleur met de overige huid. Het eerste gezicht bragt my op de gedagten, dat het zoude zyn een winddoorn, of een beenagtig gezwel, gelyk RUISCH obf. 81. beschryft, welk eene bederving in de beenderen van den *carpus* tot grond zoude hebben; maar het berigt van deszelfs opkomt en toeneeming versterkte my in de meening, dat het was een *ganglion synoviale*, welk zonder gevaar met het mes zou kunnen aangetast worden. De vingers stonden half geboogen; de peesen van de spieren, die dezelveu uitftrekken, waren naar de zyden gedreeven, en onbeweeglyk. Na eene voorbereiding van eenige dagen wierd het gezwel ontbloot door eene lange insnyding, en de huid aan den buitenkant los gemaakt. Ik bemerkte toen, dat de uitsnyding, vooral aan den buitenkant, niet zoude kunnen geschieden, uit hoofde van de nabyheid en vereeniging der peesen; de insnyding wierd derhalven voortgezet in de lengtte midden door het gezwel tot op den grond: inwendig was het voor de helft kraakbeenig, en voor de helft als dik geworden styffel, konnende gemakkeelyk afgescheiden worden van de binnekanten van den zak: onder op den grond was de stoffe de dunste, en gelyk aan het wit van een ey. Ik meende nu te zullen vinden eene opening of gemeenſchap met het gewrigt, maar daarna zegt

ik te vergeefs met de sonde. De bevatte stoffe wechgenomen, en de losse kanten van den zak wechgesneeden zynde, was ik vergenoegd en verbond de wonde met droog plukfel, stoovende het geheele deel met water en azyn. Op den zesden dag openbaarde zich de verettering zonder byzonder toeval.

Na ruim agt dagen wierden de binnenste kanten bestrooid met *pulv. olibani*, *myrrh. r. ää. dr. ij. merc. præcip. rub. dr. ß.* welk de verettering vermeerderde, en den grond zuiver maakte. In het begin van de derde week was de wonde zuiver, maar toonde midden op den grond eene onzuivere en spekagtige vlak, waar uit het lede-water zoo onder als tusschen de verbanden sieperde, egter niet tot eene aanmerkelyke quantiteit. *Pulv. Myrrh. r. olibani. ää. dr. ij. Sacchar. alb. dr. ß.* wierden op deeze plaats gestrooid, en daar over werd gelegd een weinig plukfel met *Tinct. Aloës.* De opening liep toe, de wonde werd geneezen, de hand werd eerst gedraagen in rood vries, vervolgens in een schaapen-vel; de vingers wierden wederom beweegelyk en konden zoo wel geboogen als uitgestrekt worden; wanneer sy in de vierde week na de operatie geneezen uit het Hospitaal ging.

3.

Een man van drie- en veertig jaaren, welke de jigt, het voeteuvel in eenen minderen graad,
en

en het graveel had, wierd daar door beurtswyze geplaagd. Geduurende het geheele jaar 1755. was hy daar van bevryd; maar kreeg in de plaats een *tumor synovialis* boven op het gewricht van de regter hand, welk digt by de peesen der uitstreckkende spieren zich vergrootte tot de breedte van een gulde, en de hoogte van een' goeden overdwarschen duim. Syne overige bestendige en anders gewoone gezondheid maakte, dat hy zich weinig bekommerde, om dit gezwel te doen verdwynen; maar al 't geen hy ook gebruikte was ten eenenmaale vrugteloos. Een geheel jaar van alle de andere ongemakken vry geweest zynde, openbaarden zich, na dat hy zich te buiten gegaan had, de voorige ongemakken. Het was zeker, dat het wechneemen van het gezwel moest worden uitgesteld, terwyl de pyn in de lendenen de ontlasting van slym en gruis uit de nieren voorspelde, en daar en tegen deeze ongemakken zouden ophouden. Eindelijk kreeg hy uit onachtzaamheid en koude eene zwaare *pleuropneumonia* in den winter van 1757 en 1758., waar van hy ter nauwer nood herstelde. Alle gevaar overwonnen zynde, en hy wederom, als in de gezondheid, beginnende te leeven, openbaarde zich op nieuw een gezwel, welk hem een geheel jaar plaagde, vervolgens wierd hy, als te vooren, door de jigt aangegreepen, kreeg pyn in de lendenen en nieren, welke meêr of min verzwaarde.

Buikzuiverende zeep-pillen, een lauw bad,
en

en eindelyk het gebruik van Pyrmonter-water, waren gewoon hem 't langst van deeze ongemakken te bevryden.

4.


Eene getrouwde juffrouw van dertig jaaren had, even als in het voorgaande geval gezegd is, by poosfen vliegende jigt-pynen van de uitwendige naar de inwendige deelen. De laatste openbaarden zich door zwaare krampen in de maag en darmen, waar by stuipen in de dey het been en den voet kwamen. Deeze ophoudende, vertoonde zich boven het gewrigt van de regter hand een gezwelletje (*ganglion synoviale*), welk in grootte toe en afnam; zoo dra de genoemde toevallen bedaarden en wechbleeven, bemerkte sy geheele maanden eene ongeduurigheid, zoo ten opzigte van haare zinnen, als 't lighaam, met slapeloosheid en walging van spyfen, waar van men de rede niet kon uitvinden, of die door de beste middelen niet kon veranderd worden, voor dat het gemelde gezwel te voorschyn kwam, en zich aanmerkelyk vermeerderde. De toeneeming en hardheid verwekten wel eene begeerte, om het gezwel te laten wechfnyden; maar deszelfs gemeenschap ten opzigte van de overige ongemakken, vergeleeken met foortgelyke gevallen, maakte, dat ik niet schielyk daar toe wilde overgaan, dewyl ik dezelfen dikwils van zelve had zien verdwynen. Het aanmerkelykste van alle was, dat
deeze


deze vrouw, welke gezonde kinderen ter wereld bragt, in haare zwangerheid altyd vry was van dit gezwel, een goed humeur, en trek tot eeten had, maar dat fy kort na de verlossing ongemakkelyk wierd, den trek tot eeten verloor, niet kon slaapen, of, deze toevallen zich niet openbaarende, aan de hand een aanmerkelyk gezwel kreeg. Dit heb ik in vyf jaaren en drie zwangerheden in acht genomen en aangetekend.

5.

Eene ongetrouwde juffrouw van vyf- en twintig jaaren had, in 1758. zonder bekende oorzaak, gekreegen een *tumor synovialis* boven op het gewrigt van de regter hand, zoo groot, als een duiven-ey en tamelyk hard. Gevraagt zynde, of fy geene blyken van jigt-pynen in de leden, in voorige tyden bemerkt had? Antwoorde fy, dit binnen twee jaaren verscheide reifen gebeurd te zyn, en dat fy, zederd dat dit gezwel opgekomen was, vry van pyn in andere deelen was geweest. Terwyl 'er de noodige middelen bedagt en gebruikt wierden, voor dat de uitsnyding kon verrigt worden, gebeurde het, dat het gezwel by eene schielyke handgreep onder het dansen, en door eene geweldige buiging van de hand naar agteren, in stukken sprong, waarby een aanmerkelyk gekraak in het gezwel en het gewrigt van de hand bemerkt wierd. Het gezwel viel aanstonds

stonds in, en wierd zeer plat, maar spreidde zich verder uit, als of het beslooten vogt zich in den omtrek van den vetrok verspreid had. Geen pyn wierd daar van gevoeld, het ingezakte gezwel wierd gesmeerd met een mengsel van wyn, azyn, oly van was, en geeft van ammoniakzout, na dat de plaats eerst zagtjes gewreeven was met een fyn flanelle lapje, berookt met barnsteen. Na veertien dagen was het geheele gezwel verdeeld, en het gewrigt gelyk, zynde daarna nooit wederom gezwollen.





X I I.

Paronychia arida non inflammata.

Eene bysondere soort van Vyt, zonder ontsteeking.

De Vyt, *Panaritium*, *Panaris*, is zoo wel ten opzichte van de oorzaaken, kentekenen, uitkomst, als geneezing, genoegzaam bekend; maar die ziekte, welke, zonder de gewoone en schynbaare tekenen, veele jaaren den lyder plaagd met pyn in het einde van den vinger of duim, en het lid in eene vleeschagtige, vette, of lymerige stoffe deed overgaan, is, voor zoo verre my bekend is, tot hier toe niet beschreeven en aangetekend. Men kan hier toe niet betrekken zoodanige ziekelyke veranderingen van het been, het zy van een deel of van het geheele lighaam, die *osteo-sarcosfes* genoemd worden, en in de aanmerkingen der geleerden beschreeven zyn. De beenderen veranderen dan langzamerhand in kraakbeen of vleesch. Voor ruim een jaar heeft de Heer HEVIN door een' brief aan de Koninglyke Academie der Weetenschappen bekend gemaakt, dat eene Vrouw in Parys, *Suppiot* geheeten, in deeze omstandigheden na eene onbeschryvelyke pyn, haar leven daar by moest inschieten. De Heer MORAND heeft

heeft naderhand dit geheele geval beschreeven, en aan de Koninglyke Fransche Academie der Weetenſchappen overhandigd (*).

Van eene drooge beenbederving (*caries ſicca*), de ſcheurbuik, venusziekte, kankeragtige of ſcro-

(*) Hetzelve is niet alleen beschreeven in *Hist. de l'Acad. Roy. des Sciences* 1753. pag. 541. maar ook in *Phil. Trans. vol. 48. part. 1. for the year 1753. pag. 26.* en *Observ. sur l'hist. nat. phys. & peinture Tom. 2. pag. 115.* Deeze vrouw, dertig jaaren oud, was, na dat ſy in het jaar 1747. gekraamd had, aan beide zyden mank geworden en gebleeven, ſy bragt wederom in 1748. een kind ter waereld, en kreeg in 1749. een' miskraam. Zes weken hier na deed ſy een' val, waar op eene pynelyke zwelling aan haar eene been volgde, zonder dat iet uit ſyne plaats geweeken ware. Na verloop van zes maanden kreeg ſy een ſoortgelyk toeval aan het ander been, en de pyn verſpreide zich door alle leden, niet tegenſtaande alle deeze ongemakkelykheid kwam ſy in 1751. wederom in de kraam, en hier op verdween de zwelling, maar de onderſte leden hadden haare kragt verlooren. Na omtrent nog zes maanden vermeerderde haare pynen, en men zag in de pis een wit grondzetsel, 't welk van ſommige voor eene melkagtige ſtoffe wierd aangezien. De vrouw kreeg eene tegenwillige ſamentrekking in de ſpieren van de beenen, waar door de beenen en de deyen buitenwaards getrokken wierden, en eindelyk zoo eene kromming volgde, dat ſy, op de linker zyde liggende, met het hoofd op haar' voet, als op een kuffen, ruſte. De andere beenderen van het overig gedeelte van haar lighaam wierden inſgelyks week, en beide beenderen en deyen wierden eindelyk naar om hoog getrokken, zoo dat ſy eene zeer mismaaakte gedaante kreeg. In July 1752. kreeg ſy koorts, benauwde ademhaaling, hoeft, bloedſpoeging, en andere toevallen, waar aan ſy in November

scrophuleuse stoffe, is deeze insgelyks onderscheiden, daar in, dat de eerste zich niet lang of veele jaaren verbergen, zoo dat sy zich openbaaren door gezwellen op de beenderen met of zonder hitte, verzwearing en openberfing van de huid. Meestendeels word het laatste lid
van

ber van het zelfde jaar overleed. Het lighaam na de dood onderzocht wordende, bevondt men alle de beenderen zoo week geworden, behalven de tanden, dat men dezelve kon buigen, zoo men wilde, en met een mes snyden, gemakkelyker dan kraakbeen, ja byna als vleesch. Het bovenste van het bekkeneel was eenigzins plat, de beenderen van het zelve dik, en de beide bladen maakten met het tusschenscheidsel een rood sponsagtig lighaam, 't welk men door drukking allerhande gedaante kon geven. Zelfs de gehoor-beentjes waren week geworden. De onderkaak was van vooren, daar sy de kin maakt, wat plat, en zoo week byna als de beenderen van het bekkeneel. De wervelen der lendenen waren nog weeker, dan die van den rug. Het heilig-been was ook mismaakt van gedaante. De eerste en laatste ribbe van beide zyden hadden haar' natuurlyken bogt behouden, maar alle de andere hadden eene onregelmaatige gedaante aangenomen. De ongenaamde beenderen waren ook veranderd van gedaante, en hadden ook het bekken fyne natuurlyke vorm doen verliefen. De beenderen van de ledematen waren insgelyks in natuur en gedaante ontaard. Droog geworden zynde, wierden alle beenderen wederom hard.

By dit geval kan men nog voegen dat, welk de Hr. *Ludwig* beschreeven heeft in een *Programma*, te Leipzig in 1757. uitgegeeven, en waar van ik breedvoerig gesproken heb in myne *Natuur- en Genees-kundige Bibliothek. IV. D. pag. 511. en vervolgens in de nooten.*

van den vinger of duim aangedaan met eene zwaare pyn, welke fomtyds voor eenen korten tyd bedaard, maar niet bestendig wechblyft, voor dat het lid van den vinger met het been wechgenomen word, of de lyder door eene andere ziekte sterft met het ongemak aan den vinger.

Vier zulke gevallen heb ik gezien, waar van de toevallen en ongemakken zoo na aan elkan-der kwamen, dat eene enkelde beschryving vol-
doen kan. Een van deeze lyders is reeds gestor-
ven met het ongemak, doch van eene andere
ziekte; de andere zyn geneezen door het af-
zetten van het lid van den vinger.

De Heer Lyf-artz Rosën, die zich in het by-
zonder bekommerde over den eenen zieken,
wiens beschryving hier voornamentlyk opgege-
ven word, heeft goed gevonden, het volgende
omftandige berigt mede te deelen.

In den Zomer en Herfft van het jaar 1746.
bemerkte de lyder eene geringe steekende pyn,
telkens een, twee, of drie minuuten duuren-
de, in den kleinen vinger van de linker hand,
rondom den wortel van den nagel, aan den bui-
tenften kant van den vinger en den nagel. Dit
nam zoo langzamerhand toe, houdende op twee,
drie, of vier wecken tusschen beide, zoo dat,
wanneer de zieke vervolgens vroeg in het jaar
1747. eene aanmerkelyke pyn in den vinger
voelde, hy niet in staat was, zich te herinne-
ren,

ren, wanneer dezelve het allereerste begon, veel min welke de oorzaak daar van was. De steekende pyn wierd zwaarder, met pyn boven den nagel en het uiterste gedeelte van den vinger; doch dewyl dezelve zich openbaarde somtyds in twee of drie uren, niet meêr dan een half uur of quartier, ja dikwils alleenlyk eenige minuten, en eenen zoo langen tusschentyd had, somtyds van verscheide dagen ja dikwils van weken, bekommerde de lyder zich daar over niet zoo sterk, dat hy eenige hulp zocht.

Maar wanneer het ongemak vermeerderde tegen het einde van 1747, en het begin van 1748; wierd het *empl. de ranis cum Mercurio* daar op gelegd, dit veroorzaakte eene groote branding in den vinger, welke zich tot de hand uitstreckte, zoo dat de lyder, na verloop van eenen dag, genoodzaakt was, de pleister wech te neemen, waarna ook de pyn bedaarde. Doch, dewyl de pleister geroemd wierd, wierd dezelve wel twaalf of vyftien maalen binnen den tyd van een half jaar gebruikt, maar zelden langer, dan eenen halven dag telkens, dewyl dezelve altyd zoo veel pyn veroorzaakte, dat de lyder zich eindelijk inbeelde, dat de pleister de ziekte naar de hand kon voeren. Maar tot nog toe was zoo wel de arm als hand vry van pyn, hoewel de lyder egter op deezen tyd begon pynelyk te worden in den arm, wanneer hy zich des nagts op de linker zyde leide; maar over dag bemerkte hy niet het allerminste; zederd deezen

tyd heeft hy nooit op de linker zyde konnen liggen.

Het jaar 1749. en de helft van 1750. liepen zoodanig voorby, dat de pyn langzamerhand toenam, eerder wederkwam, zwaarder was en langer duurde, zoo dat de lyder, in de lente van 1750. geheele twee of drie dagen aan elkander daar mede geplaagd was. Hy gebruikte Venetiaansche Theriakel, en stak de hand in sterken brandewyn, kampher-brandewyn enz., waar door de pyn wel dikwils, voor eenige uren, verdoofde, maar naderhand wederom even sterk wierd.

In het jaar 1750, in Stockholm zynde, raadpleegde hy eenige Geneesheeren over synen zieken vinger, en gebruikte eenige pleisters, maar alle deeze veroorzaakten meêr pyn dan te vooren, en hy ging derhalven daar mede niet voort. De balsam van Mecca wierd vervolgens eenen geruimen tyd daar op gesmeerd, doch zonder nut.

In den winter van 1751. had de lyder voor het eerst geringe pynen in den linker arm, meest van binnen, vooral tegen flegt weder, en wanneer hy op de armen dun gekleed was. De vinger wierd ook zeer gevoelig, als men denzelven aanraakte, zoo dat, als hy te eeniger tyd onverwagts daar tegen stootte, voor een goed uur daar na ondragelyke pyn had:

maar

maar in eene bestendige en maatige warmte had hy aanmerkelyke verligting, en byna geene pyn, dan alleen, wanneer de vinger aangeraakt wierd.

In den zomer van 1751. gebruikte de lyder het bad te Aaken, en leide de slyk naarstig op het aangedaane deel; maar vondt geene verandering. Het drinken van het water duurde niet langer, dan veertien dagen, uit hoofde van het gewoone gebruik daar ter plaatse.

In 1752. tegen den winter nam de pyn in den vinger en arm sterker toe, dan te vooren, somtyds met geringe vliegende pynen in de zyde onder den arm. De lyder gebruikte agt of negen weeken een *Decoctum*, door den Hr. VAN SWIETEN in de Aantekeningen op BOERHAAVE, tegen de ziekten der beenderen gepreesen; doch zonder werking. Men stondt daar op, dat hy daar mede een geheel jaar zoude aanhouden, maar toen de tyd tot het drinken van den bron naderde, gebruikte hy vyf weeken de bron van *Fahlun*, en leide teffens geduurende twee maanden altyd de pleister van *Luthen* over den geheelen arm en de zyde.

Geduurende den zomer bevondt hy zich tamen wel zoo in den arm als de zyde, en de pyn was op verre na zoo groot niet, dan in den winter; doch hy had eene voortgelyke ongemakkelykheid in den vinger, en eene pyn, die dan dragely-

ker, dan fterker was; hy was beeter in de warmte, dan in de koude, doch eene al te fterke warmte kon hy niet verdraagen.

Buiten aan den vinger wierd niet het minfte teken van eenig ongemak gezien, allecnlyk eene blauwigheid onder den nagel, welke eerft gemerkt wierd, na dat hy de pleifter had beginnen daar op te leggen. Men kon ook niet bemerken, dat de vinger tot hier toe inkromp of minder wierd, doch de huid, vooral binnen in den vinger was dikwils eenigzins gerimpelt, waarfchynelyk van de beftendige warmte; terwyl de vinger, uit vreefe van aangeroerd te worden, altyd op de palm van de hand gelegd wierd, en deeze wederom, of met een handfchoen bedekt, of binnen de klederen wierd gehouden.

De lyder hoorde intuffchen veel fpreken van geneezingen, door middel van de Electriciteit te weeg gebragt; hy reisde daarom in de maand September 1752. naar Upfala, en gebruikte dezelve op de volgende wyze.

Den vyftienden September wierd hy geëlectrifeerd over den geheelen arm, en zagt op de helft van den aangedaanen vinger. 's Nagts was hy wel, gelyk hy na gewoonte nu eenige weeken te vooren was. Den zeftienden wierd hy geëlectrifeerd, als 's daags te vooren; wanneer men zich vooral bevlytigde de aangedaane zenuw

nuw te volgen. Twee of drie uren daarna werd hy zeer flegt. Tegen den avond werd hy wederom geëletrifeerd. In den nagt had hy goeden rust. Den zeventienden wierden by het eletrifceeren fterke vonken uit den arm, het fchouderblad, en den rugge gehaald, maar geringe uit den aangedaanen vinger. Dit gefchiede even eens 's avonds. Dan voelde hy pyn in den vinger, en dan wederom was hy zeer wel.

Den agtienden eletrifceerde men hem, als den voorigen dag, vooral op de tweede verdeeling van de vierde *nervus axillaris*, welke onverdeeld na den buitenkant van den kleinen vinger gaat, dewyl men meende, dat het ongemak in deezen tak was. In den namiddag werd de electriciteit op dezelfde wyze herhaald, en men haalde kleine zwakke vonke nait den kleinen vinger, digt by den nagel. Des avonds bevondt hy zich ten opzigte van den vinger zeer goed, en kon toelaaten, dat dezelve tamelyk fterk gedrukt en gekneepen wierd, zoo dat dezelve op verre na zoo gevoelig niet was, dan voorheen. In den arm voelde hy geene beftendige pyn, maar alleenlyk eene vliegende, nu en dan, 's nagts.

Den negenden gefchiedde de Electriciteit in den voor- en naarmiddag even eens. Hy bevondt zich daarop, als den dag te voeren. Men

had derhalven van deeze geneezing eene goede verwagting.

Den twintigften wierd hy vyfmaal geëlectrifeerd, dewyl hy verfcheide spanningen in den vinger voelde, welke door het Electrifeeren aanftonds verdweenen, terwyl de pyn ook geftild wierd. Den een- en twintigften electrifeerde men hem tweemaal, en hy bevondt zich wel; gelyk ook den twee- en twintigften. Den drie- en twintigften herhaalde men de Electriciteit tweemaal, gelyk te vooren, op den arm, rugge en het fchouderblad. Hy begon fterke trekkingen in de fchouders en den rugge te krygen, ook in den vinger, en aan den binnenkant van de twee naafte vingers. Den vier- en vyf- en twintigften was het even eens. Den zes- en twintigften electrifeerde men hem insgelyks tweemaal. Hy voelde zwaare pynen in den vinger en arm, die fomtyds een weinig ophielden, maar daarna even fterk wederkwamen, voor al 's nagts. Den zeven- en twintigften was het even eens.

Den agt- en negen- en twintigften hield men met het Electrifeeren op, om te zien, of 'er eenige verandering in de pyn te hoopen was, doch dezelve was, als de voorige dagen.

Den dertigften electrifeerde men wederom tweemaal. Hy had verligting in den vinger en arm, zoo lang fy wel omwonden waren; doch

doch by de geringſte koude begon de pyn op nieuw , vooral aan het einde van den vinger , met grooter ongemak zich te openbaaren , dan voorheen.

Dewyl de lyder dus van de Electriciteit niet veel voordeel had , liet men dezelve na , en hy gebruikte agt dagen een damp-bad ; doch , dewyl dit inſgelyks niet veel verligting kon verſchaffen , leide men een pleiſter van ſpaanſche vliegen op den buitenkant van den aangedaanen vinger , in de gedagten , dat dezelve in dit geval dezelfde hulp zoude aanbrengen , als in het begin van de Vyt. Doch ook dit middel was vrugtelooſ. Uit deeze oorzaak , en dewyl de pyn het eerſte begin aan den buitenkant van den vinger genomen had zoo ver , als de halve nagel ging , en zich aldaar langen tyd bepaald had , eer dezelve tot den arm en ſchouder was gekomen , en ook als nog niet in de ſchouder en arm , maar altyd eerſt in den vinger begon , raadde men den lyder het laaſte lid van deezen vinger te laaten wechneemen.

Hy was niet ongenegen , deezen raad te volgen , doch men ſtelde egter de operatie uit , want geduurende den volgenden winter had hy meêr verligting , dan hy in het voorige jaar gehad had , zoo dat hy flegts by zekere veranderingen van het weder in den arm en de zyde pyn had , welke egter ſchielyk overging , maar in den vinger had hy de gewoone pyn , hoewel

niet zoo zwaar, als te vooren. Het dampbad, welk hy in Upsala gebruikt had, wierd in den winter verscheide reizen met voordeel herhaald. Aan de zieke hand droeg hy eene handschoen van vries, en had altyd over den arm en de zyde vries onder het hemd. Doch in Mey 1753. nam het ongemak weder toe, en wierd zwaarer, vooral by slegt weder. Daarna besloot de lyder den gegeven raad te volgen, en reisde eindelijk in deeze gedagten naar Stockholm.

Kort daar op wierd in eene raadpleeging met de Lyf-artzen ROSÉN, SCHÜTZER, en my beslooten, het einde van den vinger te laten wechneemen, 't geen twee dagen daarna in het tweede lid door den Hr. SCHÜTZER met myne hulp geschiede. De gewoone pyn was aanstonds, na het wechneemen van het lid, merkelyk verminderd, maar gevoeligheden van minder hevigheid wierden nog bemerkt, gelyk in het wechgenomen gedeelte van den vinger. Deeze namen egter ook langzamerhand af, na dat de verettering vermeerderde, en de geneezing volgde. De pyn, die te vooren in de schouder gevoeld was, duurde 't langst, en wel tot in de vierde week. In de vyfde week na de operatie was alle pyn verdweenen, en de geneezing tot op eene kleine opening volbragt. Doch eerst na verloop van eenige maanden wierd de wonde volkomen met de huid gesloten, na dat men eenige reizen zeer diep den helschen steen gebruikt had.

Aan

Aan het wechgenomen einde van den vinger bemerkte men 1. dat de nagel zeer vast aan den rand rondom met de huid omringt was, doch aan de onderste zyde niet daar aan vast was, schoon men dit aanstonds niet kon bemerken. 2. Dat aan de overige huid, het vet en de peesen niets tegen natuurlyks was; doch 3. zag men, dat het laatste kootje van boven geswollen en in vet veranderd was, waar mede deszelfs onzichtbaare holligheid gevuld was. Het vet kwam volkomen met het gewoone in het vetvlies overeen.

De derde van deeze zieken, eene oude getrouwde vrouw, had negen jaaren meestendeels aanhoudende pyn in het voorste lid van den voorsten vinger van de linker hand gehad. In de twee laatste jaaren is het einde van den vinger dik, en te gelyk tamelyk doorschynende geworden, als men het tegen het daglicht of tegen eene kaars hield. De afzetting geschiedde in het naaste gewrigt. De pyn was bedaald, doch hield niet volkomen op, voor dat de geneezing na agt weeken volbragt was. Het einde van het been was, behalven een klein stukje, by het naaste lid, geheel en al in eene dikke, taaye, en heldere slym ontbonden, welke in kleur en dikte overeen kwam met het crystallyne vogt van het oog.

De vierde was eene getrouwde vrouw, ruim dertig jaaren oud, welke zeven jaaren lang
foort-

foortgelyke pyn, als de eerste, aan het einde van den duim van de regterhand gevoeld had. Nauwelyks is 'er eenig geneesmiddel bekend, welk men niet van den beginne en den geheelen tyd door gebruikt heeft, om haare pyn wech te neemen of te verzagten, doch alles te vergeefs. Dit einde van den duim zag 'er volkomen zoo uit, als by den eersten, zonder hitte, roodheid, of zwellings; het agterste van den nagel was eenigzins meêr verheven, dan het moest zyn, zoo dat de nagel van agteren iets naar voren stond. Ik nam het einde van den vinger in het eerste gewrigt af, en daar by was het ten opzigten van het stillen van de pyn, en de geneezing der wonde volkomen, als in het eerste geval. De nagel was overal vast. Wanneer men het agterste gedeelte van het beentje bloot maakte, vondt men hetzelfde aan den onderkant verteert, en eens zoo dik, als het natuurlykerwyze zyn moest. Het middenste gedeelte was zeer dun en plat, met eene indrukking op de bovenste zyde. De oorzaak van deeze platdrukking was een klomp vet, die harder was, dan een klier, en tusschen het agterste gedeelte van den nagel en het middenste van het beentje gevonden wierd, dit had het been samengedrukt, en den nagel naar boven gedreeven. Dit was derhalven niet eene eigentlyke ziekte van het been, welke haare zwaare pyn eenige jaaren veroorzaakt had, zoo als de gevallen, welke behooren tot den wind-doorn of de *osteo-farcosis*, maar een klein en byzonder vetgezwel

zwel op eene zeer nauwe en onbekwaame plaats. Het been aan den onderkant, en de nagel aan den bovenkant, beletten de vrye opgroeiing en moesten derhalven lyden. In het eerste Hoofdstuk, in de twaalfde waarneeming pag. 59, hebben wy gezien, dat een foortgelyk vet-gezwel het oog uit deszelfs holligheid gedreeven heeft, en gelukkig uitgedrukt is, zoo dat het gezicht behouden bleef; maar in dit geval kon het gezwel noch gekend, noch wechgenomen worden zonder het lid van den vinger af te zetten.

In de eerste afbeelding van de eerste plaat word de gedaante der beenderen van het eerste geval beschreeven. *a.* Betekend het tweede lid. *b.* het derde. *c.* De onderste en buitenste rand, die meestendeels verteert is, en tegen welke de nagel neêrgebogen was. *d.* Het putje, waar in het vet lag. *e.* De bovende rand, door de bederving scherp geworden.

De tweede afbeelding vertoont het beentje van het laatste geval, zoo wel aan de vlakke zyde, als aan den rand. *a.* Het opgezwolle agterste gedeelte; *b.* de uitgeteerde holte aan de andere zyde, welke met vet vervult was; *c.* de holligheid midden op en aan het bovenste gedeelte van het been.



X I I I.

*Erysipelas phlegmonodes suppurans.**Eene roosagtige ontsteeking en verettering.*

In den zomer van 1758. kwam in het Hospitaal eene vrouw van vier- en dertig jaaren uit *Södermanland*; voor vyf weeken had een Boer haar adergelaaten op den linker arm. De aderslating was tegen gewoonte pynelyk geweest, en kort daar op was gevolgd eene meêr aanmerkelyke pyn, roodheid en zwelling, eerst rondom de opening in de ader, en vervolgens over den geheelen arm. Om het gezwel te verdeelen waren allerhande ondienstige middelen aangewend.

Wanneer deeze vrouw in het Hospitaal kwam, vondt ik haar zeer kragteloos en met eene aanhoudende koorts, den linker arm van de schouder tot aan de toppen der vingers gezwollen, onbuigzaam, en met eene stinkende etter befoedeld: verscheide openingen waren 'er in de huid, waar uit de etter en stukken van het vetvlies te voorschyn kwamen. Om de verettering des te beeter te bevorderen, wierd rondom den geheelen arm gelegd een weekmaakende
pap

pap van haver-gort , welke driemaal 's daags veranderd wierd. De meest verzwoore plaatsen wierden geopend, en met setons vereenigt, om het ontbonden vetvlies af te scheiden, en de onderleggende deelen te zuiveren.

De koorts, die in den beginne toevalliger wyze ontstaan was door de etter, welke in het bloed was opgeslorpt, was zederd opgehouden, de zwelling en pijn waren verminderd, de etter kreeg beter reuk en kleur, en de wonde begon, na het uittrekken van de seton, geneezen te worden, wanneer eene nieuwe *metastasis*, na voorafgaande huiveringen en koorts, veel en fcherp water bragt tot de klieren van de huid en buiten op den geheelen arm. Inwendige verkoelende en bloedzuiverende dranken, zagte buikzuiverende middelen en goed voedsel, waren van den beginne af aan niet verzuimd, en nu wierden sy na vereisch der omftandigheden voortgezet en vermeerderd. De wonde en geheele arm wierd verbonden met droog plukfel en linne doeken. Na agt dagen vielen de huid, en rooven, die na den uitflag gevoigt waren, af; en aanftonds begon de huid gesmeerd te worden met *aq. calc. sec. lib. ℥. vin. alb. gall. mell. alb. ää. unc. ij.*


Na verloop van zeven weeken was de geheele arm in het Hospitaal tot de natuurlyke gedaante hersteld, en dezelve had de beweging weder gekreegen.

Dit

Dit geval is niet het eenigste, welk zich heeft opgedaan, doch de andere hebben, behalven de oppassing, niets merkwaardigs; uit hoofde van de oorzaak alleen, schynen sy opmerking te verdienen. Ik weet uit eigen ondervinding, om van andere te zwygen, dat zulke ontfteekingen en verzweeringen volgen op de best verrigte aderlatingen, zoo 'er eenige verborge ziekte in het lighaam uit de ontaarting der vogten gereed is, om uit te breeken, welke naar maate van de oorzaaken meêr of min gevaarlyk of doodelyk worden: welk deel in de buiging van den arm, behalven de groote zenuwen, zoude, gekwetst zynde, zulke gevaarlyke toevallen kunnen veroorzaaken? noch de *tendo*, noch de *aponeurosis* van de *biceps* of *cubitalis*, want deeze worden open gemaakt en gesneeden by alle gelegenheden, gelyk ook in het voorgaande geval gebeurd is, zonder dat daar op eenig teken van ongemak of pyn gevolgd is.

Hoc dikwils worden de peesen op de voeten by de aderlatingen niet aangeraakt zonder het minste kwaad gevolg? Het is ook niet uit gemaakt in het *systema irritabilitatis* van den Hooggel. Hr. HALLER, of de zenuwen, behalven haare ongemeene gevoeligheid in het gemeen, in het byzonder lyden van een kleine steek of insnyding, wanneer dezelve aanstonds ophoud? Het schynt, dat de veelvuldige aderlatingen en andere wonden in de huid zelden zouden kunnen afloopen zonder zwaare gevolgen, daar wy weten, dat
veele

veele aanmerkelyke takken van zenuwen tot in de huid loopen zoo wel in het aangezicht, als op de leden, die dikwils gekwetst worden; maar eene aanhoudende prikkeling van eene zenuw verwekt ontegenzeggelyk ondragelyke pyn, 't geen ik by het uitpellen van kliergezwellen aan den hals en ook by andere gelegenheden duide-lyk heb bemerkt. Dat eene ingeademde ver-rotte lugt veroorzaakt doodelyke ontfteekin-geſ, verzwearingen, ja het vuur, daar van vindt men ook in deeze verzameling eenige on-gelukkige gevallen, in het Hospitaal te Stock-holm gebeurd, aangetekend.





X I V.

Oedema erisipelatodes, chronicum, manuum & digitorum.

Eene langduurige roosagtige zwelling aan handen en vingers.

De oorzaaken tot koude gezwellen, waar mede de handen fomtyds aangedaan worden, zyn veelerley; doch in 't byzonder hebben de lyders, welke by het Hospitaal voor zoo een ongemak hulp gezocht hebben, berigt, dat hetzelfde syn begin genomen had na voorafgaande heete ziekten.

De handen, van de toppen der vingers tot over het gewrigt, en tot de helft van den onder arm, hebben langzaamerhand beginnen te zwellen, dik, zwaar, en tot de beweeging onbekwaam te worden, zonder byzondere pyn of verandering van kleur op de huid. Hoe meêr de gezondheid en kragten wedergekomen zyn, des te eerder is de zwelling op syn hoogst geweest, en omgekeerd. De meesten hebben dit zwaare en byna ongeneeslyke gevolg toegescreven aan flegte of geheel geene oppassing onder de ziekte; wanneer de, tot de ontlasting bereide,

vog-

vogten vryheid vonden, zich neer te zetten in de deelen, 't verft van het hart afgelegen, en niet door de regte weegen uit het lighaam gebragt waren, waar op volgen moest, dat het celagtig weeffel uitgezet, en eindelyk zoo opgezwollen wierd, dat het niet meêr kon wederkrygen fyne behoorlyke fterkte.

I.

Eene jonge Juffrouw uit Upsala, en een jonge knecht uit *Ostergjötland* hebben in deeze omftandigheid hulp by het Hospitaal gezogt in 1755 en 1757. De vingers, handen, en derzelver gewrigten waren, gelyk boven gezegd is, van kleur onveranderd, zeer opgezwollen, zagt, en lieten eenige putten na, als men daar op drukte. Het overige lighaam was volkomen fris en gezond. Verscheide der geschikfte middelen waren reeds, het een na het ander, van bekwaame lieden beproeft, gelyk ook het draagen van zeer nauwe handschoenen tot over den *carpus*. Inwendig waren oplofende, verdeelende, en afzonderende middelen niet verzuimd, maar alle te vergeefs.

En, schoon het ongemak reeds eenige jaaren geduurd had, wanneer fy in het Hospitaal kwamen, kon men by de inwendige geneezing geene andere oogmerken hebben, dan die in den beginne vrugteloos geweest waren. Derhalven zogt men ook door een uitdryvend verband de



stilstaande vogten verder op in de groote vaten te brengen, en te gelyk aan het vetvlies weder te geeven syne verloore veerkragt. De vogten lieten zich ook waarlyk te rug dryven, maar zakten, kort na dat het verband afgenomen was, wederom neder. De geestryke en te rug dryvende middelen, welke by het gebruik van den zwagtel dienden, om denzelven te bevogtigen, deden geene werking. Het zweeten der handen, des nagts zeer dicht aan het lighaam, of tegen warme water-vlesschen gelegd, maakte de huid zagt, maar zonder dat het gezwel verminderde. Met een woord, tot dat 'er eenige nieuwe en zekerder middelen zullen opgegeeven zyn, waar door een soortgeelyk *oedema chronicum* vel *scirrhusum* zoude kunnen geholpen worden, kunnen de gewoone niet het allerminste doen.

2.

Een arme Knecht uit *Smoland* kwam in den hoogsten nood in den voorleden zomer tot het Hospitaal; hy was nu twintig jaaren oud, meestendeels blind door rooven op het doorschynende hoorn-vlies, zynde het geheele lighaam met zweeren en rooven bezet. Van syne jongste jaaren was hy ziekelyk geweest, en met zulk eenen uitslag geplaagd, welke by tyden geneezen was, en wederom openbrak. De blindheid was een gevolg van dezelfde scherpte, welke voor twee jaaren de oogen aangedaan, en de litteekens overgelaaten had.

Voor

Voor agt jaaren kreeg hy eene zwelling aan de linker hand met zwaare pyn, en ondragelyke hitte, welke ruim een jaar duurde, tot dat fyne handen en vingers eene wanftaltige gedaante gekreegen hadden. De hand en vingers waren ongemeen gezwollen, vol met dieptens en hoogtens; de vingers staken uit, en waren onbeweeglyk, de nagels meest afgevallen; de huid op de handen met rimpels en grof, maar binnen de hand even eens, als sy meestendeels onder de voetfoolen gevonden word.

De overleeden Provinciaal Medicus D. LARS GUMÆLIUS heeft aan de Koninglyke Academie overgezonden de afmeeting van de hand en vingers, gelyk volgt. De lengtte van het uiteinde van den kleinen vinger was $8\frac{3}{4}$ duimen.

De dikte over het gewrigt van de hand $8\frac{1}{4}$ duim; de lengtte van den duim $2\frac{1}{2}$, de omtrek vyf duimen. De drie middenfte vingers waren lang $3\frac{3}{4}$, derzelver omtrek was zes tot zes en $\frac{3}{4}$ duimen.

De lengtte van den kleinften vinger was $2\frac{1}{2}$ de omtrek $4\frac{1}{2}$ duim. Dus waren eenige vingers byna zoo dik als de arm onder het gewrigt. Hy kon niet, zonder hulp van de regter hand, de linker opligten, welke nu langs het lighaam hong; de regter hand was voor een jaar ook begonnen heet te worden en te zwellen, en was nu met het gewrigt tamelyk opgezet.



Wat deezen nog meêr ongeneeslyk maakte, dan de voorgaande, was de uitdrooging der leden. De diepe zweeren hadden op verscheide plaatsen van de armen en het lighaam soortgelyke diepe litteekens gemaakt, die aan het onderliggende been vereenigt waren. Tusschen deeze litteekens waren de vogten eensdeels uitgeflooten, waar door de spieren als verdweenen waren en de huid met het been vastgegroeit was, eensdeels in eenen zeer traagen en als beletten omloop, byna gelykende na de beschryving, welke men heeft van de *Elephantiasis Arabum*. Na dat hy op het bevel van de Directeurs van het Koninglyke Hospitaal veertien dagen onderhoud genooten had, kreeg hy eenig reispeld en vertrok naar huis.



XV.

Oedema manuum scirrhomides cum impetigine (Plinii) cutis.

Eene verharde zwelling aan de handen met eenen uitslag op de huid.

Eene Dienstmeid uit *Södermanland*, vyf- en twintig jaaren oud, kwam in 1758. in het Hospitaal.

Voor twintig weeken had fy eene heete koorts gehad, welke drie of vier weeken had geduurd, zoo dat fy in zeer groot gevaar was geweest. Eindelyk was de koorts wechgebleeven, waar op een uitslag, als na de bladderroos, het geheele lighaam had ingenomen, voornamentlyk het aangezicht, den hals, borst, en armen. Deeze laatste waren te gelyk begonnen te zwellen van het einde der vingers tot de buiging der armen, zonder dat het eenigzins verminderde of afnam.

Nu waren alle bovengenoemde deelen met witte rooven, verharde klieren (*gland. subcutaneæ infarctæ*) en schilfers bedekt, vooral in het aangezicht, op den hals en de borst. Hier en



daar wierden diepe ingevreete plaatfen , met drooge hollen in de huid en het vet , gezien , niet ongelijk aan nieuwe gefneede wonden ; de armen handen en vingers waren oedemateus , gezwollen , en onbeweegelyk ; eene geringe aanhoudende koorts , benauwde ademhaaling , aanhoudende pyn , en flaapeloosheid volgden daar op.

De geneezing wierd begonnen met het zuiveren van de huid ; en dit gefchiedde om den anderen dag drie of vier reifen . Om den dorft te leffchen wierd gegeven een verkoelende en verdunnende drank , en tegen den nagt , na het gebruik van het bad , een poeder van falpeter met kampher .

Een aanhoudend gebruik geduurende agt dagen maakte veel verandering ten opzigte van de fchilfers in het aangezicht , aan den hals , en op de borft , maar op de handen en armen zaten fy even als een ongelijke pyn-baft , fy wierden derhalven agt- en veertig uren lang met het *Empl. ftict. Hamb.* bedekt , en toen volgden de rooven by wlekken mede .

Tot een beeter weekmaking wierden rondom de handen en armen gelegd pappen van rogge-meel , gekookt in flap bier , en drie maalen's daags veranderd . De huid wierd zuiver en zagt , maar nog even eens gezwollen , als in den beginne . De eerfte drie weeken , en tot dat de

genoemde toevallen, door de vermeerderde uitwaaseming van de huid, waren overwonnen, wierd om den derden dag gegeven een *Elect. laxans antiphlog.*, en vervolgens, in plaats van den verkoelenden drank, een afkooksel der houten, de *Guajacum, Santal. citr. Rad. Chinæ, Polypod. en Raf. C. C.* en teffens een Poeder van *Aethiops min. unc. j. Farin. rad. sarsæ unc. ℥. Res. Guajaci, Rhei Alexand. ää. dr. ij. aloës socotr. dr. j. sacchar. alb. unc. j.* waar van 's morgens en 's avonds een half dragma gegeven wierd. Het bad wierd nu om den derden en vervolgens om den vierden dag gebruikt. De diepe zweeren waren intusschen met bekwaame middelen tot verettering en geneezing gebragt.


De huid was overal zagt en zuiver in de zesde week. Sy wierd versterkt en voor nieuwe schilfers bevryd met *Aq. calc. lib. j. Vin. alb. G. unc. iv. mell. alb. unc. ij*, welk middel met eene veder 's morgens en 's avonds daar over gesmeerd wierd. Het poeder maakte 's daags twee of drie ontlastingen. Het gezwel in de handen was weeker, maar wilde niet verdeeld worden. Derhalven wierd een uitdrijvende zwagtel van onderen naar boven aangelegd eenige dagen agter een. Sy moest vervolgens 's nagts de handen leggen op het bloote lighaam onder het dek, om dezelve aan het zweeten te houden, 't welk veel hielp tot de verdeeling. Hier mede wierd alle nagten voortgegaan. Na dat het gezwel ten eenenmaale uit het gewrigt van de

hand gegaan was, volgde daar in eene zoo groote lamheid, dat fy niet in staat was, de linker hand op te ligten, welke altyd naar beneden en naar binnen viel, even als in de sterkste buiging. De leden wierden gewreeven met de *Spir. lavend. comp.* en met een spalk van bortpapier ondersteund. Elf weeken waren voorby gegaan, wanneer fy in deezen staat het Hospitaal verliet, volkomen gezond, behalven de zwakheid van de hand.

Drie maanden na haar vertrek heb ik gevonden, dat fy beter begon te worden en even dun, maar zonder eene genoegzaame sterkte, om tot alles gebruikt te kunnen worden. Eindelyk heb ik haar geraaden dagelyks in een slagthuis de hand te steeken in de ingewanden van geslagte beesten, of in het warme pens-nat van deeze dieren, om door deeze natuurlyke warmte op te wakkeren de kragteloofse zenuwen en peesen: het is jammer, dat het wezenlyke nut van de Electriciteit, van den hoogsten graad van een blind vertrouwen, nu wederom by ons gevallen is in eene diepe vergetelheid en onbruik.

Het ware ook wenschelyk, dat iemand zoude willen opgeeven eene manier, om na te maaken de warme uitlandsche baden, zoo nuttig, zoo niet de kragtigste middelen in het geneezen van voortgelyke verlammingen.






HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



VYFDE HOOFDSTUK.




VAN DE ONGEMAKKEN, WELKE VOORKOMEN
AAN DE ONDERSTE LEDEN.



I.

*Oedema pedum, crurumque scirrholes
& lividum.*

*Eene koude, barde, en paersche zwelling der beenen
en voeten.*

 en man van agt- en vyftig jaaren,
 in Stockholm woonende, had na eene
 driejarige derdendaagfche koorts, wan-
neer dezelve ophield, behouden eene kou-
de oedemateufe zwelling in beide beenen en
voeten. De zekere en groote nuttigheid van
den koorts-baft had in het begin van deeze
eeuw

eeuw nog niet verkreegen het vertrouwen van alle en van dezen man, of hy had denzelven gebruikt zonder behoorlyke keuse, en volgens 't geen hy zelve zyde, zonder eenige omzigtigheid ten opzigte van spys, drank, of de lugt; waar by vooral moest gerekend worden, dat hy, die van syn ambagt een looijer was, zoo wel onder, als tusschen de koorts, met bloote beenen het leder in koud water gestookten had. Des niet tegenstaande waren syne gezonde ingewanden in staat geweest, zich van de koorts te bevryden, maar te gelyk waren alle taaije vogten, die afgescheiden moesten worden, naar de beenen en voeten gezakt. Dit was hem gebeurd in 1727—1738, en dus zag ik hem voor 't eerst, negen jaar' daar na, met myn' Lèermeeester in de Heelkunde, den beroemden, en tot groote droefheid overleden, Stads - Heelmeeester GERHARD BOLTENHAGEN. Behalven de teenen, die van het gezwel vry waren, waren de voeten en beenen van de enklaauwen tot aan de knie even dik, hard, en paersch. De hardheid was zoo aanmerkelyk, dat men niet, dan met moeite en pyn, putten in het gezwel kon drukken, waar by de kleur van de huid niet veranderd wierd, maar donker blauw bleef zoo wel onder, als na de drukking. Het gezwel verminderde niet des nagts, want de beenen waren ten eenenmaale buiten staat, om uit te waassenen, ja 't geen my het zeldzaamste voorkwam, was, dat hy, in de lente van het jaar 1739, zes weeken het bed hielden.

dende, van wegens eene rotkoorts, die toen regeerde, waar by hy veertien dagen slapeloos, dikwils ylhoofdig, en verscheide reizen in levensgevaar was, syn geheele lighaam somtyds zweette, maar nooit de beenen, welke ook, de ziekte eindelyk overwonnen zynde, noch dunner noch weeker gevonden waren. Hy bleef nog eenige jaaren gezond, en verrigtte syn werk met de gewoone sterkte, dit weet ik, maar aan welke ziekte hy naderhand stierf, is my niet bekend.

Dit geval, als ongeneezen, fchynt niets byzonders voor de Geneeskunde te behelfen, maar ten opzigte van de voorzegging, waar in men zich ligt kan bedriegen, en meenen, dat het vuur niet ver afweezig is, heeft het my toegescheenen, dat zulk een byzonder en langduurig *oedema*, waar van ik een soortgelyk (behalven in eenen hoogen graad van scheurbuik) nog voor noch na dien tyd gezien heb, eene korte beschryving verdiende. De overleeden Stads-Doctor N. BOYE, en de Stads-Heelmeeſter BOLTENHAGEN behandelden hem onder de genoemde koorts, wanneer ik, als door hen daar toe aangesteld, hem dikwils bezogt, en daar by deeze aanmerking maakte.





I I.

*Fistulae lumbares, coxales, cotyloideæ,
& femorales.*

Pypzweeren in de lendenen, de heupen, in de holligheid van de geleeding, en het dey-been.

Een groot getal zieken van deeze soort hebben hulp in het Hospitaal gezogt, na dat sy door den kwaaden aart der ziekte, eene kwaade of verzuimde behandeling, na langen tyd en nieuwe daar door veroorzaakte ziekten waarlyk ongeneeslyk bevonden wierden.

Een en ander van zulke elendigen, die ver af woonden, zyn op hun verzoek in het Hospitaal genomen, en men heeft op de kragtigste wyze beproeft, of 'er eenige mogelykheid tot de geneezing was; maar de meesten zyn ongeneezen uit het Hospitaal gegaan, of hebben, uit hoofde van derzelver ongeneeslykheid, volgens de orders van het Koninglyke Hospitaal, daar in niet kunnen genomen worden, tot nadeel voor andere en geneeslyke zieken.

De beschryving van een van elke soort zal genoegzaam kunnen doen zien de beletselen en
oor-

oorzaaken, welke meestendeels zulke pypzweeren buiten alle hoop van geneezing stellen.

I.

Eene Pypzweer in de lendenen.

Een vermagerd gebrekkelyk jongeling, agtien jaaren oud, uit het Distrikt van *Jönköping*, wierd naar het Hospitaal gebragt in 1755. In de jongste jaaren had hy door eenen ongelukkingen val den rugge-graat gebrooken, zoo dat hy na dien tyd in eenige jaaren niet kon staan op de beenen, maar in het bed moest blyven.

Na allerhande poogingen had zich eindelyk een groot en zagt gezwel vertoont op de linker dey, dat ten laatsten van zelve openbrak, en veel dunne etter gaf.

Eenigen tyd daarna had een voortgelyk zich gezet onder de bil van dezelfde zyde, dat ook openbrak. Wederom na eenigen tyd was zoo een gezwel gekomen op dezelfde plaats aan de regter dey, opengebrooken, had veel etter ontlast, en was nu veranderd in eene pypzweer. De ruggegraat was van het heilig-been tot de helft van de wervelen der rug, in een halfroond uitgezet; vooral de lenden-wervelen. de deyen en beenen, waren naar den buik getrokken, en het hoofd op de borst geboogen; (*Empyothotonos chronicus ex anchylosi*). De gewrigten van beide knien waren vastgegroeit.

De

De pypzweer wierd onderzocht; dezelve liet de langfte sonde vry gaan tot op de holligheid van den buik, van boven het *os pubis* en bekken tot het heilig-been, en zoo langs den ruggegraat, van agteren ging de sonde door de *incisura ischiatica magna* langs den rüggegraat; en daar by wierd op veele plaatsfen het bloote been ontdekt. Wie ziet niet, dat deeze en foortgelyke ongeneeslyk zyn? ik heb ook geopend twee, die eindelyk gestorven waren van deeze pypzweeren, en, gelyk ik gedacht had, een of meer wervelen der lendenen bedorven en verteert gevonden.

2.

Eene pypzweer in de heup.

Een knecht uit West-Göthland, van vier- en twintig jaaren, gaf zich aan in het Hospitaal in het jaar 1754. Zederd vyf jaaren had hy gekreegen een aanmerkelyk groot gezwel op het linker heupbeen, welk hy onder fynen arbeid zonder daar op acht te geeven, droeg, met zwaare pyn. Eindelyk was 'er eene opening ingekomen, die veel etter hadgegeeven. Zederd dien tyd hebben zich veele openingen vertoont, al na dat de etter eenen weg genomen heeft.

Nu wierd gevonden, een weinig laäger, dan de *crista ilei sin.* een hard gezwel, by welker
ope-

opening een gecariceerd beentje, zoo groot, als een middelmaatige duim, uitgehaald wierd: dit was ongetwyfeld afgeschilferd van het genaamde been, maar zat in het vleesch, zonder eenige gemeenzaame opening met de plaats, van waar hetzelfde kwam. Langs den rand van het heupbeen wierden nog drie pypzweeren gevonden, welke deels tot op het bloote been gingen, deels naar beneden tusschen de *musculi glutæi*. In de liesch boven de *spina ant. & inf. ilei* waren twee openingen by elkander, door welke de sonde gebragt wierd langs den binnenkant van het *ileum* tegen het *os sacrum*. Van agteren naar de zyden van de billen tusschen den zak en de *tuberositas cristæ ossis ilei* wierd nog eene opening gezien, welke de sonde wel horizontaal tot op het been doorliet, maar niet kon gebragt worden zoo diep, dat dezelve aan de eerste raakte.

Hier wierd derhalven gevonden eene inwendige pypzweer met beenbederving, waar by alle middelen vrugteloos waren, zoo niet schadelijk. En, dewyl deeze kneegt goede kragten had en voor het overige gezond was, wierd hy geraaden, om het bloed te zuiveren van de etter, welke by toeval opgenomen was, jaarlyks een gezondbron te gebruiken, en daar by, gelyk hy tot hier toe gedaan had, zich te vertrouwen aan de wyze werking der natuur, of ten minsten af te wagten betere aanleidingen tot uitwendige hulp.

3.

Eene pypzweer tot in het gewrigt van de dey.

Deeze pypzweeren zyn doorgaans onge-
neeslyk, wanneer fy van eene inwendige oor-
zaak of voorafgaande verettering voortsprui-
ten.

Tot de inwendige oorzaaken, welke meest
voorkomen, worden voornamentlyk gerekend
zulke *congestiones arthritico-rheumaticæ*, of *Ischias*
phlegmonosæ, welke in korteren of langeren tyd
aandoen de deelen, die tot het gewrigt be-
hooren, de vliessen, peessen, banden, het kasje,
en zelfs de kraakbeenderen. De diepe zitplaats
van de verstopping, en de noodige beweeging
der deelen maaken, dat fy zelden zonder ver-
ettering afloopt. Daarop volgen pypzweeren,
beenbedervingen, eene uitdryving van het
hoofd uit de holligheid, eene belette of pyne-
lyke beweeging van de dey, eene algemeene
uitteering, en de dood, of een ongeneeslyke
toestand.

Tot de uitwendige oorzaaken behooren, in
het byzonder, een zwaare val op de zyde van
de dey, zoo dat de *trochanter major* de geheele
drukking uitstaat, en dezelve mededeeld, zoo
de hals niet gebrooken is, tot binnen in het ge-
wrigt aan de banden en kraakbeenderen; waar

op

op vervolgens dezelfde toevallen volgen, als die zoo even hier boven opgenoemd zyn.

4.

*Eene pypzweer in het bovenste gewrigt van het
deybeen.*

Een jongen van veertien jaaren, uit West-Göthland, was in syne kindsche jaaren altyd ziekelyk, en volgens het berigt, met de jigt geplaagd geweest: eindelyk had zich eene diepe zwelling gezet in de linker dey, rondom en boven het gewrigt.

Na eenige vrugteloofse proeven was het gezwel tot verettering overgegaan, en gaf nu zederd drie jaaren veele dunne en geele etter. Veele opene en halfgeneeze pypzweeren wierden rondom het gewrigt gevonden, waar van de meesten tot in het gewrigt doordrongen.

In hoop van eene reeds geschiede afschilfering van het been te zullen ontdekken, of dezelve te kunnen bevorderen, wierd eene wyde opening gemaakt met het mes, de bereide spons, den gentiaan-wortel, volgens den loop van de pypzweer tusschen de *glutæi* naar beneden tot den *sinus magni trochanteris*, alwaar de hals bloot, en in het gewrigt eene opening gevonden wierd, welke onder het ronddraayen van de dey duidelyk met den voorsten vinger gevoeld wierd.



Het losgeworden stukje been wierd dikwils bewoogen, en hetzelfde scheide zich van den hals af. De wonde wierd in de diepte verbonden met *Tinct. Myrrhæ & Aloës ää. unc. j. Balf. Peruv. n. dr. j. mell. rosar. unc. ß.* en van boven droog. In neegen weeken wierd de wonde drie reizen op de genoemde wyze verwyderd, maar dezelve vulde zich schielyk; waarom ik ook, dewyl 'er geen ander middel was, om de afschilfering van het been te bevorderen, genoodzaakt was, alles aan den tyd en de natuur over te laten.

5.

Eene pypzweer aan de dey.

Een schoolbediende van *Arboga* was veele jaaren bedlegerig geweest, wegens eene pypzweer in de regter dey en knie.

Eene voorafgaande ontsteeking en veele verzeeringen, welke verwaarloost, of kwalyk behandeld waren, hadden den grond gelegd tot syne uitteering, welke hem met een' klaarblykelyken ondergang, en kort leeven dreigde, wanneer hy in 1753. in het Hospitaal kwam.

Een uitgeteerd lighaam, sleepende koorts, nagt-zweet, afkeer van spysen, dagelyks verlies van sappen door eene sterke ontlasting van
etter

etter uit de wonde, met een' byna ondragelyken ftank, gaven weinig of geene hoop tot fyne herftelling; de aangedaane knie was ten eenenmaale opgetrokken, en tegen den buik gebragt. Rondom de benedenfte helft van de dey waren meêr pypzweeren, dan men gemakkelyk konde tellen. Verfcheide hardheden van litteekens en *calli* hielden de *flexores* zoo terug en vaft, dat fy op geene wyze gehoorzaamden aan de *extensores*; deeze waren ook niet vry, maar door dezelfde oorzaak gefpannen, hoewel in een' minderen graad. De uitterlyke gedaante van het ongemak gaf aanleiding, om, onder het gebruik van andere middelen, na vereifch der zaaken, insgelyks te geeven zagte kwikmiddelen, en op deezen grond wierd de inwendige hulp begonnen met alle zorgvuldigheid door den Geneesheer van het Hospitaal, den Heer ELF, om dat wy te famen den zieken op-
paften.

De digtſte pypzweeren wierden door eene infnyding vereenigt; en die, welke verder van elkander waren, wierden in eene gemeene verettering en zuivering gehouden door fetons befmeerd met de *ſolut. ſulph. cum ol. lini*, wanneer fy kwamen digt aan de peefen of *art. crur.*, maar met *balf. arcæi, mell. roſar. inſpiſſ.* en *merc. præcip. rub.*, als de verhardingen en ſpekagtige plaatſen dit toelieten. Dus wierden 'er verſcheide fetons te gelyk gebruikt in den tyd van zeven of agt weeken, dwars door de

dey, onder het been, tusschen de peesen en slagaderen, als ook boven aan het deybeen tusschen den *musc. exter. rectus* en *cruræus*, om van andere aan de zyden niet te spreken.

'Er wierd geen teken van eene beenbeder-
ving gezien; na twaalf of veertien weken, be-
gon de uitwerking van deeze pynelyke en
moeyelyke geneezing, tot groote blyfchap, be-
terschap te belooven. De verhardingen waren
verfmolten, de peesen kenbaar, de wonden
zuiver, en de setons wierden wechgenomen;
maar de styfheid der peesen, door eene veel-
jarige onwerkzaamheid, wilde voor als nog
aan de knie geene volkome vryheid tot be-
weeging geeven. De wonden, welke meêr
met vleesch moesten opgevuld worden, wier-
den verbonden met *Bals. arcæi unc. iij. ung.*
neapolit. unc. j.; de overige, welke moesten ge-
flooten worden met *ung. diapomphol. unc. iij. a-*
lgam. merc. unc. ss. Sacchar. satur. dr. j. Het
geheele aangedaane deel wierd gewonden in
eenen doek, besmeerd met *ung. Altheæ lib. j.*
Neapolit. unc. j. ol. ceræ dr. ij., waar over ge-
legd wierden warme, weekmaakende, pappen
van havergort en weekmaakende kruiden,
hier door wierd den geheelen tyd eene gerin-
ge kwyling onderhouden.

Tegen de twintigste week was de knie zoo
ver uitgerekt, dat hy met den voet op den
grond kon raaken, en daar op staan. De druk-
kin-

kingen, welke vereischt wierden rondom de dey, om de pypzweeren te fluiten, na dat de fetons wechgenomen waren, hinderden niet weinig de uitrekking der peesen door de beweeging van de knie. Beide was dit onvermydelyk tot de geneezing, en moest bevorderd worden, hoewel het eene de werking van het andere verhinderde. Daarom verliepen 'er ook twee- en twintig weeken, eer hy geneezen was, doch toen reisde hy gezond en wel wech.





III.

Caries ossis femoris.

Eene bederving van het dey-been.

In het vyfde Artykel van de *Fist. inguin. compl.* pag. 259. is gesproken van eene affschilfering van het bovenste gedeelte van het dey-been, dit zoude met veele gelukkige affschilferingen alhier kunnen bevestigd worden; maar om de korthed zullen 'er alleenlyk aangehaald worden eenige der allerzwaarste, welke niet konden geholpen worden zonder het afzetten van de dey, en waar van de eerste waargenomen en aangetekend is door *Joh. Elias Sjöström*.

In het jaar 1755. in de maand October kwam eene meid uit het Distrikt van *Jönköping* in het Hospitaal, drie- en twintig jaaren oud, bleek, en uitgeteerd. Sy had een verzworen gezwel op de linker knie. By de eerste onderzoeking schein het, dat 'er weinig hoop was tot haare herstelling, dan alleen door de afzetting. Maar dewyl zulks niet eerder in het werk gesteld word, dan wanneer men ten vollen overtuigd is,

is, dat het ongemak ongeneeslyk is, wierden eerst alle mogelyke middelen daar tegen beproefd, doch vrugteloos. De knie werd gesmeerd met eene kwik-zalf (*axungiae porci defalita, ung. alth. rec. ää. unc. ijs. hydrargyri extinct. unc. ß. m. f. linimentum.*), om het gewel te verdeelen; sommige der veele pypzweeren, welke rondom de geheele knie tot in het gewrigt, en naar boven tot de dey gingen, wierden geopend. Groote stukken van het onderste gedeelte van het dey-been wierden daar uit genomen. De openingen wierden verwyderd gehouden door de spons.

Verscheide middelen wierden te vergeefs gebruikt om de pypzweer te zuiveren en op te droogen, als ook om het aangedaane been te doen afschilferen. De inwendige middelen waren insgelyks kragteloos. Eindelyk, na dat sy door de aanhoudende en rykelyke ontlasting van de etter uitgemergeld was, werd men moede om meer vrugteloofse proeven te neemen, sy liet zich overhaalen, om het aangedaane en ongeneeslyke deel wech te neemen, den negentienden November van hetzelfde jaar.

Het dey-been verdeeld in drie deelen was, tot het onderste derde deel, door de beenbederving ontaart, de spieren en het vet waren door de veele pypzweeren onder de veroudering van de kwaal, aangedaan, tot op de helft van het an-

dere derde deel; en daar wierd het dey-been wech genomen (*a*).

De operatie wierd verrigt door den Hooggeleerden Heere ACREL, volgens de manier van HEISTER (*b*), GARENGEOT (*c*) en SHARP (*d*), met twee insnydingen, of *à deux tems*, gelyk de Franschen zeggen. Eerst wierd de huid en het vet doorgesneeden, dezelve wierd twee overdwarsche vingers opgetrokken, vervolgens sneed men de spieren door, en, deeze anderhalven duim terug getrokken zynde, wierd het been afgezaagd zoo dicht aan het vleesch, als mogelyk was. Het bloed wierd gestempd door eyken-zwam (*e*), die veel nut deed, zoo dat de lydereffe by deeze zoo groote operatie geen twaalf oncen bloed verloor.

Het overige verband was na gewoonte, en buiten op wierd aangelegd om de eyken-zwam te ondersteunen, een sterk drukkend bandage (*f*),
van

(*a*) HEISTER meent in syne Heelkunde, dat, zoo deeze operatie hoog op verrigt word, dezelve zelden goed afloopt.

(*b*) In syne *Chirurgia* p. 443. 452. 1731.

(*c*) Abhandlung von denen operationib. Chir. part. 3.

(*d*) Traité des Operations de Chirurgie pag. 302.

(*e*) Deszelfs bereiding, nuttigheid, en gebruik is beschreeven in de Verhandelingen van de Koninglyke Sweedsche Academie der Weetenfchappen voor het jaar 1755.

(*f*) Dit is ook op de laatst aangehaalde plaats beschreeven.

van den Hooggel. Heer ACREL 't eerst daar toe gebruikt.

Dit bestaat uit eene styve en in eenen krultrek gebogen staale veder, hebbende neêrgedrukt eene middelyn van drie duimen, en opgereefsen de hoogte van vier duimen. Deeze word vastgemaakt tusschen twee plankjes, bekleed met linnen en wasdoek, en op den stomp gedrukt met eenen veelhoofdigen zwagtel, aangelegd als de *capelline*.

De aderlaating, dienstige middelen en dieet wierden nauwkeurig in acht genomen. De lydereffe wierd niet aangeroord voor den vierten twintigsten, wanneer het verband wierd wech genomen, zynde door de verettering wel los gemaakt. De binnenste wonde wierd van het begin tot het einde verbonden met droog plukfel, maar de kanten alleen bedekt met *bals. arcæi.* en *ung. bals. cit.* tot gelyke deelen op wieken gesmeerd, anders zoude de verettering al te sterk geworden zyn. Voor het overige wierd de lydereffe gevonden in eenen tamelyk goeden toestand.

De toevallen waren dragelyk, en de etterkoorts niet sterker, dan noodig was. Dus schikte zich alles na de omstandigheden wel, maar na eenige dagen wierd bemerkt, dat de spieren zich nog veel wech trokken, hoewel de operatie geschied was op de bovengemelde wy-

ze (g). Lange hegtpleisters wierden aangelegd, om dit te beletten, en dezelve neder te trekken, maar sy trokken alleen maar de huid neder, waarom de wonde wel geneezen wierd, maar het been op het einde, ter lengtte van drie overdwarsche vingers uit het vleesch stak. Om dit te doen affonderen, wierd langen tyd *aqua mercurialis* gebruikt, maar zonder nut.

Het moest van nieuws afgezaagd worden, maar, in verwagting van eene diepe affschilfering, wierd dit uitgesteld. Na verloop van zeven weeken geschiede de affschilfering, maar zoo gering, dat dezelve weinig maaken kon, om het einde van het been te verkorten, waar om 'er niets anders overig was, dan het afzaagen, gelyk geschiedde den agt- en twintigsten December. De eerste affschilfering en de tweede afzaaging hadden nu verminderd de nog overige uitpuilende helft van het tweede derde gedeelte van het dey-been, zoo dat het bovenste derde gedeelte van het dey-been nu nog overig was. Nauwelyks een vierden deel van de *trochanter major* tot het einde maakte deszelfs lengte uit.

By dit tweede afzaagen gaf eene kleine
slag-

(g) HEISTER zegt, dat hy dit zeer dikwils heeft zien geschieden, maar gelooft, dat de operatie daar aan schuld was, welke niet geschiede met twee sneede.

slagader bloed uit het merg zelve, en daar op wierd gelegd een zagt stukje eyken zwam, doch daar door wilde het bloeden niet stillen, en derhalven wierd 'er een ander opgelegd. Eindelyk scheen de bloedstorting optehouden, maar na zes uren begon dezelve op nieuw bloed te geven, omtrent een half pond. De knegt, die by haar de wagt had, nam het verband af, leide in de holligheid van het been fyn plukfel, wel bevogtigd met *spir. vini rectific.*, trapswyze plukfel en compressen daar over; waarna de bloedstorting ten eenenmaale ophield. De slagader had zich opgetrokken tot in de celletjes van het been, zoo dat de zwam niet kon raaken tegen den mond.

De affschilfering, welke gemeenelyk geschied, wierd hier lang te vergeefs gewagt, het litteeken kwam naderhand, maar zeer langzaam; waar toe haare ongezonde vogten veel toebagten, welke in den beginne met moeite van den stomp konden afgeleid worden, ofschoon de sterkste opdroogende en geneezende middelen gebruikt wierden.

Een langduurige loop, welke, onaangezien verscheide inwendige middelen gebruikt werden, dikwils wederkwam; eene ongemakkelyke ontlasting der stonden, te gelyk met de zwakke lighaams-gefteldheid, bragten ook veel toe tot de vertraaging van de geneezing. Eindelyk
ging



ging fy met behulp van een konstig been (b) uit het Hospitaal fris en gezond, den tweeden April van het volgende jaar.

De onderste en afgezaagde deelen van het dey-been waren aan alle kanten doorgegeeten tot in de binnenste holligheid, beide de *condyli* wech, en met weer omringt, het hoofd van het scheenbeen en de onderkant van den knieschyf waren niet vry van bederving.

Een volkomen gelyk geval is voorgekomen aan een' Franschen Heelmeeester VEYRET (i). Hy heeft de operatie verrigt op dezelfde wyze, als die in dit geval geschied is; het einde van het been is ook eenigen tyd blyven uitsteeken door de optrekking der spieren, 't welk hy daarna op nieuw genoodzaakt was, af te zaagen. Het ongemak is verder geneezen, en ook zonder afschilfering van het been.

(b) Dit is beschreeven in *Act. Edimb. Vol. IV. Tab. 3. fig. 3.*

(i) *Mem. de L'Acad. R. de Chir. Tom. V. p. 239.*



I V.

Caries articuli ossis femoris & tibiæ.

Eene beenbederving in het gewrigt van de knie.

Van Pieter Löve.

Een Candidaat in de Philosophie, negen- en twintig jaaren oud, gebooren in *Norrland*, kwam uit *Upsala* in 1755, om op aanraaden van den Heere Ridder en Lyf-artz *Rosén* hulp te zoeken in het Hospitaal tegen een zwaar ongemak in syn regter knie.

In de maand February 1742. had hy, toen vyftien jaaren oud zynde, de ziekte onder eene fterke koude gekreegen met zwaare pyn digt by het hoofd van het fcheenbeen; na dat dezelve van 's morgens ten vyf uuren tot 's namiddags ten drie uuren met eene vermeerderende koorts toegenomen had, vertoonde zich eindelyk eene roodheid op de genoemde plaats in de uitwendige bekleetselen, waar door de lyder genoodzaakt wierd het bed te houden.

De pyn openbaarde zich nog wel agt dagen,

en

en nam vervolgens op eens zoo sterk toe, dat eene zwaare ontsteeking zoo boven als onder het gewrigt, met eene verdubbelde koorts en ondragelyk ongemak, daar door veroorzaakt wierd. Eindelyk vertoonde zich voor op het hoofd van het scheenbeen eene verzwearing, die egter schielyk geneezen wierd. Kort daarna braaken veele pypzweeren open, zoo wel rondom het onderste gedeelte van de dey, als ook voor op de huid van het scheenbeen, waar uit veele kleine schilfers te voorschyn kwamen: deeze openingen wierden geneezen, braken wederom open, en wierden met nieuwe vermeerderd, den geheelen tyd door.

Na verloop van een jaar kwam 'er uit een beenschilfer, drie overdwarsche duimen lang, van het hoofd van het scheen-been, waar na de lyder verligting kreeg, en wederom begon te gaan, hoewel in den beginne niet zonder pyn. Van het jaar 1743. was hy somtyds een half jaar van pyn bevryd, en alle openingen gingen toe, tot het jaar 1749, wanneer zich wederom eene zwaare pyn openbaarde, die drie maanden duurde, tot dat eindelyk voor by den rand van het scheenbeen, en naar boven by den *condylus exterior femoris* nieuwe pypzweeren zich openden, waar van de eerste geneezen wierden. Eene wierd door de konst open gehouden, als een fontanel, van 1749. tot 1755, wanneer de pyn wederom zeer zwaar toenam,
en

en hem noodzaakte het bed te zoeken. In het begin van July brak 'er wederom eene pypzweer open, welke hy met zich bragt in het Hospitaal, nog ongeneezen.

Het voorgaande verhaal der ziekte toont, dat het ongemak was een wind-doorn (*pædarthrocace vel spin. ventosa*), welke ongetwyfelt synen oorsprong nam van de scheurbuik. By syne aankomst in het Hospitaal was de geheele knie hard en opgezet, de einden van het been, welke het gewrigt maaken, eens zoo dik, dan natuurlyk is; de knie-schyf was alleen gezond, maar onbeweegelyk; de knie stond half gebogen. Voor op het hoofd van het scheenbeen waren verscheide pypzweeren, deels afgezonderd, deels tot een geloopen. Een derzelven ging overdwars tot in het been ter diepte van eenen overdwarschen duim, naar boven aan de regter zyde van de *spina tibiæ*. De sonde wierd vier overdwarsche vingeren diep daar in gebragt.

Dewyl nu eene voortgelyke been-bederving niet zonder eene aamerkelyke afschilfering van het been kon geneezen worden; en deeze op een zoo sponsagtig deel bezwaarlyk kon worden gewagt, wierd den lyder voorgesteld de noodzakelykheid van de afzetting, maar hy weigerde dezelve te ondergaan, en wilde liever alle andere proeven doorstaan.

Het been werd derhalven bloot gemaakt van de *aponeurosis*, die hetzelfde bekleed, tot de breedte van een gulden, rondom de opening in het hoofd van het scheenbeen. De perforatiftrepaan werd beproefd, maar dewyl het been zeer sponfieus was, gebruikte men liever *cauteria actualia*, welke verscheide reizen aangelegd wierden zoo in de opening van het been, zoo diep men kon, als ook op het uitwendige been.

Allerhande inwendige middelen, naar maate van de omftandigheden, wierden geftaadig gebruikt, want, behalven de zwaare pyn, kreeg hy dikwils koorts door de opflorping der kwaade ftoffe in het bloed, fomtyds bloedde hy uit den neus wegens de verdunning van het bloed, veroorzaakt door eene zoo langduurige ziekte en ftilte van het lighaam. Geene affchilfering van het been volgde daar op.

In de meêrgemelde opening van het been werd duidelyk eene fterke klopping gezien, volkomen overeenkomende met die der flagaderen; deeze dreef de etter naar vooren uit de *incisura poplitea*, en werd veroorzaakt door de beweeging van de *arteria poplitea*, die juist daar agter liep, of mogelyk in de verzamelplaats van de etter.

Na dat de lyder genoegzaam ondervonden had de onmogelykheid, om op eenige andere

wy-

wyze geholpen te worden, dan in den beginne voorgesteld was, en hy intusschen gezien had, dat andere, laater in het Hospitaal gekomen, gezond daar uit gingen met een konstig been, besloot hy, ook de operatie te ondergaan, en dezelve wierd in tegenwoordigheid en onder het bestier van den Hooggel. Heer ACREL, den tweeden November, verrigt.

De Operatie geschiede, naar gewoonte, eene handbreed boven de knie, na dat het Tourniquet was aangelegd, eerst met eene sneede door de bekleetselen, en vervolgens met eene tweede door alle de spieren en het been-vlies, waar op het been afgezaagd wierd. De Hoogleeraar stuitte zelfs het bloed met den Eyken-zwam; maar de wytte van de dey-flag-ader was aanzienelyk, en dreef de zwam wech, schoon dezelve zeer nauwkeurig aangelegd was. Derhalven wierd dezelve met de naalde en draad onderschept en toegebonden. Het overige verband was het gewoone, dat tot meerder zekerheid aangelegd wierd; want het maakt gelyker drukking en doet meer nut, dan de drukking van de hand volgens het gewoone gebruik.

De ongemakken van den lyder, welke hem voor de Operatie nooit rust gelaaten hadden, waren nu verdweenen. De verettering en geneezing schikte zich naar wensch; doch het gebeurde, dat de dey-flag-ader in den tyd van

agt weeken, en drie na dat de draad was afgevallen, met den mond door los vleesch bedekt wierd, wordende aan den buitensten kant van den stomp door eene zwaare klopping bemerkt.

Eene nieuwe en diepere ligatuur had wel het einde voor eene nieuwe bloedstorting kunnen bewaaren, maar het voorbeeld van andere, en de kragteloosheid van den lyder liet niet meêr steekingen en prikkelingen toe. Trapswyze compressen met een neêrdrukkend verband noodzaakten de slagader, om zich hooger op te trekken, en met een roef bedekt te worden.

Zoo dra men zag, dat de afschilfering onvoldoende was, wierd het bloote stuk van het been voor de tweede reise afgezaagt, digt by het vleesch, zonder moeite of daar op volgende bloedstorting. Hier had nauwelyks eene andere afzaaging noodig geweest, zoo de styfte van de slagader, en de vrees van eene openbreeking niet vereischt had eene zoo langduurige drukking, waar door het been meêr en meêr bloot wierd.

Zestien weeken na de eerste operatie ging hy met een gemakkelyk en ten eenenmaale na een laars gelykend been en voet, met eene kous en schoen daar over, uit het Hospitaal en reisde naar huis.

Het afgezaagde dey-been was aan den voorkant overal met bederving aangedaan; eene ronde opening, even als of dezelve geboord was, ging schuinsch door den *condylus externus* van vooren naar agteren en van onderen naar boven. De *Cartilagines interarticulares* en de *ligamenta cruciata* waren verteert en ontbonden. De overige kraakbeenderen, banden en peesen, tot het gewricht behoorende, waren met het weer als omwonden.





V.

Caries tibiae Scorbutica.

*Eene bederving van het scheenbeen, door de Scheur-
buik ontstaan.*

Een elendige, vreemde, Laaken-weevers-
knecht, twee- en twintig jaaren oud, kwam
met het begin van het jaar 1756. in het Hospi-
taal. Eene langduurige scheurbuik, onderhou-
den door eene arme, elendige, levenswyze,
had reeds de meeste lichaamskrachten verteert, en
syn leeven lang opgeëischt.

Een opengebrooken wind-doorn in het boven-
ste gedeelte van het regter scheenbeen, welke
byna onophoudelyk bloedde, en de omleggen-
de doeken met een dun en groen water bevog-
tigde, verminderde dagelyks de nog overige
krachten. Behalven het wechneemen van het
been boven de knie, wierd 'er geene hulp ter
geneezing gevonden. Dit was ook zeer onzeker
en gevaarlyk, uit hoofde van de klaarblykelyke
ontbinding van het bloed.

Syn eigen aanhouden en dat van syne vrien-
den wilde egter, onaangezien al 't geen daar
tegen gezegd kon worden, den laatsten proef

in het werk gesteld hebben. Het dey-been werd wechgenomen eene hand breed boven de knie: op de slagader en wonden wierden gelegd de eyken-zwam, plukfel, compressen, en het boven beschreeven werktuig, en verder het gewoone verband.

Nauwelyks was dit volbragt, of het geheele verband was met bloed doortrokken; het werd derhalven schielyk wechgenomen, en de slagader onderschept, waar op de bloedstorting ophield. Een nieuw verband werd daar over gelegd; agttien uren na de operatie begon het bloed zich wederom te vertoonen, zynde binnen twee uren wederom door de drukdoeken en zwagtelen heên gedrongen.

Het verband werd wechgenomen: by het los maaken van het Tourniquet bleek het, dat de slagader te rug getrokken was, en bloedde uit eene diepte, als het voorste lid van den vinger. Deeze diepte werd verwyderd, de slagader op nieuw onderschept, de eerste draaden wechgenomen, en het bloeden hield op, schoon het tourniquet was los gemaakt: een voortgelyk verband en drukking werd wederom aangelegd, gelyk de eerste en tweede reis.

De geheele volgende dag ging voorby, zonder dat zich bloed vertoonde, of het verband aangeraakt werd, maar, op de helft van den derden, kwam hetzelfde wederom te voorschyn zonder eene bekende oorzaak. De heelmeeſter,

die de wagt had, nam het verband af, en maakte eene meêr diepe onderschepping, waar na de bloedstorting ophield tot den vierden dag. Op het einde van deezen dag, 's namiddags ten vier uuren, den gewoonen tyd, wanneer alle zieken in het Hospitaal verbonden worden, vondt ik by myne komst, dat het bloed wederom door het verband gedrongen was.

De wonde wierd bloot gemaakt, en, gelyk ik duidelyk zag, dat de slagader zich, door de sterke te rug trekking van het vleesch, afgescheiden had, en uit den draad gegaan was, wilde ik voor de laatste reis alle mogelyke proeven doen, om dezelve nog zekerder toe te binden. De uitwendige bekleetselen en de spieren wierden van ondere naar boven opengemaakt langs den loop van de slagader, die eindelyk wierd bloot gemaakt, en meêr dan eene hand breed hooger, dan het einde van den stomp, gezien wierd; de draad was mede gevolgd, en los gegaan.

Nu onderschepte ik de slagader eenen goeden duim breed boven derzelver mond, geheel alleen. De bloedstorting uit de slagader hield op, maar het vleesch zelve bloedde, en bevochtigde het verband gestaadig met bruin bloederig water. Hy leefde tot op het einde van den zesden dag, wanneer de slagader met de laatste ligatuur gevonden wierd ruim $\frac{2}{3}$ deelen op eene ongemeene wyze opgekrompen; eene hand breed na haar begin onder den band van *Fallopianus*.



gedaane plaats, het zy met het mes, het zy met brandmiddelen. 4. Zoo het been los en week gevonden wierd, is hetzelve in den beginne verbonden met gelyke deelen van de *Essentia succini* en *Tinct. myrrhæ*, waar by vervolgens na vereisch der omstandigheden gedaan wierd *Bals. Peruv.* of *Mell. Rosar.* Het been hard en aangedaan bevonden zynde, heb ik aanstonds, na dat het bloot gemaakt was, de perforatif-trepaan gebruikt, of in nood een scherp graveer-zyser, zoo dicht als ik kon op de aangedaane plaats. 5. Digt by de gewrigten, alwaar de beenderen meer los en hol zyn, hebben deeze middelen zelden gelukt, ten zy de kragten van het ligchaam te vooren de afschilfering verrigt hadden, wanneer dezelve ook gemakkelyk is onderhouden. Zoo de middelen tot de afschilfering mislukten, is de afzetting verrigt, met toestemming van den lyder, maar nooit zonder de zelve.

I.

Een jonge Boeren-knecht uit *Westmanland*, kwam in het Hospitaal in 1745. met een zweer voor op het regter scheen-been. Eene verzuimde kneusing had na eene voorafgaande verettering en verteering van het beenvlies den grond daar toe gelegd. De zweer was zoo groot, als een Ryks-daaler, hoog, bloedende, en dezelve liet de sonde vry tot op het been doorgaan.

Het

Het been was even ver bloot, en werd door de stoffe veranderd gevonden, bruin geel van kleur, stinkende en ongelyk. Den volgenden dag werd de geheele plaats met de trepaan doorboord, digt en overal, en verbonden met plukfel, waar op de bovengenoemde *Tinct. balsamica* gedaan wierd. De kanten wierden bedekt met droog plukfel.

In de derde week na de Operatie wierd het geheele stuk los, gelyk de grond van een kleine vergiettest, of een doorboorde mossel-schulp; het frissche vleesch, welk uit het onderste van het been opkwam in de gemaakte holte, ligte dit stuk met gemak op, en leide den grond tot eene bestendige geneezing, welke in de agtste week was volbragt.

2.

De Koetsier van een' Heer, hier in de Stad, welke door het paard met een' ysnagel geslaagen was midden op den binnenkant van het scheenbeen, zoo diep, dat het einde van den vinger daar in kon gestookt worden, kwam den vierden dag, na dat hy het ongemak gekreegen had, in het Hospitaal. Dezelfde handelwyze wierd in acht genomen, het been wierd rondom de opening bloot gemaakt, en doorboord in den omtrek, gelyk ook op eene plaats in de midden. Na veertien dagen was een gedeelte van de holligheid los gegaan en wierd wechgenomen.

In

In de zeventiende week was het geheele ongemak volkomen geneezen.

3.

Een knecht uit *Ekholmsund* had voor eenige maanden syn linker been gestooten tegen den punt van een ploeg-zyser; de wonde was met pis afgewasschen, en bedekt met een Tabaks-blad, waar op grove kousen om het been gedaan waren. In 1755. kwam hy in het Hospitaal. De wonde bloedde by de minste aanraaking, en gaf eene stinkende, dunne, stofte. De omtrek was sterk ontstooten, en het been daar onder opgezet.

Na voorafgaande ontlastingen, werd het been bloot gemaakt, welk bloedde uit alle *pori* of verwyderde buisen tusschen de opgezette laagten. Het teken van den eersten stoot tegen de ploeg was niet meer te zien.

Het bloote been werd verbonden met droog plukfel. Na agt- en veertig uren werd dit afgenomen, met oogmerk, om hetzelve te doorbooren met de trepaan, maar elke doorbooring gaf bloed gelyk eene kleine aderlating: zoo dat ik daar mede moest ophouden. Het been werd verbonden met plukfel en de *Tinct. Balsamica*.

Na agt- en veertig uren werd het verband
op.

opgenomen, en het been overal ſterk gebrand, niet zonder veel pyn, en doorſypering van bloed. Het verband daarop was droog, maar de volgende dagen wierd het plukfel bevochtigd met de *Tinct. Balfamica*.

Het duurde tot in de tiende week, eer dat de afſchilfering overal volbragt was, en dezelve geſchiede by ſtukken. In de veertiende week was hy geneezen, en verliet het Hospitaal.

Behalven deeze beenbedervingen zyn, gelyk gezegd is, ſommige gelukkig geneezen, andere hebben niet willen ondergaan de noodige operatien, maar zyn onvergenoegd wechgeryst, zoo over zich zelve, als over het Hospitaal. Andere wederom zyn vergenoegd geweest, hebben alle proeven doorgeſtaan, maar niet konnen geholpen worden.

4.

Een ziekelyk timmerman van 42 jaaren, van de ſcheeps-timmerwerf, *terra nova*, hier in de ſtad, kwam in 1754. in het Hospitaal, om geneezen te worden van een verouderd ongemak aan het linker been, welk hy met geduld en onagtzaamheid droeg, tot dat eene ſterke verrotting in het bloed en klaarblykelyke ſcheurbuik het been onbruikbaar maakte: eene geſtaadige, doch tegen den nagt verheffende, koorts, een afmattend zweet na middernagt, bloe-

bloedend en stinkend tandvleesch, groote blauwe vlakken op het gezonde been, ondragelyke pyn in het zieke, verlooren trek tot eeten, en meêr andere toevallen toonden, dat de vogten in den hoogsten graad bedorven waren, en voorfelden den slegtsten uitgang, welke men hier moest voorkomen.

De zuuren uit het Ryk der planten en delfstoffen, versterkende middelen, gelyk de koortsbast, eene *diæta antalkalina* & *antiscorbutica* wierden met zorgvuldigheid na vereisch der omstandigheden gebruikt. Goede wyn van Portugal, met den *spir. C. C.*, werd gegeven ter versterking, uit hoofde van de goede uitwerking, welke dezelve heeft tegen de scheurbuik op zee; eindelyk werd een halve stoop koe-melk 'smorgens en 'savonds gedronken, eene geheele maand, tot dat eene *lienteria colliquativa* een einde van fyne elende maakte.

Alle proeven waren dus vrugteloos afgelopen in agt-tien weeken, om het geweld van de scheurbuik wech te neemen, of tegen te staan. De uitwendige geneezing viel niet beeter uit. Het linker of aangedaane been was omringt van verscheide groote, onzuivere, stinkende, en bloedende, zweeren, welke zonder zwaare bloeding gemakkelyk toelieten de sonde tot het ongelyke en scherpe scheen en kuit-been. De kleine wierden afgewasschen met gelyke deelen *succus citri* en *muria limonum*, als ook verbonden

den met *ung. basil. n. unc. iv.* en *Felicitis Wurtz. unc. j.*, welk de verettering wel verwekte, maar niet inftaat was dezelve te onderhouden. Door de grootfte zweer wierd het been ter lengtte en breedte van drie overdwarfche vingers blootgemaakt.

De beenlagen waren van een gefcheiden, bros, en het been bloedde, als eene verfche vleefch-wonde. De doorbooringen konden niet gefchieden uit hoofde van de bloeding; het branden rigte niets uit, noch om het been te droogen, noch om eenige andere affchilfering te weeg te brengen, dan die gemakkelyk gefchiede; want men kon de fchilfers opligten en wechneemen, even als aan een *amianthus* (*Amianthus fibris mollioribus parallelis, facile separabilibus. Wall. min. p. 140.*) Ik liet deeze wonde zich vullen met foortgelyk vleefch, als te vooren, en maakte eene nieuwe opening op eene andere plaats, maar de vaftheid van het been was overal verlooren, en geene andere raad overig, dan geduldig de verloffing van den lyder af te wagten.

Het aantal van zulke beenbedervingen, welke de afzetting van het geheele deel vereifchten, en van het begin van het Hospitaal met of zonder vrugt verrigt zyn, zoude te groot zyn, om hier in te laffen. Il zal alleenlyk met weinige woorden befchryven eenige derzelven van onderfcheide foorten en ongelyke uitkomst.

Een

5.

Een jonge Boeren-knegt, uit *Wikbolandet* in Ooft-Gothland, wierd in 1754. in het Hospitaal gebragt. Na eene heete ziekte, welke hy voor vier jaaren had uitgestaan, was syn regter been begonnen te zwellen, pynelyk te worden, te verzweeeren, en een stukje van het been was 'er uitgevallen, en van dien tyd had hy zich in het bed gehouden, in andere opzigten gezond, behalven het ongemak aan het been.

Nu was hy geheel en al uitgemergeld, maar vry van koorts: het been zwol alleenlyk rondom het ongemak, en wierd door het opgroeiende weer zoo hoog als een uitwas, midden op den binnenkant van het scheen-been. Door deeze kon de sonde gebragt worden tot in de holligheid van het been, gelyk als in een vogelnesje. De afzetting geschiede, en liep af met het gewenschte gevolg, zoo dat de affschilfering, en geneezing volbragt waren op het einde van de negende week, wanneer hy naar huis reisde.

6.

Eene Meid van zes- en twintig jaaren, uit *Roslagen* en *Skärgorden*, wierd in 1755. gelegd voor het Hospitaal, zonder behoorlyke attestatie. Uit barmhertigheid wierd sy in het Hospitaal genomen. Aan den buitenkant

kant van het regter-been was het kuit-been voor de helft bloot, en reeds los. Eene sponsagtige, onzuivere, zuurriekende, en met oneindig veele wormen gevulde, zweer wierd langs hetzelfde gevonden.

De wormen wierden aanstonds gedood met een afkookfel van de tabak en alsom in wyn. Het losse been wierd zonder ongemak wechgenomen. De wonde wierd vervolgens behandeld met zuiverende en heelende middelen in een zekere hoop, dat de geneezing schieelyk zoude volbragt worden. Dezelve sloot zich zeer langzaam, en na verloop van vier maanden op eene plek na, ter grootte van een gulden, maar toen wierd sy zeer ziek aan eene aanhoudende koorts, met ylhoofdigheid, die tien of twaalf dagen duurde. Aderlatingen, salpeter, kampher, amandelmelken, clysteeren, en meer andere middelen, welke de toevallen vereifchten, wierden gebruikt na de zwaarte der ziekte.

De koorts ophoudende, opende zich de zweer, en wierd binnen agt dagen, byna even groot, als in den beginne. Met dit alles was sy dik en vet, niet gezwollen, maar, gelyk men zegt, van eene goede gedaante; doch al te eenvoudig, zoo dat het onmogelyk was door vraagen den oorspong van het ongemak te ontdekken, en nauwelyks haare woonplaats, zoo de tongval haar niet verraaden had.

Het afgeschilferde kuit-been was vernieuwt. Door de zweer kon geene beenbederving of bloot been ontdekt worden aan den buitenkant van het scheen-been. De aanhoudende ontlasting der vogten, gewoon by langduurige zweeren, kon de geneezing tegenstaan. Tien weeken verliepen 'er nog onder allerhande proeven tot de geneezing, maar te vergeefs.

Na een geduld van zeven maanden moest de afzetting plaats hebben, en werd onder de knie op de gewoone wyze verrigt (*). De halve ge-

(*) Om de bloedstorting te stillen, wierd eerst de eiken-zwam gebruikt, door het gewoone verband en het drukkende werktuig ondersteund; maar de *arteria tibialis postica* brak na verloop van een uur op, en de bloedstorting kon, schoon men zulks met nieuwe stukken van de zwam zocht te doen, niet gestild worden, voor dat men de slagader toebond.

Na veele en herhaalde proeven met deeze zwam by afzettingen, of anders geopende slagaderen, meen ik met zekerheid de volgende onderregtingen te kunnen geeven. 1. Dat de zwam geene byzondere bloedstempende of samentrekkende kragt heeft, boven de spons, of andere, op dezelfde wys, bereide zwam van essen-, berken, of beuken-boomen. 2. Dat dezelve van een los en zagt weefsel moet zyn, zoo het bloed daar mede zal gestuit worden. 3. Dat dezelve by de aanlegging onmiddelyk moet drukken tegen den mond van de open slagader en derzelver vliessen, waar by het bloed ook onder het toedraajen van het tourniquet, en voor dat de zwam aangelegd word, zeer wel moet worden afgedroogd. Een stuk is dan toerykende, om zich, even als vloey-papier, lintel, of fyn plukfel, tegen de opening vast te maaken,

geneezing en affchilfering van het been ging goed voort, maar het overige zeer traag, zoo dat op het einde van de vierde maand na de operatie nog een ftuk, als een Ryksdaaler, zonder roof was, en niet wilde toegaan. Sy kreeg een houte been, en reisde wech.

Het afgezaagde fcheen-been was aan den buitenkant van het kuit-been een weinig carieus: het overgebleeven ftuk van het kuit-been was naar den kant van het fcheen-been meêr los en poreus, dan het zyn moest, en aan den bui-

de flagader te fluiten, en aan het bloed tyd te geeven, om eenen prop in het einde te maaken, en eenen anderen weg op zyde te zoeken. Dus regten de buitenfte ftukken zwam, welke over de binnenfte gelegd worden, niet meêr uit, dan andere drukdoeken, en de groote overvloed van loffe ftukken, en poeder van zwam, door den Hr. BROSSARD voorgesteld, niet meêr, dan het gewoone plukfel. 4. Is de zwam een goed bloedstempend middel by de flagaderen in het gemeen, vooral als fy kunnen gedrukt worden tegen een onderlegend been, gelyk de *temporalis*, *occipitalis*, *maxillaris externa*, *angularis oculi*, als ook de *radialis*, *cubitea* na het afzetten van de hand, in opene flagader-breuken, en foortgelyke gevallen, wanneer het verband aangelegd is, en behoorlyk ondersteund word; gelyk de Hr. MORAND *Mem. de L'Acad. R. de Chir. Tom. 5. pag. 167.* met verfcheide voorbeelden bewyft; insgelyks als de lyder zwak is, en niet zeer bloedryk, wanneer het my zelfs gelukt is, daar mede de dey-flagader te bedwingen na de afzetting, eene hand breed boven de knie, gelyk pag. 426. gezegd is. 5. Het gebruik daar van is ontegenzeggelyk veel gemakkefiker, dan de ligatuur, en even zeker, als de zes eerfte dagen voorby zyn. Maar, 6. is de zwam onvol-

buitenkant versterkt door het aangegroeide weer.

De meid heeft vervolgens alle zomers het Hospitaal bezocht, is anders zeer gezond, maar heeft in den stomp eene open zweer, waar in een kleine vuist kan gelegd worden, welke nog vogt geeft. Een fontanel op den arm kon niet helpen, om de quantiteit van het vogt, welk naar dit deel loopt, af te leiden.

7.

Eene dienstmeid van vier- en twintig jaar',
alhier

doende by de opening van groote slagaderen, als de lyder bloedryk is, en zeer gezond, gelyk na ontvangene wonden, en daar op volgende afzettingen: als de slagader voor de helft geopend en onder de huid verborgen is; als dezelve styf en kraak-beenig is, en zich niet langzamerhand famentrekt. Zie pag. 436. Als de slagader zeer hoog is opgetrokken, zoo dat noch de zwam noch de drukking, de mond kan naderen, dan stort zich het bloed in den stomp uit, en dringt overal door het losse vleesch heen, 't geen zoo veel te eerder geschied, wanneer het vleesch door de scheurbuik los en week is. Zie pag. 440. Doch ik zie, dat de Hr. WARNER in syne aanmerkingen over de zwam juist in dit geval dezelve aanprijft, waar tegen ik na eene veelvuldige ondervinding dezelve het minst voordeelig zoude kunnen houden, liever mynen toevlugt neemende tot *acetum destillatum*, *spir. vin rectificatissimus*, *ol. therebinthinae fervens*. Eindelyk kan de *Agaricus* het bloed ook niet stempen, als 'er geen tegenstand voor de drukking is; gelyk aan den hals, buik, en in den bilnaad, wanneer de bereide spons 't beste nut doet. Zie pag. 146. 147.

hier in Stockholm woonende, kwam in 1756. in het Hospitaal, met het regter been gefphaceleerd tot twee derde deelen van de kuit: voor tien weeken had fy eene heete ziekte gehad, welke, na verloop van veertien dagen, in korten tyd dit geheele deel deed verfterven.

Het been was droog, zwart als roet, en zonder merkelyke ftank; hetzelve had zich reeds beginnen aftefcheiden van het gezonde, door de uitwendige bekleetselen tot op de fpieren, eene goede handbreed beneden de *spina tibiæ*. Sy was wel zonder koorts, maar zeer zwak, en ligt-geel. Men gaf verfterkende middelen met wyn en goede voedfels. Het deel moest afgezet worden; fy was daar mede te vreedden, en onderging de operatie vrymoedig. De flagaderen wierden uit geruftheid onderschept, en daar door ging weinig bloed verlooren. In de eerfte vier- en twintig uren klaagde fy niet, en was ook niet pynelyk, wanneer ik het verband bezag, en de dey reeds tot in de liefch koud, paerfch vondt, en hier en daar eenige *phlyctenæ saniofæ* ondeckte. De pols was klein, ongelyk, en waggelende. Tot hartfterking wierden Rhynfche wyn, ingemaakte citroen- en oranje-fchillen met de *confect. Alkerm.*, by lepels dikwils gegeeven. Sy ftierf voor den midder-nagt, of zes- en dertig uren na de operatie.

Uit dit voorbeeld heb ik beflooten, dat men in zulke gevallen niet moet tot de operatie



overgaan, dan wanneer het doode zich van het gezonde afgescheiden heeft, tot op het been. De vogten, die te vooren door de kwaade stoffe, welke reeds een been heeft doen sterfen, aangedaan zyn, krygen intusschen vryheid, om zich door eene sterke verettering en ontlasting, terwyl de afscheiding geschied, te zuiveren, waar by de koorts-baast en goed voedsel niet weinig uitregten. Hier in wierd gevolgt de manier, op welke de natuur zelve te werk gaat, by voorkomende versterking van verkoudingen, verbrandingen, kneusingen, ja rotkoortsen, die zich tot een deel bepaalen, 't geen door het volgende geval meêr opgehelderd word.

8.

Een Boer uit *Södermanland*, omtrent dertig jaaren oud, kreeg in den zomer van 1755. eene *febris synocha putrida*, op het land regeerende, en was daarna zes weeken ziek: op het einde daarvan, en wanneer de beterschap bemerkt wierd, kreeg hy een pynelyk ongemak in beide voeten en onder aan de beenen.

Dit nieuwe toeval wierd, even als de koorts, aan zich zelve en de natuur overgelaaten, en niet behandeld: de voeten begonnen eerst rood te worden, een weinig te zwellen, en wierden kort daarna zwart, 't geen opklom tot aan het dikke van het been. Hier had de versterking
zich

zich bepaalt, en het gezonde scheidde zich van het doode af tot op het been. De verettering was ongetwyfeld zeer sterk geweest, dewyl al het vleesch en de huid verteert en afgevallen was, rondom den *tarsus*, en het onderste van het been, zoo dat de beenderen, de hiel uitgezonderd, bloot en droog lagen.

Het gezonde einde van de beenderen naar de kuitten was gezwollen, droog, en met korsten bedekt, door de werking van de uitwendige lucht, en de prikkeling der bedorve beenderen. In deezzen toestand kwam hy in het Hospitaal in den herfst van het zelfste jaar. Voor het overige scheen hy gezond te zyn, hy had kragten, om op te zitten, en te doen, al 't geen hem noodig was, na dat hy door de beenen syn leeven als gekogt had. Veele soortgelyke gevallen zyn bekend en aangetekend, en hier hoort ook het verhaal van den Heer VAN SWIETEN in *Com. ad Aph. H. Boerb. de Gangræna. Tom. I. pag. 748.*

Beide beenen moesten afgezet worden, en op dat hy in het vervolg regt op zoude kunnen gaan, en niet op de knien zou moeten kruipen, wierd beslooten het regter been wech te neemen onder de *spina tibiæ*, maar het linker boven de *caries* onder de kuit.

De gedagten was, dat hy met de regter knie gebogen zoude kunnen staan op een ge-

meen houte been, met een' yzeren punt daar aan, en met een holle houte stevel het linker gebruiken, terwyl hy, onder het gaan, de linker zyde met de kruk onder den arm zoude opligten. Beide afzettingen zouden geschieden met een lap om minder verettering te hebben, en het een na het ander, om de toevallen te verminderen.

Het regter been wierd 't eerst geopereerd den zeven- en twintigsten September. Het gewoone Tourniquet wierd aangelegd. Vervolgens wierd eene kruiswyze sneede gemaakt in twee tyden, even vyf duimen onder de *spina tibiæ*, daar na twee evenwydige insnydingen omtrent vier duim' hoger, langs de *crista post. & int. tibiæ* en *facies post. fibulæ*, eindigende in de ronde insnydingen. De bovenste lap wierd voorzigtig met het mes van het been afgescheiden, het benedenste deel van de *musc. Gastrocnemii* en *solæus* wierden met een twee-snydend mesje los gemaakt, en naar agteren gelegd. De pypen van het been wierden afgezaagt, twee vinger breette onder de *spina tibiæ*. De *arteria tib. post.* en *peronea* gaven bloed uit den ondersten lap, en wierden gemakkelyk ondersehept. De lappen wierden gelyk gemaakt, tot een gevoegd, en vereenigt met plukfel, hegtingen, compressen, en een verband, by de afzetting gewoon. Weinig koorts kwam daar by.

Op den zesden dag was het naaste verband los, beide kanten waren na wensch vereenigt. De ligatuur hong aan den binnen-kant. De ope wonde wierd in den beginne verbonden met *Bals. arcæi* en *ol. ceræ*, en vervolgens met *Bals. Fioraventi*, op plukfel gedroppeld. In de vierde week viel de ligatuur af; in de zesde waren de lappen los, ongevoelig, wel samen vereenigt, en de wonde geschikt, om door een litteeken bedekt te worden.

In het begin van de zevende week na de eerste operatie, den zeventienden ovember, wierd het linker been afgezet op de plaats, welke zoo even genoemd is, en met twee lappen. De slagaderen gaven weinig of in het geheel geen bloed, doch de aanmerkelykste wierd onderschept, welke de *tibialis postica* scheen te zyn. De lappen wierden vereenigt en verbonden na gewoonte. De etter-koorts was zeer zagt.

Veertien en meêr dagen verliepen, en ruim drie vierde deelen van het oogmerk waren bereikt, wanneer deeze zieke begon wonderlyk in het aangezicht uit te zien, gedurende twee of drie dagen, zoo dat ik hem, onschuldig, verdagt hield, brandewyn te hebben gedronken, maar vervolgens klaagde hy over zwaare tandpyn aan de linker zyde van de onderste kaak, zoo dat het oor en de kaak


daar by getrokken wierden, de pols hield den gelyken loop; een poeder van *Rad. Valer. sylv. scr. x. nitr. puriff. scr. iijß. salis succini scr. ß. M P. antispasm. D. A. & Eq. R. scr. j. Camphoræ gr. xv. in x. æq. p.* werd gegeven in eene verdoovende amandelmelk, alle vier uren; zakjes met verdeelende kruiden wierden ook gebruikt rondom de kaak, na dat dezelve eerst gesmeerd was met *ol. amygd. dulc. camphor.* Het lighaam werd opengehouden met clysteeren.


Maar onaangezien alle zorg en oplettendheid openbaarden zich dagelyks trekkingen, eerst in alle spieren van het aangezicht, tot beneden aan den hals, en vervolgens wierden deeze algemeen over het geheele lighaam. Daar by kwamen peeshuppelingen op alle plaatsen, en 't laaft ook in de stompen, welke hy niet kon bestieren of regt houden.

Deeze toevallen duurden tot den agt-tienden dag, en eindigden met den dood. Zoo nu deeze geopereerde alleen met stuipen was aangedaan geweest, had ik gegift, na eene meest waarschyndelyke oorzaak, uit de manier van opereeren afgeleid, eene drukking der zenuwen of peesen; maar, tot een blyk van het tegendeel, waren 'er drie op denzelfden tyd, en in hetzelfde vertrek, daar van aangedaan. De een had een' wind-doorn op het boven-

arm-

arm-been, gelyk boven gezegd is pag. 325. De andere was voor de helft geneezen van eene afzetting. Zouden de uitwaasselingen van de eerste ongemakken, welke eenen zoo ondragelyken stank hadden, niet konnen aandoen de andere zieken, en schielyk veroorzaken een zoo byzonder zenuwziek toeval, niet ongelyk aan dat, welk de Heer BERGIUS beschreeven heeft in een werkje over de heerschende ziekte in Sweeden 1754. October pag. 48. 49. seq.





V I I.

Caries ossium tarfi, metatarfi & phalangium digitorum pedis.

Eene bederving der beenderen, welke tot de hand, de voorhand, en de vingers behooren.

Meêr gevallen van deezen] aart zyn voorgekomen, dan dat ik het noodig vinde, dezelve alle aan te haalen. Meestendeels zyn sy een gevolg geweest van winterhanden. By het affschilferen van het been is niets byzonders voorgekomen, hoewel ik dikwils genoodzaakt was, de *ossa tarfi* van elkander te scheiden, en sommige wech te neemen. Na de geneezing hebben de lyders gegaan met schoenen, waar onder waren zoolen van hout, of blik.

Twee van de meest byzondere beenbedervingen volgen hier op.

I.

Caries calcanei sphacelosa.

Eene gesphaceleerde beenbederving van het hiel-been.

Een Artelerist van het Garnisoen in *Waxholm*, kwam

kwam in het Hospitaal in 1756. Men berigte van hem, dat hy veele jaaren eene zeldzaame geneigtheid tot verfterving had gehad, zoo dat, fchoon hy zeer matig leefde zonder misflagen te begaan, en ook niet wift van voorgaande ziekten, hy egter van tyd tot tyd in drie jaaren, verftorven plekken op fyn lighaam, maar vooral aan fyne hielen, had gehad.

De verfterving was begonnen met pyn, roodheid, gevoeloosheid, en eene zwartwording van de plaats tot op het been. Daar tegen waren van den Regiments-Heelmeester ROAN gebruikt *antifcorbutica* en *antifeptica*, en ook eenige maanden kina; maar vrugteloos (*).

Hy

(*) Ik heb niet gevonden, dat het gebruik van de kina zoo onfeilbaar is in het ftuiten van het heete en koude vuur, gelyk veele andere, vooral de Engelsche, Geneesheeren beweeren; ik geloof egter, dat dezelve in onderscheide foorten van het vuur, maar niet in alle, met het grootfte voordeel kan en moet gebruikt worden. Indien het heete of koude vuur haastig, en als eene *crisis*, komt na eene voorafgaande en verwaarloosde heete of rot-koorts, heeft het gebruik van de kina niet kunnen beletten, dat de aangedaane deelen verftorven zyn, vooral zoo de fcheurbuik, en andere fcherpten, een bederf der ingewanden, uitgestorte vogten tegenwoordig waren; maar verfcheide reifen heb ik gezien, dat, wanneer zoodanige koortfen in derzelver begin behoorlyk behandeld, en de vogten niet al te zeer tot verrotting geneigd waren, de koorts-baft, fchoon 'er reeds voorboden van het heete vuur waren, gebruikt in den tyd der *remiffie*, het gevaar in eene goede uitkomst veranderde. Ditzelfde ziet men gebeuren by kwaadaartige
pok-

Hy wierd nu in eenen tamelyk goeden staat en met eene goede kleur gevonden. Op de linker hiel was eene diepte, welke nu voor de derde reise verstorven en zwart was. De eerste reise was het koude vuur gekomen tot op het hiel-been, en had, by het afvallen van den roof, een stukje van het been met zich genomen,

pokjes, wanneer 'er zwarte of verstorve plekken opkomen tusschen de pokjes, die met geene goede etter gevuld zyn, en door het gebruik van den genoemden basts tot verettering worden gebragt; en een beter uitkomst hebben, dan de zickte, of aan zich zelve overgekaaten, of door de gewoone *antiseptica* behandeld, kon belooven. Alle Geneesheeren stemmen daar in overeen, dat de koorts-bast eene zekere nuttigheid heeft in zulk heet en koud vuur, waar by de koorts of ten eenenmaale ophoud, terwyl de kragten nog genoegzaam zyn, of by tusschenpoozingen wederkomt. In hoe verre de koorts-bast by inwendige ontsteekingen en het heete vuur, vooral in de darmen, bevryd voor eene versterking, volgens de opgaave van den Heere VAN SWIETEN *Comment. in Aph. Boerh.* §. 447. en 970. zullen geleerde geneeskundigen reeds opgemerkt hebben. Ik wil ook niet met den Hr. SHARP *Recherches sur l'état present de la chirurgie* p. 327. in een geschil treden ten opzichte van de werkingen, aan dit middel toegekend, maar verlang veel eer, dat een ander op veele zieken, die op denzelfden tyd aan het heet en koud vuur ziek leggen, beproeve, in welke soort, en in welken graad dezelve het meest of in het geheel niets uitregt; en wensch met den Heere WERLHOFF op op het einde van syne waarneemingen over de koortsen pag. 334, dat alle veragters van het gebruik van den koorts-bast ten minsten leeren zwygen, tot dat sy het veelvuldig gebruik van het misbruik behoorlyk hebben leeren onderscheiden.

men, waar op de geneezing was gevolgt. Deeze voortgaande, had het heete vuur en de verrotting zich vertoont op eene andere plaats, op de schouder en den rugge; maar als de verettering aan de hiel lang duurde, twee of drie maanden, was hy vervolgens drie of vier maanden vry geweest, wanneer het heete vuur op nieuw zich openbaarde, dan in de regter, dan in de linker hiel. Een fontanel op den arm wierd reeds in het tweede jaar zonder nut gedraagen.

Het zwarte stuk wierd nu wederom ter afzondering bevorderd met *Ung. de styrace unc. ij. ol. ceræ gtt. xx, Spir. sal. ammon. gtt. xij.*; zoo dra het uitviel en een stukje van het hielbeen met zich nam, wierd een rond brand-yzer op het been in de holligheid gezet. Dit wierd wederom door de verettering los gemaakt; alleen met den *bals. Fioraventi*. Eindelyk was de wonde geneezen na verloop van tien weeken.

Terwyl hy in het Hospitaal was, wierden in den beginne afkookfels van houten en middelen uit het spiesglas gebruikt, doch op het einde de *calomel* met den koorts-bast in geringe giften; welke de Hr. ROAN zeide, voorheen gegeven te hebben tot de kwyling toe. Hy reisde wech, maar, na dat hy vier maanden was gezond geweest, had het vuur zich, gelyk te vooren, in de regter hiel wederom geopenbaard.

2.

Een slagters-knecht, twee- en zestig jaaren oud, was ruim twintig jaaren geplaagd met de jigt, steentjes in de nieren, en het voeteuvel.

Elk een van deeze ongemakken had eenige tekenen van de schadelyke werkingen overgelaaten. Van de jigt, welke hy nu eenige jaaren gehad had, waren de vingers geboogen en onbeweeglyk, vergroeit, en met jigt-knobbels voorzien. Hy bewaarde een doos vol steentjes uit de nieren en gruis, welke hy van tyd tot tyd geloosd had. Deeze ongemakken hadden hem egter vryheid gelaaten; om dagelyks syn werk te verrigten.

Maar het derde, of voeteuvel, had zich vastgezet in den knobbel onder de linker groote teen, en het gewrigt, de *ossa sesamoidea*, het begin van het eerste beentje van de teen en het hoofd van het eerste *os metatarsi* met eene zwaare beenbederving aangedaan. De halve voet aan den binnen-kant was ligt rood, gezwollen en zoo hard, als een beenagtig uitwas. Uit de zweer liep een stinkend vogt.

De lyder had bestendig de koorts, zweette 's nagts sterk, en was zeer kragteloos. De koorts bepaalde zich egter wel haast aan eenen vasten tyd en wierd door den koorts-bast gestuit.

Een

Een ontbindende kruiden-wyn wierd met com-
pressen rondom den geheelen voet gelegd. De
koorts onderhield het gezwel in den voet, want
zoodra dezelve ophield, verminderde het ge-
zwel dagelyks. Om de beenbederving wech te
neemen, wierd het gewrigt aan den buitenkant
los gemaakt en een gloeyend yzer op hetzelfde
gezet; groote en kleine beenschilfers kwamen
daar na wel te voorschyn; maar deeze rotting
was niet gestuit, en daarom wierd de groote
teen in het eerste gewrigt wech genomen. Het
hoofd van het eerste *os metatarfi* wierd ook bloot
gemaakt, en afgezaagd met eene fyne zaag. Het
tweede *os metatarfi*, welk de volgende teen on-
dersteunde, was in de midden gecarieerd, en
moest afgezaagd en wechgenomen worden.

Hier mede scheen de naaste weg gevonden te
zyn, om de geheele been-bederving wech te
neemen, waar toe de gedaante van de zweer den
geheelen tyd ook goede hoop gaf. Maar dewyl
de lyder oud, kragteloos, was, moest de tyd af-
gewagt worden. Syn eige vrees voor eene
nieuwe operatie maakte, dat hy veertien dagen
lang verzwegg, de tusschenpoozende koorts we-
dergekreegen te hebben, dewyl de aanvallen
zich altyd 's nagts openbaarden; eindelyk wierd
dezelve ontdekt, en gestuit; maar enee nieuwe
verplaatsing van zieke stoffe had in deeze dagen
wederom het overgebleeve deel van het eerste
os metatarfi aangetast, hetzelfde wel haast doen
zwellen, en tot eene nieuwe bederving doen

overgaan , daar het in den beginne zeer wel uitzag.

Derhalven wierd, onder een geduurig gebruik van een afkookfel van den koorts-bast in water, het geheele been wechgenomen, en van het eerste *os cuneiforme* los gemaakt. Met de geneezing verliep nog eene maand, wanneer hy met een houte zool in de schoen uit het Hospitaal ging. Na dat deeze plaats geneezen was, heeft het gruis in de nieren hem wederom beginnen te plaagen, waar tegen hy met nut zeep-pillen gebruikte en gezond bleef.



biæ. De punten van het bovenſte waren door de huid gedrongen aan den binnenkant van de deſy door de *vaſtus internus*. Sy wierden beide op hunne plaats gebragt, en na gewoonte verbonden.

De uiteindens van het been, welke zoo puntig waren, als eene ſchryfpen, prikkelden de ſterke deſy-ſpieren tot eene dubbele ſamentrekking, en van daar was het, dat de einden niet op hunne plaats bleeven, maar wederom, door de trekking der ſpieren, kwamen tot de openingen, welke ſy zich in het begin met geweld gemaakt hadden. Op deeze aanhoudende prikkeling volgde eene ſterke koorts, ſtuiptrekkinge, ſlaapeloosheid, en zwaare pyn.

Door de behoorlyke legging van het deel, de oppaſſing, het wechneemen der toevallen door aderlatingen, amandelmelken, ſalpeter, en verdoovende middelen, wierd op de beſte wyze het noodige volbragt, maar zonder die nuttigheid, welke by beenbreuken anders daar mede verſchaft word.

Na eenige dagen ſtak het bovenſte gedeelte van het been twee overdwariſche vingers buiten de huid uit. De wonde wierd verwyderd, de geheele punt van het been afgezaagd met eene fyne zaag, en het been wederom gezet. Weinig verligting wierd daar mede te weeg gebragt, maar in tegendeel vermeerderde de zwelling
rond-

rondom, en eene zwaare roosagtige ontsteeking nam het geheele been in van de teenen tot de liefch, voorspellende eene gangreneuſe verettering in het vetvlies, by ſoortgelyke gevallen gewoon. Verdeelende ſtoovingen van *Herb. menthæ crispæ*, *meliffæ*, *cum ſummit. abſinthii*, *ſcordii*, *Fl. Chamomille r. Sambuci*, *ſem. cumini*, *ſarina filig.* in bier en azyn gekookt, wierden aangelegd, en alle zes uren veranderd. Binnen drie dagen vertoonden zich eerſt op het been, vervolgens boven de knie, agter en boven aan de dey, zwarte verſtorve plekken.

Deeze geopend zynde, liep 'er veel etter uit met ſtukken van het vetvlies. De zwelling in het been werd overwonnen door deeze openingen en gaf hoop tot beterſchap; maar wanneer ik inſgelyks onder aan de dey genoodzaakt was te maaken, eene genoegzaame ontlaſting voor de bloederige en ſtinkende etter, welke de *fascia lata* uitzette, en waar van dagelyks meêr, dan een ſtoop, ontlaſt werd, bemerkte ik niet alleen, dat het bovenſte gedeelte van het been, van het beenvlies en de ſpieren was los gegaan, maar vondt ook de benedenſte deelen op dezelfde wyze los, en kraakende, als of ſy ſtooten tegen een ander bloot been, of zelve geſpleeten waren.

Na dat drie weeken met veel moeite doorgebracht waren, kreeg ſy eenen uitteerenden loop, wierd ylhoofdig, en ſtierf.

Behalven de opgegeeven gevolgen der genoemde oorzaaken, zal, by deeze beenbreuk, het zwaarste daar in bestaan hebben, dat het onderste gedeelte van het dey-been gespleeten en in twee deelen verdeeld gevonden wierd, midden tusschen de *condyli*. De lengtte van dit stuk maakte uit een vierde gedeelte van een el. Deeze was de eerste gespleete breuk, welke ik van deeze soort zag, en ik twyfel, of dezelve wel op eenige andere wyze te helpen is, dan door de afzetting, als men by tyds derzelve tegenwoordigheid kan kennen.

2.

Fractura femoris obliqua.

Eene schuinsche breuk van het dey-been.

Een Kelder-knegt van twintig jaaren had het ongeluk, dat een wynvat rolde over de regter dey, en het been brak, schuinsch, even boven de knie. In den herfst van 1756. kwam hy in het Hospitaal. Het bovenste gedeelte, welk puntig en 't langst was, drong onder de huid door tusschen de *vastus externus*, gelyk met zoo niet voorby de *condylus exterior*. Het andere einde van het onderste deel, welk stomp gevoeld wierd, waggelde naar de zyden, maar niet zoo digt, dat men konde denken, dat hetzelfde de *vastus internus* doorboord had,

Het verband wierd op de gewoone wyze aangegeld. Behalven de trekkingen en flaapeloosheid openbaarden zich geene zwaare toevallen. De vereeniging der beenderen was byna onmogelyk te behouden, want behalven den sterken tegenstand der spieren, had het bovenste en puntigste stuk van het begin eenen anderen weg genomen, en was gedrongen door de *cruræus* en een gedeelte van den *vastus externus*, welke dus tusschen hetzelfde en het andere einde van het been waren. Dit veroorzaakte niet de eerste toevallen, maar leide den grond tot eene langzaame en moeyelyke geneezing. Want voor eerst, dewyl de einden van het been zoo ver van elkander, en door vleeschige deelen van een gescheiden waren, verliepen 'er wel veertien weeken, voor dat het weer, welk anders rykelyk tegenwoordig was, bemerkt wierd gekomen te zyn tot beide einden, en het been vast gemaakt te hebben; vervolgens wierden de spieren styf van het weer, dat tusschen dezelve was, zoo dat sy bezwaarlyk in beweeging konden gebragt worden.

De geneezing was in de agt-tiende week nog niet volkomen, want nauwelyks kon hy het been opligten met de dey en door hulp van de styve spieren; ook was het weer, welk de beide einden vereenigde, niet sterk genoeg, om de zwaarte van het lighaam in eene loodregte lyn te draagen, waar van daan het ook gebeurde, dat het by eene proef, om schielyk te gaan, af-

brak. Het weer zette zich al te sterk in de buitenste huid by het langste stuk heen aan de regter zyde boven de knie, ja eens als eene groote vuist, en des niet te min brak de breuk wederom, en scheen te zullen maaken zoo eene nieuwe geleding, als waar van pag. 344. gesprooken is; maar na dat de drukkingen rondom de breuk en vooral op het weer verdubbeld wierden, werd het been eindelyk zoo vast, dat hy in de vyf- en twintigste week te voet uit het Hospitaal ging. Het geheele lid was drie duimen korter, en dit werd verholpen door een hooger hak onder de schoen.

3.

Fractura femoris obliqua.

Eene schuinsche breuk van het dey-been.

Een Tuinknegt, vyf- en twintig jaaren oud, van het Kerspel *Solna*, na by Stockholm, kwam in het Hospitaal met het begin van het jaar 1757. Drie dagen voor syne komst was hy gevallen met een zak meel van eene brug en had het regter dey-been gebrooken, tusschen de *trochanteres* schuinsch van boven naar beneden.

De dikte van de dey op deeze plaats belette, dat men de soort van been-breuk kon ontdekken; maar dewyl de *trochanter major* beweegelyk was by alle draaijingen van het been, en zich
als

als de puntige eindén by eene schuinsche breuk vertoonde, als ook hooger op was geklommen, dan hy moest zyn, door de samentrekking der *glutæi* na derzelver vasthegtingen aan het heupbeen, besloot ik, waarschynelykft te zyn, dat de breuk ging door de *sinus magni trochanteris* schuinsch naar beneden, latende de *trochanter minor* op het andere gedeelte, welk met den hals van het been vereenigt was.

De toevallen waren dragelyk en gering; de repositie gemakkelyk in het werk te stellen, maar het opklimmen van de *trochanter major* byna onmogelyk te beletten door de middelen, welke de gelegenheid in een Hospitaal verschaft. Onder de geneezing viel niets merkwaardigs voor. In de agt-tiende week verliet hy het Hospitaal, ging vast en steevig, maar de hak onder de schoen van den voet aan deeze zyde moest drie duim' hooger zyn, dan aan de andere.

4.

Fractura complicata ambarum tibiaarum.

Eene samengestelde breuk van beide de scheenbeenderen.

Een metselaars knecht, vyftig jaaren oud, viel in 1757. van een stellagie by het nieuwe Koninglyke Palys, en brak beide beenen; alle vier de pypen staken teffens door de spieren en de

huid. Syne medgezellen namen hem op, leiden syne beenen zoo goed in order, als fy konden, en bragten hem naar het Hospitaal.

Het regter been was gebrooken overdwers midden op of over de kuit. Het bovenste stuk van het kuitbeen zat vast in de *aponeurosis tibialis*, en moest door de verwydering van daar naar beneden gebragt worden. De onderste punt wierd gevoeld tegen de huid onder de kuit, en was dus, gelyk gemakkelyk te begrypen is, bedroeft van een gescheiden. Na veel moeite wierd bemerkt, dat het been, by de zetting, bewoogen wierd, waar na het verband geschiedde, zoo als gebruykelyk is by beenbreuken met wonden.

De pyp van het linker been, namentlyk het scheen-been, was onder de kuit afgeweeken, op dezelfde wyze als het regter; aan het bovenste gedeelte, welk stomp was, had het been de huid doorboord, en stak buiten hetzelve; het onderste, welk zeer puntig was, stak door het begin van de pees van Achilles en de *aponeurosis tibialis*, zeer digt aan de buitenste huid. Dit wierd op de plaats gebragt, en gelyk het regter been verbonden. Beide wierden fy gelegd in eene halve blikke laade, welke ik met groot voordeel gebruik in het Hospitaal en ook op andere plaatsen.

Het zoude al te breedvoerig zyn hier ter plaatse

se aan te haalen alle de middelen en wegen; welke ik ter herstelling van deezen lyder in eenen langen tyd beproefde. De inwendige toevallen, de koorts, stuipen, trekkingen, pyn, en slaape-loosheid, wierden alle nauwkeurig in acht genomen. De uitwendige, als ontfteeking, gangreneuse verzweeringen, uitpuilingen van de einden van het been, beenbederving, de verandering der wonde in eene zweer, als in de scheurbuik, wierden zeer zorgvuldig behandeld. Na verloop van zes- en twintig weeken waren fyne kragten volkomen weg, en hy stierf.

My dunkt, voornamentlyk vier oorzaaken te vinden, waarom deeze man op geenerley wyze kon geneezen worden. 1. Syne ouderdom van vyftig jaaren, welke niet wel toeliet beide beenen af te zetten. 2. De tegennatuurlyke scheuring der spieren door de punten der beenderen by de eerste breuk, en vervolgens zoo lang hy leefde; want, wanneer hy 3. uit oorzaak van den afgang noodig had den rug en het fundament op te ligten, moest dit geschieden met te steunen op een of op beide van de gebrooke beenderen, waar door de punten, welke van wegen de wonden in het vleesch geen vasten zwagtel verdroegen, geduurig van elkan-der weeken, en nieuwe prikkelingen maakten; Van daar gebeurde het, eindelyk, 4., dat, schoon het weer op het einde van de twaalfde week zich begon te vertoonen, waar door de breuk eenigzins vast wierd, en geduurende drie

wee-

weeken de beste hoop gaf tot de geneezing, ik egter met leedweezen zien moest, in de zeyentiende, en agt-tiende week, dat het weer wederom los ging (*), veranderde in carieus kraakbeen, en sponsagtige uitwassen, en wederom van een gescheiden wierd. De voornaamste oorzaak van het weekworden van het weer moet gerekend worden, de ontbinding van het bloed, welke voortsproot van eene langduurige stilte, het dagelyks verlies der vogten door sterke veretteringen, en eindelyk de inademing van ongezonde uitwaasseringen van andere lyders, by welke de afzetting was geschied, van zulken, die een etter-borst, het vuur of foortgelyke ongemakken hadden, welke binnen denzelfden tyd in het vertrek geopereerd wierden, en die geneezen vertrokken.

5.

Fractura tibiæ complicata cum diastasi.

Eene samengestelde breuk van het scheen-been met afwyking.

Twee menschen, een Knecht en Timmerman,
vol-

(*) Dit gebeurd zeer dikwils by zwaare beenbreuken, en in ongezonde lighamen, vooral in een Hospitaal, alwaar de lugt door het groot getal zieken altyd bedorven is, even gelyk de zoute Zeelugt, ongezond voedsel, en de belette uitwaassering, op lange zeereisen in staat is het weer aan gebrooke beenderen te ontbinden. De Admiraal ANSON heeft in syne reis daar van een aanmerkelyk voorbeeld. Zie R. MEAD *monita & præcepta medica de scorbuto.* p. 126.

volkomen gelyke beenbreuken gehad hebbende, en beide geneezen zynde, de een binnen en de ander buiten het Hospitaal, in het jaar 1755. konden onder een artykel beschreeven worden.

De breuk was aan het onderste gedeelte van het scheen- en kuit-been met eene afwyking; het scheenbeen namentlyk was gebrooken, en afgescheiden van de *epiphysis articularis*, staande twee overdwarsche vingers ver door de aanstukken gescheurde huid: het einde van het kuit-been stondt vast en onafgescheiden tegen de *astragalus*, maar was evenwydig met het scheen-been gebrooken.

Nauwelyks laat zich dit doen, zonder dat het *ligamentum interosseum* scheurd, doch dit laatste schynt gemakkelyker te kunnen plaats vinden hier, dan aan het gewrigt van de huid, alwaar de *pronator quadratus*, gelyk de Hr. PETIT zoo wel aangemerkt heeft, de *diastasis* van de *ulna* en *radius* belet, maar geenen genoegzaamen tegenstand bied, wanneer de overmagt te groot is.

De voet of het been van den eersten wierd gebrooken in een groot yzer hek, voor het huis van den Graaf TESSIN; wanneer hy namentlyk stond agter op de koets van syn' Heer, en met den voet wilde het toegaande hek terug stooten, rukten de paarden de koets voort, de voet bleef zitten tusschen het yzerwerk, en ligte de zwaa-

re deur uit den bovensten haak. De deur in den halven val trok hem van de koets, en, na dat de voet gebrooken was, viel hy op den grond.

De andere was in een windmoolen tusschen den rondgaanden steen, en het hout, welk daar aan is, gekwetst, en wierd in het Hospitaal geneezen.

De toevallen in beide waren van het begin tot de vyfde of zesde week zwaar en gevaarlyk. Koorts, zwaare pyn, trekkingen, ontsteeking op en boven de knie, gangreneuse verettering in het vet, onder de *aponeurosis tibialis* en tusschen de spieren, hielden aan tot in de zesde week niet zonder geringe hoop van geneezing; het einde van het scheenbeen wierd ingedrukt en terug gehouden met een bekwaam verband. De wonde wierd droog verbonden. De koorts en andere toevallen wierden te keer gegaan met aderlatingen, amandelmelken, salpeter, kampher, en zachte verdoovende middelen.

De ontsteeking en verettering wierd behandeld met zakjes van verdeelende en weekmakende middelen, gekookt in wyn en azyn, vervolgens met foortgelyke pappen, en eindelyk met het *empl. diapomph. c. camphor.* De veelvuldige insnydingen, welke de verzamelingen van etter noodig hadden tot de ontlasting, en de verstorve stukken in de uitwendige bekleetselen, wier-

wierden verbonden met *digest. antiputrid.*, waar onder de *styrax liquida* gedaan wierd.

In de twaalfde week waren alle toevallen overwonnen, het ongemak in zoo verre geneezen, en de eindens van het scheenbeen op nieuw, maar met eene *Anchylosis*, vastgemaakt, dat de lyders op het been gaan en staan konden. Een langduurig oedemateus gezwel wierd eindelyk overwonnen met het expulsief verband over dag, en daar over gebonden flopkouffen, en zakjes met drooge verdeelende kruiden 's nagts.





I X.

Fungus & anchylosis genu.

Een spongieuze zwelling en samengroeying van de knie.

Veele zulke lyders hebben in het Hospitaal hulp gezogt, welker toestand voor alle niet dezelfde beterschap beloofde, gelyk de volgende voorbeelden bewyfen.

I.

Een Bakkers knegt, oud agt- en twintig jaaren, kwam in 1755. in het Hospitaal, om hulp te zoeken, voor eene zwakheid in de linker knie. Dezelve was sterk gezwollen, maar zagt; en de huid van kleur onveranderd. De schommeling van het uitgestort water was kenbaar aan alle zyden van de knie-schyf en deszelfs breeden band, en verdiende den naam van de waterzugt van de geleding.

Hy wist geene zekere oorzaak van dit ongemak aan de hand te geeven, maar herinnerde zich de knieschyf of knie voor twee jaaren hard gedrukt te hebben, en van daar rekende hy het begin en de toeneeming van de tegenwoordige zwakheid van dit deel. Hy had noch

voor

voorheen gehad, noch wierd tegenwoordig geplaagd met eenig ander ongemak, dan de zwakheid en onbruikbaarheid van het lid; want, als hy wilde gaan, en inzonderheid, als hy op de schouders iets wilde leggen, boog zich de knie voor en agterwaarts. Zoo dat hy vreesde, dat dezelve zoude breeken. Voor het overige was hy sterk, bloedryk, en gezond.

De inwendige geneezing wierd begonnen met eene aderlating op den arm, met pisdryvende en buikzuiverende middelen, waar by de knie 's morgens en 's avonds gesmeerd wierd met een mengfel van *Spir. sal. ammon. matric. ää. unc. ij. ol. ceræ dr. ij.*, wordende teffens om dezelve gelegd een zakje met drooge verdeelende kruiden, als *Herb. Absynthii, Scordii, Pulegii, Meliff. citri, menth. c. pulv. baccar. Laur. ää. unc. j.*

Deeze middelen agt of tien dagen gebruikt zynde, was 'er nog geene verandering te zien; derhalven beproefde men de volgende agt dagen, de knie twee of meêr reifen 's daags te besmeeren met *Spir. vini. tart. unc. iv. Juniperi unc. ij. ol. tart. fet. dr. ij.*, daar op wierd een verdeelende pap van de bovengenoemde kruiden met *pulv. gum. ammon. af. fœtid. en farin. fabar. q. s.* gekookt met bier-azyn daar over gelegd. Maar even vrugtelooſ.

De derde proef geschiede met een pap van de *bolus armena, acet. destil. en aq. calcis*, welke



drie reifen 's daags verwisseld wierd, geduurende twaalf of meêr dagen, zonder voordeelige verandering. Dus waren 'er meêr dan vier weken met vrugteloofse poogingen, om de verdeling te weeg te brengen, doorgebracht.

Alhoewel ik te vooren gezien had, dat het openen van zoodanige verzamelingen van water in de leden, zoo wel goed als kwaad was uitgevallen, had hier egter geen uitstel plaats, dewyl de vloeybaarheid van het vogt zeer duideelyk was, zoo wel op het gevoel van den vinger, als tegen het licht, en daar en boven wierden de *condyli articulares* en knieschyf niet het minste opgezet gevonden. De banden, klieren, en watervaten van dit gewrigt waren alleen verslapt en verwyderd.

Derhalven moest, de bovengemelde middelen niets helpende, het gewrigt geopend worden. Twee halvemaans-wyze insnydingen wierden gemaakt met het mes, rondom het benedenste gedeelte van de knieschyf, zonder aan den breedten band te raaken, door de bekleetselen, *aponeurosis fasciæ latæ* en *ligamentum capsulare*. Uit de wonde liep geel water, en dezelve wierd van den grond op gevuld met droog plukfel.

De geleding van de knie en de opgezette plaatsen wierden bedekt met plukfel, waar op *ol. cera* gedroppelt was; compressen en een verband wierden vervolgens gebruikt: droog plukfel
wierd

wierd wederom in de wonde gelegd, en daarop *ol. ceræ* gedroppelt, het dus bevogtigde plukfel wierd tegen den grond gedrukt met heete spatels van zilver aan beide zyden, welk dagelyks herhaald wierd, met hetzelfde verband, als in den beginne: het plukfel wierd vervolgens bevogtigd met *Bals. Fioraventi unc. iv. ol. ceræ dr. ij.*

Na veertien dagen was de wonde in eene goede verettering, de grond zuiver, de knieschyf neêrgezakt, de banden versterkt, en het gewricht stevig en beweegelyk. Drie weeken wierd dezelfde manier nog onderhouden, om de wonde te geneezen en het lid te versterken: eindelyk wierden 'er dienstige compressen, en een bekwaam verband aangelegd, welke eenigen tyd moesten bevogtigd worden, met het laatstgenoemde mengsel, wanneer hy zonder moeite te voet uit het Hospitaal ging.

2.

Fungus articuli ossium femoris & tibiæ.

Eene spongieuse zwelling van de geleding van het deyen scheen-been.

Eene jonge Dienstmeid wierd in 1754. in het Hospitaal genomen, om geneezen te worden van een ongemak, in de regter knie: fy had de stonden nog niet geregeld, was bleek van kleur, vol uitslag, etterblaasen en spleeten in de huid.

De regter knie was boven op zagt, sponsagtig, en met veele pypzweeren omringt, overblyffelen van een *fungus* zonder aanmerkelyke zwellling. Door bloedzuiverende en uitwendige opdroogende middelen wierd eindelyk de uitflag op het lighaam overwonnen, na dat dezelve veele reifen was wech gegaan en weder gekomen. De pyp-zweeren wierden vervolgens geopend, te famen gebragt, en gezuiverd met een feton.

De fpekagtige gedaante der wonde vereifchte het gebruik van den *merc. præcip.*, dagelyks onder de zalf, waar op eene genoegzaame kwyling volgde. En dewyl dezelve bleek van nut te zyn in het zuiveren van de wonde, wierd fy drie weeken lang onderhouden met de *panacea merc. Lem.*

Na elf weeken was het ongemak gebragt tot eene kleine opening, de knie was vry en bekwaam, om bewoogen te worden, wanneer fy uit het Hospitaal wierd gelaaten. Eenige maanden daar na braken de pypzweeren wederom open.

Sy kwam na negen maanden wederom in het Hospitaal. De ftonden hadden zich nog niet geopenbaard, maar de uitflag en onzuiverheid van de huid was even eens wedergekomen, als dezelve in den beginne was geweest.

De eerste behandeling was na alle omstandigheden wel ingerigt geweest, en had eindelyk eene goede werking getoont, derhalven gingen men voort, met hetzelfde inzicht, om de huid zuiver te maaken, eerst met *pulv. Aethiop. lax.* en vervolgens met de *panacea mercurialis*, om eene geringe en langzaame kwyling te onderhouden.

De pypzweeren rondom de kniefchyf, welke nu wederom onzuiver en spekagtig waren, wierden, gelyk de eerste reis, tot in den grond gezuiverd, en na negen weeken met diepe litteekens geslooten. Zoo het ongemak verder opgebrooken is, 't geen ik niet weet, dan is het waarschyndelyk, dat 'er eene *caries ulcerosa* op de kraakbeenderen van de geleding is, waar by noch werktuigen noch geneesmiddelen zonder gevaar kunnen gebragt worden.

3.

Fungus articuli genu.

Eene spongieuse zwelling van de knie.

Eene Dienstmeid van dertig jaaren, in Stockholm woonende, had, volgens haar eigen bericht, na eene gevatte koude, gekreegen eene zwelling en zwakheid in de linker knie, welke by de veranderingen van het weer pynelyk was, en reeds drie jaaren geduurd had. In 1753. kwam sy in het Hospitaal.

Aan den buitenkant van de knieschyf werd gevonden een zagt en sponsagtig gezwel, zoo groot als eene oranje-appel, de huid was uitgerekt, maar van kleur onveranderd. De zwelling verminderde een weinig, wanneer dezelve op de *basis* gedrukt wierd, maar integendeel wierd eene opening gezien aan de andere zyde van de knieschyf, tot een teken, dat 'er onder dezelve gemeenschap was.

Na eene voorbereiding wierd het gezwel uitgepeld, als een zakgezwel. Het zelve had geen en anderen zak, dan het *ligamentum capsulare*, aan den buitenkant, en was gelegen tegen het open gewrigt, den *condylus femoris exterior* en *fac. inf. patellæ* met de inwendige deelen. De huid, het vetvlies, de *aponeurosis fasciæ latæ* en het uitgezette *ligamentum capsulare*, wierden geopend kruiswyze, aan de uitwendige hoeken wierd het gezwel losgemaakt, maar het lag inwendig los, en wierd wechgenomen.

Eene verwyderde slagader, die tot dit gezwel kwam, en zonder twyfel een tak van de *poplitea* was, gaf veel bloed. De bloedstorting was moeyelyk te stuiten, want de slagader trok zich binnen in het gewrigt, en naar beneden, zoo dat dezelve noch opgeligt noch gedrukt kon worden. De wonde en het gewrigt wierden, zoo diep als men daar in komen kon, gevuld met fyn plukfel, waar op wederom *ol. ceræ* wierd gedropt, terwyl hetzelfde warm gemaakt wierd met heete zilvere of yzere spatels.

Ein-

Eindelyk hield de bloedstorting op, wanneer het verband veranderd, en het volgende aangelegd wierd op dezelfde wyze, als in het eerste van dezelve gevallen gezegd is; de verettering, zuivering, sluiting en geneezing der wonde waren in de agtste week na de operatie volbragt. Het lid wierd bruikbaar, steevig, en buigzaam, wanneer sy op het einde van de tiende week het Hospitaal verliet. By het wechneemen van het gezwel liep 'er wel twee leepels vol geel water uit het gewrigt.

Het gezwel bestondt uit eene ongelyke en klieragtige substantie, vereenigt met, of voorkomende van den binnenkant van de *capsula mucilaginosæ articuli*, welke, gelyk gemakkelyk begreepen word, in het begin na de operatie boven maaten was uitgezet, dik, styf, en inwendig knobbelagtig.

4.

Fungus cum carie cancrofa genu.

Eene spongieuze zwelling met eene kankeragtige bederving in de geleding van de knie.

Een knecht uit *Schenninge*, dertig jaaren oud, kwam in den zomer van 1758. in het Hospitaal, om hulp te zoeken voor een gezwel in de linker knie, welk hem meêr, dan een jaar, geplaagd had, en zonder voorafgaande bekende

oorzaak zich had geopenbaard. Tot de vermeerdering van het ongemak had egter veel toegebragt eene reis te voet van Smoland, met eenige offen-wyders.

By fyne aankomst was hy nauwelyks inftaat, om op het zieke deel te ftaan. De knie was bovenmaaten groot, zoo door de zwelling der zachte deelen, als inzonderheid door die der *condyli tibiae* & *femoris*. Het gewrigt was ftyf, en half geboogen. Aan beide zyden van de kniefchyf wierd eene onduidelijke fchommeling van vogt bemerkt, even als van eenig uitgestort leden-water binnen in het gewrigt. De pyn was by tuffchenpoozen dragelyk, maar nooit wech.

Dus was hier een veelvuldig ongemak van eene *spina ventofa*, *anchylofis*, *contractura genu*, *atrophia pedis*, en eene zwelling der weeke deelen door de gedwonge beweeging van de knie in fyne reis naar Stockholm. Behalven de afzetting boven de knie was hier geen zeker middel ter geneezing voor te flaan. Maar eensdeels verzógt hy dit niet te doen, en anderdeels hield ik het ook voor onzeker, zoo het inwendige ongemak kankeragtig zyn mogt, gelyk het voorbeeld, op pag. 323. aangehaald, behalven veele andere, my herinnerde.

Doch om hem niet geheel en al trooftenloos te laaten, moest 'er iets beproefd worden, en wel

wel eerst de ontbinding. De knie wierd gedurende veertien dagen gesmeerd met *spir. matric. unc. iv. Sal. ammon. en Tinct. foetid. L. ää. unc. fs.* twee of driemaal 's daags, en daar over wierden gelegd zakjes, met ontbindende kruiden.

De zwelling der uitwendige deelen vermindeerde daar door, wanneer het hoofd van het scheen-been en het geheele onderste gedeelte van het dey-been des te duidelyker gevoeld wierden, en onveranderd bleeven. Vervolgens wierd gebruikt het *Empl. de ran. c. merc. 4drupl. unc. iv. malax. cum ol. c. c. fetid. gtt. x.*: welk op de huid en rondom de knie wierd gesmeerd; daar by wierd gegeven de *Panac. merc. Lem.* tot twee of drie greinen dagelyks; maar dewyl het eerste niets uitregte, en het laatste de pyn zeer sterk vermeerderde in de knie, wierd met de *panacea* na tien of elf dagen opgehouden: warme koe-mist, vermengt met overgehaalden azyn, wierd maanden lang gebruikt, als een pap op de knie.

Eenige verligting, maar geene andere verandering volgde daar na, dan alleen, dat de zagte deelen aan de zyden van de knieschyf beter uitpuilden, en deden zien, dat 'er eene verettering, of verzameling van water in het gewrigt was. Eindelyk wilde ik door openingen aan de zyden van de knie-schyf daar van worden verzekerd.

By de buiging van het scheen-been was de knieschyf neêrgezakt, en de opzetting van het *ligamentum capsulare* was dus onder de *extremities musculosæ vastorum*, deeze laatste moesten derhalven eerst doorgesneden worden, voor dat de *capsa articularis* kon worden geopend.

Uit de binnenste of regter opening liep nauwelyks twee lepels vol dun bloederig water, maar uit de buitenste of linker in het geheel geen. Beide openingen wierden gevuld met droog plukfel. De binnenste deelen wierden warm gemaakt met het *ol. ceræ*, gelyk in het eerste geval. De deelen wierden gestoofd met wyn-azyn, en witten fransch Wyn, van elk anderhalf pond met drie dragmaas oly van was. De eerste twaalf uren waren dragelyk, maar daarna vermeerderde de pyn van tyd tot tyd; uit de insnydingen begon een bloederig water te loopen, dat binnen twee dagen alle compressen en doeken doortrok, welke daarom lagen: blykende uit dit scherpe, bruine, en groene water, dat de beenbederving kan, keragtig was.

Den vyfden dag stierf hy, na dat de knie eens zoo groot was geworden, en, zoo van binnen als van buiten, tot eene aanmerkelyke rotting was overgegaan (*). Na den dood werd het
on-

(*) Als men genoodzaakt is, zulke gezwollen of ongemakken te openen, waar in eenig uitgestort vogt onduidelyk bespeurd word, of men eene beenbederving kan

ongemak onderzocht, en bevonden, dat hetzelfde reeds voor de operatie had bestaan in eene zoo sterke verrotting, dat alle kraakbeenderen aan de einden der beenderen, gelyk ook de *semilunares* met de *ligamenta cruciata* zeer ontbonden waren.

verdenken, dan komt het veel aan op de voorzegging, hoe dezelve ingerigt word tot lof van den Heelmeester, en de verantwoording van de Operatie; zoo de beenbederving is een *pædarthrocace*, veroorzaakt door eene scheurbuikige, kankeragtige, of scrophuleuse stoffe, gebeurt het maar al te dikwils, dat eene doodelyke verrotting de lydende deelen aandoet, zoodra de uitwendige lugt na de opening daar by komt. Zelfs zyn andere verzweeringen in de holligheden van het lighaam, gelyk een *Empyema thoracis* en *Ascites purulenta* aan hetzelfde gevaar onderworpen, zoo sy verslimmerd zyn door langduurigheid van tyd, door de scheurbuik of ontaarting der aangrensende beenderen.





X.

*Ruptura tendinis Achillis sinistri.**Eene breuk van de linker pees van Achilles.*Van *Joh. Elias Sjöström.*

Een man, oud veertig jaaren, was voor vyf- en twintig jaaren, door een ander gehouwen met een zyfen, van agteren boven de hiel, zoo dat de pees van Achilles daar by volkomen was doorgesneden. Het ongemak was toen op eene behoorlyke wyze behandeld, de einden wierden samengevoegd door de gebruikelijke pees-hegting, waar door zich een *callus* gevormt had, en de pees zoo wel, als de wonde, volkomen geneezen was, zoo dat hy na verloop van eenigen tyd kon maaken alle bewegingen, zonder op die plaats eenige pyn of ongemakkelykheid te hebben,

Zulk een ongemak is wel op zich zelve niet zeldzaam, maar dat de vaste *callus*, na een onschadelyk gebruik van veele jaaren, van nieuws op dezelfde plaats kan breeken door middel van eene minder sterke beweging, dan voorheen geduurig verrigt was, verdient meêr opmerkzaamheid.

Dit

Dit gebeurde egter deezen man , wanneer hy ſchielyk eenen trap zoude opſpringen , en de ſtap alleenlyk aankwam op de hielen , waar door de pees in den hoogſten graad geſpannen wierd , en brak op dezelfde plaats , als de voorgaande reis , doch met dat onderscheid , dat de uitwendige bekleetſelen , of de huid , onbeſchaadigt bleeven. Dewyl nu de ſterkte en het evenwigt in het gaan tegen de peeſen , welke den voet buigen , op deezen aan kwam , wierd hy buiten ſtaat geſteld , om verder den voet en het been te gebruiken , voor dat hy op nieuw geneezen was.

De afwyking van de hiel naar het voorſte van den voet door de *muſc. flexores pedis & digitorum* , en de ruimte , welke door de huid duidelyk gevoeld wierd tuffchen de afgebrooke peeſen van de *Gastrocnemii* en *solaris* , ter breette en diepte van eenen overdwarschen duim , was , behalven het gevoel van den lyder , een overtuigend bewys van de zekerheid der breuk.

Tot ſyne geneezing vondt ik minder noodig , om door de anders gebruikelyke pees-hegting , de eindens ſamen te vereenigen , vooral dewyl de deelen boven de breuk niet waren geſcheiden , in welk geval ſy anders te vooren noodzakelyk moeſten geopend worden , niet zonder groot ongemak voor den lyder ; maar hier wierd een goed verband voldoende bevonden , om het oogmerk te bereiken , en daar toe gebruikt hetzelfde



zelfde verband, welk anders na de operatie met deeze hegting noodig is, om dezelve te ondersteunen, en bekend onder den naam van *uniens ad rupturam tendinis Achillis*. Dit verband wierd aangelegd op de gewoone wyze, doch zeer vast, waar by de hiel zoo ver mogelyk naar agteren gebragt wierd, en de kuit naar de hiel, op dat de einden dus zeer na aan elkander zouden kunnen komen.

Om het verband te helpen wierd onder den voet gelegd een gevoerd plankje, van eene noodige grootte, om den voet-zool te bedekken, welk eerst met twee banden wierd vast gebonden om den voet: deeze gingen vervolgens naar agteren over de hiel, tegen het been op, en wierden by de heup vast gebonden, helpende zeer veel, om den hiel met den geheelen voet naar agteren te brengen. Eer dat het verband aangelegd wierd, wierd de aangedaane plaats besmeerd met het volgende middel, *Spiritus Sal. ammon. unc. ℥. vini Camph. unc. j ℥. ol. ceræ dr. j ℥.*, welke ook op het verband gedroppeld wierd, eenige reizen's daags. Dus bleef de lyder tot den anderen dag, wanneer 'er niets anders gedaan wierd, dan dat het plankje wierd wechgenomen, dewyl hy klaagde over eene zwaare pyn, door de al te sterke te rug trekking van den voet.

Den derden dag wierd het verband wechgenomen, het onderste van het been met den voet was

was toen gezwollen, doch vooral de aangedaane plaats, en rondom het gewricht van den voet. Hetzelfde verband, bevogtigd met Fransche brandewyn, werd wederom op dezelfde wyze aangelegd, maar het andere middel niet gebruikt; boven op den voet werd gelegd een verdeelende pleister, van het *Empl. diapomphol. c. camphora*. Het verband werd veranderd, en toe getrokken, zoo dra het los werd, omtrent om den anderen dag, tot na verloop van tien dagen, wanneer het daar in veranderd werd, dat 'er lange hegtpleisters aangelegd wierden, van onder van den voet-zool af over den hiel tot aan de deÿ, en daarna hetzelfde verband, als te voren. Dit werd vervolgens veranderd of alleenlyk toegetrokken, om den derden of vierden dag, na vereisch der omstandigheden.

Zes weeken verloop en zynde, begon hy een weinig te kunnen staan op den voet, de *callus* werd duidelyk gevoeld, welke zich aldaar geplaatst had even als een knobbel ter grootte van een okkernoot. Hy begon naderhand te gaan over den grond, tot dat hy eindelyk, na agt weeken, begon uit te reiden, want om over de straat te gaan, was hem nog onmogelyk, van wegens de onevenheid, doch op eenen effen grond ging hy tamelyk wel, moettende egter onder den voet eenen hak hebben, die eenen vinger hooger was, maar na verloop van een half jaar gelyk aan de voorgaande gemaakt werd.

Na dat hy begon uit te reiden, wierd het eerste verband te moeyelyk, om te kunnen gebruikt worden; en tegelyk gevaarlyk gevonden, waar om men een ander en veel gemakkelijker gebruikte, bestaande in een lange riem, twee duimen breed, welke onder den hiel vast gemaakt wierd met een' lederen sok, en langs het been en de been liep, wordende vastgemaakt aan eenen gordel rondom het lyf. Aan deeze zaten drie andere; de eerste drie overdwarsche vingers boven de breuk, de tweede even onder, en de derde boven de knie, en deeze wierden vastgeflooten rondom het been en de knie; sy waren alle van vast Engelsch kalfs-leder, welk niet mede gaf. Tusschen deeze riemen waren wederom gezet breede banden, waar mede byna het geheele been omwonden wierd, zoo dat de lange riem zeer vast wierd gehouden tegen het been, zoo wel wanneer het wierd uitgestrekt, als wanneer het wierd geboogen, waar door ook de hiel bestendig naar agteren gehouden wierd, en in het gaan eene ondersteuning wierd te weeg gebragt.

Onder deeze geheele ziekte kreeg hy geene zwaare toevallen; op het oogenblik, dat de pees doorbrak, voelde hy zeer zwaare pyn van de sterke scheuring, maar zoodra het geschied was, en hy tot stilte kwam, verdween de pyn zoo volkomen, dat hy niet het allerminste bemerkte wierd; waar uit beslooten kan worden, dat de pees ten eenenmaale was doorgebroken,

zonder eenige halve draaden over te laten. Het geen hem 't meest in den beginne plaagde, waren kramptrekkingen in de kuit, welke vooral bemerkte wierden den eersten dag, vervolgens by tusschenpoozingen, en niet dikwils. Eindelyk, wanneer hy begon te gaan, zwol het gewrigt van den voet en de gebrooke plaats tegen den avond meer of minder naar maaten hy het been vermoeide, doch dit verminderde naderhand, en bleef na drie maanden geheel en al wech, in welken tyd hy naarstig gebruikte de bovengenoemde pleister.

Om de oorzaak uit te leggen, waarom de pees juist toen brak, en niet eerder, daar hy egter te vooren zich sterker bewoogen had, zonder aldaar de minste pyn te hebben, is wel wat moeyelyk; maar men zoude zulks deels kunnen afleiden van de kwaade gesteldheid der vogten op deezen tyd, dewyl de lyder altyd te vooren geplaagd was met openberstingen van de huid, vooral op de handen, waar tegen veele inwendige middelen vrugteloos gebruikt zyn, zoo dat dezelve niet geneezen waren.

Nu zoude mogelyk deeze zelfde scherpte in staat zyn, om insgelyks de *callus* week te maken, zoo dat dezelve in zoo eenen toestand niet kan verdraagen eene zoo sterke spanning zonder te bersten. Eene andere omstandigheid moet ook worden opgegeeven, welke hier toe ook iets schynt te kunnen toebrengen. De ly-

der was altyd gewoon geweest, hooge schoenen te draagen, maar had eenigen tyd te vooren zeer laage genomen, waar door de pees gevolgelyk genoodzaakt was geweest, zich meêr uit te rekken, dan dezelve den geheelen tyd te vooren gewoon was, en het kan gebeuren, dat dit het meeste gedaan heeft. Wanneer derhalven een pees sterker gespannen word, en deeze scherpte te vooren de *callus* minder vast gemaakt heeft, schynt te volgen, dat dezelve moet breeken.

Beide deeze oorzaaken te samen genomen kunnen voldoende zyn, om zoo eene breuk voort te brengen, indien eene alleen daartoe niet genoegzaam is.



X I.

Exfoliatio tendinis Achillis.

Eene afschilfering van de pees van Achilles.

Dat de peesen in een zeker opzigt, gelyk de beenderen, uitwassen kunnen krygen, verzweeren, verrotten, opzwellen, bedorven worden, en voor een gedeelte afschilferen, zoo dat dezelve egter overblyven, zulks ondervindt men dikwils in peesknoopen, *calli*, *ganglia*, invreetende wonden in de gewrigten; maar dat sy op dezelfde wyze, als het been, met nieuwe deelen vernieuwt worden, wanneer een gedeelte van derzelver lengtte is afgenomen, daar van heeft men met myn weten geene waarneming.

In 1758. kwam eene oude en ziekelyke vrouw in het Hospitaal; behalven een uitslag op de huid, had sy twee diepe zweeren agter op het linker been, welke het gebruik van dezelve zoo in het staan, als gaan, volkomen beletten.

Het bovenste was vier duimen lang, en drie breed, midden op de pees van Achilles; deze was dik, en als een gansen-ey opgezwollen, even als een *hyperfarcosis* door de *aponeurosis tibia-*


lis; de omtrek was zeer hoog met sponsagtig vleesch. Het onderste was beneden aan den hiel boven het uiteinde van het hiel-been, welk bloot en week gevoeld wierd.


In de eerste zweer, alwaar namentlyk de pees van Achilles sponsagtig en gezwollen was, wierden verscheide insnydingen gemaakt, langs en in de pees met het mes, tot dat ik bemerkte, dat derzelver vezelen digter samengevoegd waren, 't welk alleenlyk in het benedenste derde gedeelte der dikte was; de opening in de *aponeurosis tibiae* wierd insgelyks naar boven en naar onderen verwyderd, de pees bedekt met droog plukfel, waar op gedroppeld wierd het *oleum therebinthinae*, dat men door heete spatels warm maakte. Dit wierd om den anderen dag herhaald; de pees trok zich dagelyks te samen, op den agtsten dag was 'er eene goede verettering, en toen schilferde het sponsagtige gedeelte van de pees af. Vervolgens wierd de wonde verbonden met *Bals. arcei unc. j. ung. basil. citrin. unc. ij. ol. ceræ dr. j.* en eindelyk geneezen met het *ung. rubr. exsiccans*. De verdere uitzetting van de pees wierd belet, met trapswyze compressen en een zagt verband.

De andere zweer wierd met een gloeyend yzer op den grond tot op het been gebrand; vervolgens droog verbonden, en, na dat de affschilfering van het been was geschied, met het *ung. exsic.* tot de volkome geneezing gebragt. Dewyl deeze toevallen gevolgen waren van eene
blad-


bladder-roos , die zich verscheide reisen ver-
toont had , wierd de inwendige geneezing be-
gonnen met het *Elect. lenitivum* , waar na de
operatie geschiede. Vervolgens wierden agt
dagen lang gebruikt *rob. samb. unc. iv. oxym. simpl.*
unc. ij. mixt. diatrios. dr. ij. decoct. hord. ten. lib. iij.
aq. naphæ unc. ij. tot een theekopje alle drie of
vier uren. Sy wierd daar door in eene zagte
uitwaassening gehouden , welke de roos schic-
lyk wechnam, die zich anders met koorts, aan
de dey, het been, en den voet vertoonde.

In het vervolg, en terwyl dat de geneezing
volbragt wierd, wierd de *Aethiops min. cum Rheo*
& *Scammonio* gebruikt. De ruuwe huid wierd
besmeerd met honig-water. Na agt weeken was
sy geneezen en verliet het Hospitaal.






HEELKUNDIGE WAARNEEMINGEN.



ZESDE HOOFDSTUK.

VAN EENIGE BYZONDERE VET-
GEZWELLEN.



Tumores adiposi.

Vet - gezwellen.

Grootere en kleinere vet-gezwellen zyn
G van tyd tot tyd in het Hospitaal voor-
gekomen, en door de operatie wech-
genomen. De gewassen, welke in het Latyn
Lupia in het Fransch *les loupes* geheeten worden,
konnen gevoegelyk verdeeld worden in *tunica-*
ii en *scirrhusi*.

Onder de eerste worden begreepen alle zak-
gezwellen, wat sy ook inwendig bevatten; on-
der

der de laatste, alle de overige, welke zonder zak toeneemen. Onder de eerste worden zeer veele verscheidenheden gevonden ten opzichte van de bevatte stoffe, welke dikwils afwykt van die, waarmede de Schryvers, de een op het woord van den anderen, dezelveu vergelyken. Dus heb ik in eenen sterken zak gevonden een gezwel, een- en twintig ponden weegende, welk gelukkig wechgenomen wierd van de kaak by eenen boer, door den Hr. NATHORST met mynen bystand, waar van de inwendige zelfstandigheid noch vast noch vloeybaar was, maar even als het crystallyne vogt in het oog. (Vergelyk hier mede de Verhandelingen van de Koninglyke Academie der wetenschappen voor den jaare 1750. p. 232.). Soortgelyke, maar veel kleinere, zyn dikwils voorgekomen. Somsyds is de inwendige zelfstandigheid vleeschig geweest, zoo dat men dezelve niet goed kon vergelyken met een *atheroma*, *steatoma*, of *meli-ceris*.

Voor al moet ik spreekken van een vleeschgezwel, welk fyne zitplaats en byzonderen zak had in den palm van de hand onder de *aponeurosis palmaris*, en dat ik uitpelde by eene Adelyke Dame uit Finland, in het jaar 1746.

Onder de laatste, of knoefagtige, die geen zak hebben, worden insgelyks veele veranderingen gevonden, dewyl sy vleeschig, klieragtig, vaatagtig, vlesig, of vet zyn.



Vleefchig worden fy genoemd, wanneer zulke vleefchige ftukken, waare *Sarcomata*, opgroeijen uit vliefige of peesagtige deelen, gelyk ik voor veele jaaren 'er een by een' voornaamen Heer uitpelde zoo groot, als een ganfen-ey, gegroeit uit het *planum triangulare apon. mufc. trapezii finiftri*.


Onder de klieragtige behooren de Verharde Oorklieren; zie pag. 126, de *strumæ*, en *scrophulæ*.

Tot de vaatagtige word gebragt de *Sarcocel testiculi*, voor een gedeelte, of geheel en al met of zonder den zaadftreng.

De vliefige zyn de *Polypi narium benigni*. Zie pag. III., *Extenfiones clitoridis*, *cristæ hæmorrhoidales*.

De laatste of vette zyn de grootfte en het minst van allen bepaalt.





I.

Tumor adiposus enormis ad nates lateris sinistri.

Een groot vet-gezwel agter op de linker bil.

Eene meid uit het District van Stockholm, vyf- en twintig jaaren oud, wierd in 1754 in het Hospitaal genomen met een groot vet-gezwel op de linker heup of dey, welk sy droeg zederd zeven jaaren, zonder ander ongemak, dan het gewigt kon veroorzaaken, ten opzigte van de aanmerkelyke grootte. De kleur van de huid was onveranderd, doch grof en knobbelagtig, de bevatte stoffe wierd gevoeld week, maar brokkelig, te zyn. De gedaante was als van een omgekeerde pot of ronde keetel, welke zich geheel en al vast gemaakt had, of een lighaam maakte met de uitwendige bekleetselen van de *marg. post. cristæ ossis ilei* naar beneden tot de helft van de dey.

De operatie, als het eenigste middel, welk haar kon helpen, geschiede na weinige dagen, na dat het lighaam te vooren genoegzaam bereid was: de huid wierd eerst twee vinger-breette van den grond van het gezwel los gemaakt tot boven op het gezwel, door twee halvemaanswyze

infnydingen , welke elkander aanraakten , en een eyrond maakten. Het gezwel wierd van de huid los gemaakt , zoo digt mogelyk was ; maar , dewyl het alleenlyk bestond uit hard vet , waar van de eindpalen , op de vetste plaats van het lighaam op de *glutei* , by eene bloederige operatie , moeyelyk te bepaalen waren , wierd 'er een gedeelte op den grond gelaaten. De bloepstemping geschiede op de gewoone wyze , deels door het onderscheppen der groote vaten , deels ook door *Pulv. Bol. arm. unc. vj. crep. lupi unc. ij* , gestrooid op droog plukfel , waar mede de wonde gevuld wierd , wordende vast gehouden met hegt-pleisters , compressen , en een goed verband ; eerst dat , welk *la Fessiere* genoemd word , vervolgens een lange zwagtel met opklimmende omwindzels.

Het wechgenomen gezwel bestond alleen uit harde , opgezwolle , vet-blaafen , en eene ongehoofelyke quantiteit los vet. Het woog 12 ponden. De toevallen wierden voorgekomen door aderlatingen , en andere dienstige inwendige middelen , als ook door eene goede levensregeling , zoo dat sy zeer zagt wierden. Na vier dagen wierd het verband geopend , welk door de verettering vry los geworden was. De wonde wierd vervolgens dagelyks verbonden met de gewoone ettermaakende zalf ; en de kanten wierden , om de geneezing te bevorderen , tot een gebragt door middel van hegt-pleisters.

Een

Een overgebleeve stukje vet, welk men meende door de verettering te kunnen doen versmelten, noodzaakte my, om in de derde week daar van wech te neemen een stuk ter gewigt van drie pond', welk met de vezelen van de groote bil-spier vereenigd was.

Al 't geen verder van de harde vetblaafen overig was, wierd deels door de verettering, deels ook door bekwaame middelen verteert, als het *pulv. sacch. cand. albi, sabinae, antimonii crudi. ää., merc. præcip. rub. en lap. infern.*, na vereisch der omstandigheden, waar na de wonde vervolgens tot geneezing gebragt wierd, terwyl de kanten dagelyks tot een wierden gebragt, en men de daar toe noodige middelen gebruikte, zoo dat sy na verloop van agt weeken het Hospitaal gezond en wel verliet.

Hoe veel nut brengt het overlaaten van de huid niet aan, zoo veel de mogelykheid zulks toelaat, by zoo eene operatie? Eene zwaare verettering word daar door voorgekomen, en eene spoedige geneezing bevorderd.





I I.

*Tumor adiposus insignis ad clunes lateris
dextri & interfemineum.*

*Een groot vet gezwel op de regter bil en tusschen
de deyen.*

Van Joh. Elias Sjöström.

Eene meid van zeven- en twintig jaaren, uit *Nerike*, kwam in 1755. in het Hospitaal met twee zeer groote gezwollen, welker byzondere zwaarte en grootte dezelve aanmerkelyk, en gevaarlyk, om wech te neemen, maakten.

Het grootste, welk, uitgesneeden zynde, een- en twintig ponden woog, zat agter op de regter bil, en ging tot digt by het fondament tusschen de beenen.

Het tweede een weinig minder, vyftien ponden weegende, zat binnen aan de regter dey, ging voorby het *labium vulvæ dextrum*, welk geheel en al uitgerekt was, en had gemeenschap met het eerste door een stuk vet van denzelfden aart, als het eerste, en zoo dik, als een arm. De uitwendige gedaante was even als de boven beschreeven, insgelyks met gezonde huid bedekt;

fy

fy wierden gevoeld zagt en knobbelagtig, zonder pyn of ander ongemak, dan de ondragelyke zwaarte veroorzaakte.

De Hooggel. Hr. ACREL vondt wel, dat de wechneeming het eenigste middel was tot haare hulp, maar voorzag ook te gelyk het gevaar, waar aan eene zoo groote operatie blootgesteld was, zoo ten opzigte van de grootte van de gezwellen, als derzelver kwaade plaatfing. De Lyf-artz SCHÜTZER, en de Heelmeester RAMSTRÖM, wierden derhalven verzogt, om ook deeze zieke te bezien, en ftemden in de voorzegging volkomen overeen met den Hr. ACREL. Maar dewyl deeze gezwellen haar zoo veel ongemak veroorzaakten, zo wel in het gaan, liggen, en zitten, als by andere gelegenheden, zoo dat fy nauwelyks in ftaat was, om aan de natuurlyke nooddrufte te voldoen, en men voor derzelver toeneeming vreesde, welke insgelyks eindelyk eene oorzaak van haaren dood fyn zoude; kon de operatie niet met regt gelaaten worden, vooral, dewyl fy zelve daar op aandrang, onderwerpende zich aan de wille en het befluit van God, ten opzigte van de uitkomst.

Zoo dra fy behoorlyk voorbereid was, wierd de operatie verrigt op de volgende wyze. Eerft wierden byde gezwellen van een gefcheiden, in gedagten, om daar door te zien, of de eerfte operatie zoude kunnen verrigt worden met
het

het wechneemen van het eene, zonder het andere of voorſte aan te roeren, wanneer waarſchynelyk de toevallen dragelyker zyn zouden; maar dewyl ſy beide eenen oofſprong hadden uit het vetvlies, en daarenboven, gelyk reeds gezegd is, door het vet onder de huid te ſamen vereenigt waren, moest inſgelyks het kleine blootgemaakt, en grootendeels wech genomen worden, na dat het eerſte van de huid en de bilſpieren was afgeſcheiden. Het voorſte of kleinſte kon niet tot den grond uitgepelt worden, dewyl het hard geworden vet, 't geen voor de operatie niet gemerkt wierd, nu gevonden wierd, ſamen vereenigt te zyn met het celagtig weeffel van het bekken binnen de buik. De huid in den omtrek wierd zoo veel mogelyk geſpaard. De bloedſtemping en het overige verband geſchiede, als te vooren gezegd is. Na de operatie wierd de aderlating, het gebruik van verzagtende middelen, de ſalpeter, en eene goede levens-regeling, te gelyk met alle mogelyke oppaſſing, nauwkeurig in acht genomen. Deneerſten dag was de lydereſſe tamelyk wel, had eene maatige koorts, en klaagde niet over aanmerkelyke pyn. Het begin van den volgenden dag ging ook wel aan; maar dewyl het ontblooten en bemorffen van de wonde by de ontlaſting van den afgang en de pis niet kon belet worden, onaangezien alle zorg, kreeg ſy, voor het einde van den dag, zeer zwaare pyn in de dey, innerlyke benauwtheid, en ongeduurigheid,

eene

eene raffe pols, en toeneemende vermoedheid. Alle mogelyke middelen wierden daar tegen in het werk gesteld, maar te vergeefs.

Des niet te min begonnen de kanten den derden dag eenigzins te veretteren, maar de verettering kwam niet verder. Het overige harde vet, welks deels was overgebleeven van het gezwel, deels het vetvlies der spieren was, ging tot het vuur over. Alles werd vrugteloos beproefd, om den verderen voortgang daar van te stuiten. De wonde werd verbonden met een ettermaakend, en de verrotting tegenstaand, middel, uit *Ung. de styrace. unc. iij. Baf. citr. unc. ix. Balf. Peruv. n. dr. iij.* op wieken gesmeerd; daar over werd gelegd een pap van *scordium, Ruta, Abrotanum, Pulegium, mentha crispa*, en *Chamomilla. R. ää.* gekookt in wyn en azyn, welke pap eerst werd besproeid met *Tinct. fætid. Lond.* en *spir. sal. ammon.*, en vervolgens warm aangelegd verscheide reizen 'sdaags. Inwendig wierden gebruikt allerhande versterkende middelen, onder welk de koortsbast, zonder nut, tot eene tamelyk groote quantiteit, gegeven werd. Dagelyks wierden 'er groote en dikke stukken van het verrotte vet wech gesneden, maar het vuur nam toe, en de kragten verminderden, tot dat sy eindelyk stierf op den zesden dag.

Na den dood werd de buik geopend, en gevonden, dat het celagtig weeffel van het buikvlies

vlies in het bekken even groot, hard, en dik was, als de uitwendige gezwollen, met het eerste samenhangende. Dit inwendige vet was ook tot het vuur en de verrotting overgegaan.

Dat de operatie niet was de regte oorzaak van den dood, kan zonder moeite ontdekt worden; wel is waar, dat, zoo dezelve niet geschied was, haar leeftyd waarschynelyk langer zoude geweest zyn, maar daarom kon dezelve niet de waare oorzaak genoemd worden. Was de verettering niet belet geworden, door zulke oorzaken, welke het vuur aanbragten, dan zoude zekerlyk de operatie anders afgelopen zyn.

Twee oorzaken schynen my toe het meest toegebracht te hebben tot het doodelyke gevolg van de operatie. 1. De werking van de pis, afgang, en uitwendige lugt, op deeze groote wonde, welke, gelyk gezegd is, niet kon gestuit worden, maar door de verrotting het geheele ongemak in eene doodelyke versterving deed overgaan. 2. De veruitgestrekte verharding van het vet tot in het bekken, waar door de scheede, baarmoeder, endel-darm, pisblaas, en een gedeelte der dunne darmen, welke beneden gelegen waren, in eene doodelyke ontsteeking en het vuur gebragt wierden.



III.

*Tumor adiposus insignis & congenitus in
mala dextra.*

Een groot aangebooren vet-gezwel op de regter kaak.

Eene meid uit Oost-Gotland, negen- en dertig jaaren oud, kwam in den zomer van het jaar 1758. in het Hospitaal.

Sy had een aangebooren gezwel op de regter koon, welk begon gelyk met den ondersten rand van de oogholte, boven en onder het jukbeen heenliep, eene vinger-breette van de regter neusvleugel en den regter hoek van den mond, hangende drie vinger-breette onder den rand van de onderste kaak; opklimmende in eenen gelyken afstand van het oor, en sluitende in eene rondte met het begin onder het oog; het jukbeen stak anderhalve duim-breette uit, welk zoo wel als het gezwel van de geboorte aldus geweest, en met de jaaren verder opgegroeit was.

Het Profil van het geheele gezwel was dus agt duim' lang, zes en een' halven duim breed, van het oor tot den hoek van den mond, en vier duimen hoog, boven de oppervlakte van de

K k

kaak.



kaak. Het gezwel maakte het aangezicht mismaakt, zynde uit hoofde van de zwaarte zeer lastig, en trekkende den regter hoek van den mond naar beneden, zoo dat de kwyl onwillig daar uit liep.

Het benedenste ooglid was uit dezelfde oorzaak verflapt en hong neder, maar niet zoo ver, dat de traanen over de kaak liepen. Op het gevoel was het gezwel zagt, maar zonder eenig blyk van schommeling, waar uit geoordeelt wierd, dat het een vet gezwel was.

Het kon wel voor een gedeelte, maar niet volkomen, wech genomen worden, dewyl het jukbeen onnatuurlyk uitpuilde, en het verharde vet onder hetzelve zat.

Het lighaam bereid zynde, wierd de operatie verrigt. De huid wierd geopend met twee insnydingen; de eene regt van boven naar onderen langs het gezwel, de andere om deeze naar het oor. De kanten losgemaakt zynde, wierd bevonden, dat het onderleggende gezwel bestond in hard vet, in eenen zak beflooten.

Het vet wierd by het onderste gedeelte van het gezwel van den grond wech genomen, welke moest zyn op de spieren van het aangezicht, maar schoon ik onder het snyden ontmoette vleesch-vezels van de *triangularis menti, caninus*,

mus, zygomatici, sterker, dan deeze spieren door-
gaans zyn, was egter daar onder nog hard vet,
waar van een stuk overgelaaten wierd, welk tot
op de *bucinator* en onder het jukbeen ging.

De *arteria maxillaris exterior*, of de vierde tak
van de *carotis externa*, gaf veel bloed, en wierd
onderschept. De kanten wierden opgeligt met
pleisters, en de wonde met droog plukzel ge-
vuld. De enkelde muilband (*capistrum simplex*)
met vermeerderde windsels wierd gebruikt, om
de losse hoeken opteligten en te ondersteunen.

De verettering was den zesden dag tegen-
woordig, wanneer de wonde van den grond op
bloot gemaakt, en op nieuw verbonden wierd
met de dikwils genoemde zalf van *Bals. citrin.*
Bals. arcaei. en *ol. ceræ.*

In de vierde week was de hoogte van het ge-
zwel, en de wanstaltigheid van het aangezicht
veel verbeterd. Eene rykelyke verettering
deed dagelyks iets van het overgelaate vet ver-
smelten, maar de geneezing begon te gelyk vol-
bragt te worden, waar na geene hoop meêr zyn
zoude, om de versmelting te onderhouden.

Daarom wierd nu eene nieuwe insnyding ge-
maakt, evenwydig met de eerste insnydingen,
komende tot aan den hoek van den mond; de
kanten wierden afgescheiden en opgeligt, het
verharde vet wechgesneeden tot op den *buccinator*,



of liever de *membrana oris interna*, zoo diep mogelijk was, even voor de vereeniging der lippen, en buiten den *arcus zygomaticus*, niet zonder veel moeite, en met groote omzigtigheid, op dat de koon niet tot in den mond zoude geopend worden.

Aanmerkelyk is het, dat, daar deeze vetgezwollen opkomen, het geheele vetvlies opgezet word zelfs tusschen de spiervezelen van de naastleggende spieren, waar door dezelve van een gescheiden, en buiten staat gesteld worden, om te werken.

Vervolgens wierden de kanten wederom vereenigt, als in den beginne, de grond werd tot verettering gebragt, waarna het verharde vet wechsmolt, de mond de behoorlyke plaatsing weder kreeg, met behulp van het *capistrum simplex*, en deeze wang werd volkomen gelyk aan de andere, de hoogte van het *zygoma* en de litteekens uitgezonderd.



HEEL- EN ONTLEED-KUNDIGE
WAARNEEMINGEN,
VAN DEN HEERE

O L A U S A C R E L.

OVERGENOMEN UIT DE VERHANDELINGEN
VAN DE KONINGLYKE SWEEDSCHE ACA-
DEMIE DER WEETENSCHAPPEN.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.



HEEL-EN ONTLEED-KUNDIGE
WAARNEEMINGEN,

VAN DEN HEERE

O L A U S A C R E L,

OVERGENOMEN UIT DE VERHANDELINGEN
VAN DE KONINGLYKE SWEEDSCHE ACADEMIE DER WEETENSCHAPPEN.



I.

Aanmerking

Over Critische verzweeringen, na eene zwaare algemeen heerschende koorts, welke den dood veroorzaakt hebben, als men dezelve geopend heeft, doch door buikzuiverende middelen moesten verdreeven worden. (Abhandl. der K. Schwed. Akad. 1746. VIII. Band. pag. 188).

* * * * *
T * * * * *
* * * * *
* * * * *

ot hier toe is het, zoo wel by de
Leeraars der Geneeskunde, als by
hen, die deeze wetenschap geoef-
fend hebben, eene algemeen aange-
nomen regel geweest, dat, zoo dra zich critische
Kk 4 ver-

verzweeringen, na voorafgaande zwaare ziekten, aan de uitwendige deelen van het ligchaam vertoonen, de zieken buiten alle gevaar zyn, zoo fy by tyds geopend worden; doch de ondervinding heeft geleerd, dat deeze gedagte niet altyd zeker is. Wel is waar, foortgelyke verzweeringen leiden dikwils de kwaade stoffe af van de edele ingewanden naar de klieren van de huid, beletten daar door, dat 'er andere zwaare gezwellen ontstaan, geneezen dus langduurige tusschenpoozende, en gevaarlyke rot-koortsen, reddende daar door der zieken leeven: doch, 'tgeen my de meeste gelegenheid gegeeven heeft, om de oude meening in twyfel te trekken, en dikwils, by algemeen heerschende ziekten, geheel anders te werk te gaan, dan de gewoone manier van denken, en het gebruik mede bragten, is de volgende waarneeming.

In het jaar 1743. regeerde in July, Augustus, en September, in dat gedeelte van het Fransche leeger, welk van den Boheemschen en Baierischen veldtogt terug kwam, eene zwaare rot-koorts, welke volgde op eenen ongemeen kouden winter, de anderen-daagsche koorts in de lente, gebrek aan levensmiddelen in den zomer, slegte oppassing en geduurige vermoeidheid. Zoo dra de soldaaten tot rust kwamen, goed voedsel kreegen, wel opgepast wierden, na dat fy op de Fransche grensen waren gekomen, kreegen fy verzweeringen aan de ooren, onder de armen, en ook op andere plaatsen van het ligchaam,

haam, en ſcheenen zich door deeze verandering beeter te bevinden. Om deeze zuivering of ontlaſting nog meêr te bevorderen, behandelde ik alle de geene, welke zulke verzweringen kreegen in het Hospitaal, aan my toevertrouwt, in den beginne volgens de gewoone manier, bevorderende namentlyk de verzwering, openende, zuiverende, en ledigende dezelve op den regten tyd. Doch ik bragt het niet verder met de eerſte opening, dan dat ik de etter ontlaſte, en ſy ſtierven meêſtendeels van den vierden tot den agtſten dag na de opening. Deeze droevige omſtandigheid by zoo veele zieken maakte my opmerkzaam, om de overige beeter te helpen. 1. Nam ik in agt, dat, eer zich deeze verzweringen vertoonden, de zieken alle toevallen hadden, welke gewoon zyn, zich by zoo eene koorts te vertoonen. 2. Namen de toevallen af, zoo dra dezelfen voor den dag kwamen. 3. Bevonden zich de zieken 't allerbeſte, de verzweringen zeer ryp zynde, en gereed om open te gaan. Zoo dra men dezelfen opende, wierden de zieken zwakker, de toevallen kwamen weder, en ſy ſtierven meêſt alle binnen agt dagen daarna. 5. Als de gezwellen agt dagen ongeopend bleeven, hadden ſy daar van geen verder ongemak. 6. Onder het getal der zieken, welk in deeze maand over de honderd was, kreegen ſommige zulke gezwellen, welke, ſchoon men ettermaakende middelen gebruikte, zich ſchielyk verdeelden, na dat reeds

stoffe daar in vergaderd was, waar na de lyders den loop, en met etter vermengde afgangen kreegen, fluimen loosden, met bloed vermengde etter uit den neus ontlasten, en dus gered wierden. 7. De geopende verzweeringen droogden schielyk, en by dezelve kwam het heete vuur. 8. By die, welke zulke verzweeringen gehad hadden, en niet opgepast, maar altyd op de wagens vervoert geworden waren, had zich de etter zelve verdeeld, de opperhuid scheide zich af, en ook deeze bleeven in het leeven, schoon sy altyd ziekelyk en teeringagtig waren.

Deeze aanmerkingen overtuigden my, dat de levenskragten de onreine vogten afzonderden, naar de klieren by de ooren, onder de oxelen, en op andere plaatsen bragten, alwaar sy bleeven staan, en de uiteinden der vaten als ook het omleggende vet veranderden in eene vloeibaare etter, die vervolgens door de natuur zelve tot de klieren in den neus, de keel, en darimen afgeleid werd, doch by de meeste niet verdraagen wilde, dat de lugt zich met de etter in de geopende verzweeringen zoude vermengen. Ik besloot derhalven daar uit, dat ik geene verzweering van deezen aart meêr openen, maar aan de levenskragten, die met bekwaame voedfels behoorden onderhouden te worden, overlaaten moest, om de etter af te zonderen, en te kooken, zonder dit te helpen met rypmaaken-

kende middelen, of den voortgang door afleidende middelen te stuiten. Doch zoo dra sy op het openen stonden, begon ik aanstonds, den lyder te laxeerén, waar toe ik gebruikte eenen drank van rhabarber, manna, cassia, en epsoms-zout, ik gaf nauwkeurig agt op de werking daar van, en bevondt, dat deeze drank, twee of driemaalén gebruikt zynde, eene etteragtige slym ontlaste. Deeze handelwyze vermeerderde, tegen vermoede, de kragten van den lyder, de etter verminderde, de gezwollen wierden kleiner, verdweenen, en byna alle wierden gezond. Derzelver spys was een goede vleesch-soep zonder speceryen, en de drank een afkooksel van zoet-hout en gerst; eenige kreegen, in plaats daar van, wey met room van wynsteen of tamarinden bereid.

De rede, waarom ik in deeze gevallen ben afgegaan van de gewoone theorie, en gebruikelijke genees-wyze, om de zieken in den beginne sterk te laxeerén, wanneer zich het gezwel vertoont, was deels derzelver ongemee-
ne zwakheid, die niet eerder overwonnen was, dan wanneer de etter zich versamelde, deels ook de vergelyking deezer aanmerkingen met anderen over zoo eene ziekte, die ik in het voorgaande jaar te Parys had waargenomen, en welker toevallen met deeze volkomen overeen kwamen. De lyders waren toen ook niet ver-
ligt, voor dat de amandelen opzwellen, en
daar

daar door eene verandering beloofden, doch deeze kon niet verkreegen worden, zonder dat de stoffe weder terug ging, en dan was de lyder eenige dagen tusschen dood en leeven, en de etter nam den weg naar de bovenge-
noemde plaats. De buikzuiverende midde-
len begonnen dan eerst dienst te doen, welke
door den Hooggel. Heere FERREIN voorge-
schreeven wierden, na dat hy 'er in den begin-
ne eenige te vergeefs gebruikt had; de lyder
wied dan oogenschynelyk beeter, sterker, en
kwam tot volkome gezondheid.





I I.

Aanmerking

Over een eerstgebooren kind, welk, onaangezien eenen zwaaren stoot op het hoofd, dien het, nog in 's moeders lyfs zynde, kreeg, op den behoorlyken tyd ter waereld kwam, en drie weeken na de geboorte leefde. (*Abhandl. der K. Schwed. Acad. 1746. VIII. Band. p. 261.*)

Den twintigsten April 1746. wierd een jongetje gebooren, op wiens hoofd men aanstonds een gezwel ontdekte, zittende op het linker opperhoofds-been, zynde zoo groot, als een vuist, en van kleur, gelyk de overige huid. De vroedvrouw verzocht eerst den heelmeeſter SCHENBOM, om dit gezwel te beziën; deeze riep my ook daar by, en wy vonden dit gezwel zoo geſteld, dat het op eene plaats vaſt zat, by het aanraaken ongevoelig was, en zich zagt liet drukken, zonder dat het kind daar van ſtuipen kreeg, in ſlaap viel, of met het een of ander van die toevallen geplaagd wierd, welke met de drukking der herſſenen verzeld gaan.

Wy oordeelden egter, dat dit gezwel moeſt voorkomen uit de zelfſtandigheid der herſſenen, die door eene tegennatuurlyke opening in het
ge-



genoemde been te voorschyn kwamen, dewyl het grootste gedeelte van dit been scheen te ontbreken. De vroedvrouw zoo wel, als de moeder, verzekerden, dat de verlossing zeer schielyk was geweest, en dat het hoofd van het kind daar by niets geleden had. Men besloot daarom het hoofd met een bekwaam mutsje te drukken, op dat de hersenen, zoo sy mogten uitkomen; terug zouden gehouden worden. Dit deed men drie weken, zonder eenige verandering, intusschen zoog het kind, sliep veel, was de laatste dagen ongeduurig, en stierf na drie weken.

Ik opende het hoofd den dag na synen dood, in tegenwoordigheid van den Geneesheer Bäck, en bevondt, zoo dra de uitwendige bekleetselen van het gezwel losgemaakt waren, dat hetzelfde gezeeten was tusschen het vlies, welk het bekkeneel bekleed (*pericranium*) en het peesagtig uitspanfel van het hoofd (*involucrum aponeuroticum*), waar in het beslooten was, als in een' zak. Wanneer ik den zak opende, kwam uit denzelven eene dikke, stinkende, bloederige, etter. Het dunne gedeelte wechgelopen, en de zak volkomen geopend zynde, ontdekte ik een klomp bloed, zoo vast als lever, met eene bleekroode huid bedekt; de zak zelf was inwendig gerimpelt, en als verteert; het been, welk men te vooren geloofd had te ontbreken, was volkomen, en veel vaster, dan de overige beenderen van het hoofd.

Men

Men fcheide het been af, en maakte het los, en toen zag men, dat de vliezen der herffenen zeer dun, en bleek waren, en dat het dikke vlies aan het genoemde regter opperhoofds-been vaster was vereenigt. De herffenen zagen 'er flap, bleek, en wateragtig uit, derzelver holligheden waren met dunne, waterragtige, etter gevuld, hoe nader men kwam aan den grond van het bekkeneel, des te meêr waren de herffenen ontbonden, en met water en etter-klompen omvat. De gesteldheid der kleine herffenen was eenigzins vaster, maar het rugge merg was rondom met water en dunne etter omgeeven.

Alle deeze tegennatuurlyke omftandigheden aan het hoofd, en van de daar in befloote deelen, deden my denken, of het hoofd van het kind in de baarmoeder ook mogt gestooten zyn, en dat door deeze drukking en fchudding eenige bloedvaten geberften waren, waar door eene uitftorting van bloed veroorzaakt was. Ik ondervroeg de moeder, of fy van zoo iets bewuft was, en kreeg tot antwoord, dat fy, agt dagen voor haare verlosfing over een brug gaande, met den voet was uitgegleeden en gevallen, zoo egter dat fy daar van niet veel ongemak had befpeurd, zynde opgeftaan, naar huis gegaan, en hebbende den regten tyd haarer verlosfing afgewagt.


Schoon nu de moeder aanftonds na deezen val geen ongemak bemerkt heeft, en aan de verlosfing



ſing daar door ook geen nadeel is toegebracht ; toonden my egter de tekenen , die ik aan het hoofd van het kind vondt , dat de vrugt , die natuurlyk nederwaerts met het hoofd tegen het bekken gekeerd is , by den val nederwaerts geſchooten , en tegen het ongenaamde been gekomen is , zoo dat het bekkeneel geſtooten is , de herſſenen geſchud , de tedere bloedvaten van het *pericranium* en het dunne herſſen-vlies geberſten zyn , en de uitſtorting van bloed , zoo wel binnen als buiten het bekkeneel veroorzaakt hebben.

Had nu de moeder aanſtonds na den val eenen bekwaamen Geneesheer raad gevraagd , dan had veel ligt dit nadeel aan het kind door dienſtige middelen kunnen afgeweert of verminderd worden. Had ſy het ook aanſtonds na de verloſſing gezegd , dan had men zich in het oordeelen over de ziekte niet bedroogen , want men zoude met de grootſte zekerheid het gezwel hebben kunnen openen , en aan het uitgeſtorte bloed eenen uitgang verſchaffen. Zoo men dan ſoortgelyke uitſtorting binnen in het bekkeneel vermoed had , dan had men getragt , hetzelve te verdeelen , en daar door zoude het leeven van het kind hebben kunnen verlengd worden , zoo de natuur had willen medewerken. Ongetwyfeld verkorten zulke toevallen het leeven van veele vrugten en tedere kinderen.





III.

Proeven en Aanmerkingen

Over den gespleeten ruggegraat (*Abhandl. der K. Schwed. Akad.* 1748. X. Band. p. 291.).

Dat ongeboore tedere kinderen in het lig-
haam van de moeder allerley ziekten on-
dergaan, is eene bekende zaak. Veele komen
in de zwangerheid voort van de toevallige ziek-
ten en mislagen der moeder, doch de meesten
zyn haaren oorsprong verschuldigd aan het zaad
zelve, en aan de verborge oorzaaken, waar-
door het bedorven, en de vormeering van de
vrugt belet word.

Het eerste kan men by de ziekten der moeder reeds giffen, doch het laatste is tot aan de geboorte onbekend, verborgen, en dikwils zoo gesteld, dat men geene hulpe meer kan aanbrengen. De ongemakken, welke een kind met zich ter wereld brengt, zyn geslooten oogleden, lippen, gespleeten verhemelte, ruggegraat; te samen gegroeide vingers, teenen, en gesloote natuurlyke openingen; overvloedige deelen, mismaaakte beenen, en leden, met meer andere.

Ik zeg, dat de ziekten, die de vrugt- en moeder te gelyk uitstaan, meestendeels door middel van haare zichtbaare tekenen by de moeder bemerkt, en ontdekt worden, doch de moeder en vrugt staan egter menigmaal te samen eene gemeenzaame ziekte uit, zonder dat de tekenen by de moeder duidelyk genoeg zyn, dewyl de vrugt meestendeels daar door leid en aangedaan is.

Een duidelyk bewys daar van hebben wy in waterzugtige kinderen, die reeds in de baarmoeder zoo veel water in het hoofd, de borst, en den buik verzamelen, dat sy of in 's moeders lysf sterven, of met hun leven het leven van de moeder moeten redden, als sy het daglicht zien zullen, hoewel de toestand van de Moeder gedurende de geheele zwangerheid daar van geen zeker teken heeft kunnen geeven.

De *spina bifida*, of gespleeten ruggegraat, is een gezwel, welk met het kind gebooren word, een toeval by de waterzugt van het hoofd, voor de geboorte onkenbaar, en na dezelve, gelyk men gelooft, ongeneeslyk. Het vertoont zich by eerst gebooren kinderen op den ruggegraat, meestendeels op het heilig been met eene meêrdere of mindere uitpuiling, zynde in den beginne donkerblauw, doch naderhand van dezelfde kleur, als de huid. Als men met den vinger daar op drukt, word de zwelling minder, doch komt aanstonds wederom, zoo dra de drukking ophoud.

De

De oorzaak daar van is eene uitstorting van vogt binnen de herffen-vliesen van de vrugt, welk zich in 's moeders lighaam verzamelt heeft, en, zoo wel aan de zyden van het verlangde merg en het rugge-merg, als ook van de drie holligheden der herffenen door de vierde, in de vliefige buis, welke het rugge-merg bevat, neerzakt. Deeze vliefige buis, welke eene verlenging of uitzetting van het dikke herffen-vlies is, laat het water vry door tot onder aan het heilig been. Dit been is in eene vrugt van agteren volkomen open, gelyk men aan geraamten van zulke vrugten zien kan. Als het water zich meêr en meêr ophoopt, maakt het de vliefige buis flap, en zet haar uit, tot dat sy eindelijk door de genoemde agterste opening gedrongen word; daar uit ontstaat aanstonds een kleine zak, welke het water meêr en meêr uitzet, en tot eene ongelyke grootte brengt. Hoe langer men denzelven na de geboorte onaangevoert laat, des te grooter word hy. De heilige zenuwen worden gedrukt en getrokken, het rugge-merg word week, en dikwils van de *tunica arachnoidea* ontbloot, daarom bemerkt men meestendeels in de onderste leden eenige ongemakken, die niet kunnen worden wechgenomen, zoo sy by de geboorte reeds tegenwoordig geweest zyn, en naar maate van de grootte van het gezwel ook verslimmeren, 't geen niet kan worden verhinderd.

Opent men het gezwel, dan sterft het kind

L 1 2

kort

kort daarna. TULPIUS raad dit af, als volstrekt doodelyk *Obs. Med. lib. 3. cap. 29.* Ik kan niemand, die voor den vereerenswaardigen RUISCH deeze ziekte beschreeven, en *spina bifida* genoemd heeft, namentlyk in syn antwoord op ETMULLERS twaalfden brief. BOERHAAVE zegt hy, heeft dit ongemak eens gezien, doch niet geweeten, hoe het moest genoemd worden, beroepende zich op RUISCH, in syne lessen over de 112 *Apborismus.*

Het ongemak vertoont zich genoeg, doch, zoo wel vroegere als latere Schryvers hetzelfde voor ongeneeslyk houdende, heeft byna geen Schryver van eenig aanzien, behalven PLATNER in syne *Inst. Chirurg. rat.* §. 347. hetzelfde onder de overige uitwendige gezwollen aangevoerd, en veel minder eenige hulp voorgeslaagen, gelyk deeze ook niet gedaan heeft.

De gedagten, omtrent deszelfs waare oorzaak zyn zeer verscheide geweest. RUISCH houdt het daar voor, dat het ruggemerg op die plaats als ontbonden word, en eene byzondere waterzugt uitmaakt, *Obs. 34.* TULPIUS geloofde, dat de inbeeldingskracht van de Moeder by alleley gelegenheden zoo een' indruk op het kind kon maaken, *Obs. Med. lib. 3. cap. 29. 30.* Anderen zyn van meening geweest, dat eene breuk van den ruggegraat in het lighaam van de moeder daar toe gelegenheid gaf, dewyl de stukken der wervelen van den ruggegraat zich van elkan-

der

der scheiden, doch, dewyl het gezwel zit op het heilig been, welk van agter open is, is 'er geene breuk noodig.

Ik heb gelegenheid gehad, twee zulke gespleete ruggegraaten te onderzoeken, en vinde noodig, dezelve mede te deelen, dewyl sy zich in zekere deelen onderscheiden van die, welke de scherpsziende RUISCH heeft waargenomen, en door andere waarneemers aangetekend zyn.

In het jaar 1739. zag ik hier in Stockholm een eerstgebooren meisje, dat nauwelyks vier en twintig uren in de waereld was geweest. Eene onkundige vrouw berigte, dat het kind met eene bloed-blaas op den rugge gebooren was, welk zoo groot was geweest, als een hoener, dat sy hetzelve aanstonds had geopend, en dat het kind twee uren daarna was dood geweest. Deeze blaas zat midden op het heiligbeen, bestond uit de uitwendige bekleetselen, en inwendig uit een glad sterk vlies, welk uit eene langwerpige opening in het been te voorschyn kwam. Het onderste gedeelte van het rugge-merg lag bloot. De openingen in het been waren door de drukking van het water ongemeen verwyderd. Als het lighaam opgeligt wierd, liep 'er nog een weinig bloederig vogt uit de opening. Ik sneed de opening in het been eerst nederwaerts naar het staartbeen open, en vondt, dat het inwendige vlies van het ge-

zwel hetzelfde was met dat, welk den ruggegraat inwendig bekleed, vervolgens ging ik van onderen opwaarts tot aan de groote opening van het agterhoofds-been, en vondt het ruggemerg overal gezond, behalven in het gezwel, alwaar het dunner, slapper, en, zoo wel van boven als van onderen, met veele waterblaasjes voorzien was. Men opende het hoofd, de vlieden der hersenen waren gezond; de hersenen waren zoo vast, als natuurlyk, de zydelijke deelen der holligheden uitgezonderd, die week genoeg waren. De drie groote kamers of holligheden bevatten veel water, het *infundibulum* was geheel vol, de *canalis medullaris Sylvii* tusschen de derde en vierde holligheid was wyd, en kon eene middelmaatige pen van een gans bevatten; het water, welk deeze buis verwyderd had, had de vierde kamer insgelyks langs het rugge-merg afgeleid. In de *plexus choroideus* waren ook veele waterblaasjes. Dus kon ik duidelyk zien, hoe zich het water, in de holligheden der hersenen verzameld, van daar door den ruggegraat tot in het heilig been begeeven had.

De voeten van dit kind waren tegen elkander gekeerd. De oorzaak daar van bestondt in een tegen natuurlyk maaksel van de onderdeelen der voeten. De *astragalus* was mismaakt, en had geene geleding noch met de *tibia*, noch met den *calcaneus*, maar was met deeze beenderen samen gegroeit. Ongetwyffeld heeft deeze tegenna-
tuur-

tuurlykheid van de eerſte vormeering plaats gehad, en de waterzugt is naderhand daar by gekomen.

Wanneer ik my in 1742. te Straatsburg op-
hield, opende de beroemde ontleedkundige, de
Hr. HOMMEL, een dood jongetje, agt jaaren
oud. Het was gebooren met een klein blauw
gezwel op den rugge, 't welk de ouders niet
aangeraakt hadden. Het eene jaar verliep na het
andere; het kind groeide, wierd vet, doch
eenigzins bleek, kreeg alle natuurlyke werkin-
gen, alleenlyk kon het niet op de voeten ſtaan,
welke aan de knien verlamt, en ten opzigte van
het lighaam te zwak waren. Het ſtierf aan eene
borſtziekte, die aldaar gemeen was. Het ge-
noemde gezwel zat midden op het heilig been,
was zoo groot, als een vuift, had dezelfde kleur
met de huid, wierd, gedrukt wordende, een
weinig kleiner, was vol geelagtig water, be-
ſtond uit dezelfde deelen, als het boven be-
ſchreeven, doch de opening was zeer klein.
Het rugge-merg was onder het gezwel zeer
klein, en ſtyf. De inwendige deelen van het
hoofd waren gezond.

Men vindt over den geſpleeten ruggegraat
verſcheide aanmerkingen van ongelyke geſtel-
heid by TULPIUS, in de *Ephem. Nat. Cur.*, by
PLATNER *Inſt. Chir. rat.* §. 747. in not. aange-
haald. Het grootſte getal der waarneemers heeft
ongelyke gedagten gehad over den oorſprong

van het gezwel, doch fy maaken meest alle het besluit, dat het ongemak voor ongeneeslyk te houden is, en aan de natuur moet worden overgelaaten. Voor eene rede geeven fy op, dat zulke kinderen aanstonds sterven, wanneer het gezwel geopend word, doch anders zelden ouder worden, dan een jaar of vyftien maanden.

In tegendeel heeft myne tweede waarneeming, van het kind van agt jaaren, gescheenen gelegenheid te geeven tot een ander besluit, en tot een hulpmiddel voor dit ongemak. In deeze meening wierd ik versterkt door eene waarneeming aan een meisje van zeventien jaaren, welk de Heer BÄCK my de goedheid gehad heeft mede te deelen, en welke hem een fyner vrienden, de Heer VELSE in den Haag, geschreeven had.

„ Een meisje was gebooren met een gezwel op het heilig been of een gespleeten ruggegraat. Dit gezwel nam eenige jaaren in grootte toe, en kreeg de grootte van een hoenerey. Men bemerkte eene verlamming aan de ronde spieren van de blaas en den endeldarm, doch aan de onderste leden was geen ongemak, noch ten opzichte van het gevoel noch ten opzichte van de beweging. De Geneesheeren en Heelmeesters, die over dit gezwel geraadpleegd wierden, hebben, voor zoo ver ik my kan herinneren, alle proeven ter geneezing afgeraaden, en haar onaan-

geroert gelaaten. Voor korten tyd heb ik haar, in haar zeventiende jaar zynde, in deezen elendigen ſtaat gezien en onderzocht. Ik vondt de *spinæ offis ſacri* van derzelver vierde knobbelkje van elkander geweeken tot byna aan het einde, alwaar ſy wederom ſamen vereenigt waren. Het gezwel had dezelfde kleur met de huid, bevatte eene dunne ſtoffe, was iets kleiner, dan een hoener-ey, en kwam door de genoemde opening. Met de afgang en pisloofing was het, gelijk in den beginne.

Het zou my aangenaam zyn uit de gelcerde ondervinding van myn Heer onderregt te worden, of hy ergens geleezen of gehoord had van een' gefpleeten ruggegraat, die zoo veele jaaren gebleeven is, zonder in grootte toe te neemen, of te veranderen. Als ook, waar uit myn Heer meende, dat men de verlamming in de ſamentrekkende ſpieren van de blaas en endeldarm zou kunnen verklaaren, daar noch de beweging noch het gevoel in de onderſte leden ontbrak".

Schoon men nu een' gefpleeten ruggegraat onder de zwaarſte ziekten te rekenen heeft, met welken een kind kan ter wacrelde gebragt worden, en hoewel men zulke kinderen tot hier toe alleen aan de hulp van de natuur heeft overgelaaten, zoo ſchynen egter eenige voordeelige omſtandigheden, by het jongetje van agt en het meisje van zeventien jaaren, ons aan

te spooren, by de tegenstrydige ondervinding ons niet te voegen. De regte kennis der ziekte, het maakfel der leidende deelen, en de vergelyking van verscheide aanmerkingen behoorden den weg tot verderen voortgang te baanen. Ik geloof daarom met regt, by de volgende gedagten te kunnen staan blyven.

1. Dat de gespleeten ruggegraat geen gebrek by de eerste vormering (*vitium conformationis*) is, wanneer dezelve zich op het heilig been bevind, zoo lang dit been open is, en een verzameld vogt op dien tyd door de wervelen der rugge gaan, en derzelver peesagtige buis uitzetten kan, het tegendeel heeft plaats, als het ongemak ontstaat aan de wervelen van den hals, rug, of beenderen, 't geen egter zeer zeldzaam is.

2. Dat dit ongemak een gevolg is van een waterhoofd, en niet eene waterzugt van het ruggemerg of den ruggegraat (*hydrops spinæ dorsæ vel medullæ spinalis*), welke uit eene ontbinding van het rugge-merg zoude ontstaan. Men zie RUISCH *Obs.* 34. PLATNER *Inst. Chir. rat.* §. 747.

3. Dat de wateragtige zwelling op het hoofd, welke de kinderen dikwils met zich ter waereld brengen, volkomen van denzelfden aart is. Als het water zich ophoud buiten de hersenen of derzelver vliessen, dan dringt het door de naaden

den van het bekkeneel, en brengt wateragtige gezwellen rondom hetzelfde voort; maar verzameld het zich in de holligheden der herffenen, dan is de weg door den ruggegraat nederwaarts de gemakkelykste.

4. Dat het rugge-merg by deeze omftandigheid niet altyd verlooren gaat, maar naar maate van de verfchillende fcherpte en het verblyf van het water week, doch niet ontbonden word, gelyk de herffenen in kinderen, die een waterhoofd hebben, ook niet altyd verlooren gaan, maar flegts weeker worden. Men zie Ruisch op de aangehaalde plaats. Zelfs kan het rugge-merg ook ftyver worden, gelyk myne tweede waarneeming toont.

5. De kinderen leeven daar mede veel langer, dan vroegere waarneemers zeggen. Wie weet, of deeze elendige niet volwaffen konnen worden, fchoon het ons ontbreekt aan toereikende waarneemingen.

6. Men moet deeze gezwellen op den rugge-graat of het hoofd niet openen, ten minften zoo lang de kinderen nog teder zyn. Het koft hun altyd het leeven, het mag voorbedagt of toevallig gedaan zyn.

7. De huid, welke in den beginne zeer dun, en dikwils doorfchynende is, krygt met den tyd de natuurlyke vaftigheid en kleur.

8. Men

8. Men heeft by deeze ziekte zoo veel re-
de, om hulpmiddelen te beproeven, als by eene
waterbreuk, welke een kind met zich ter wae-
reld brengt. Wel is waar, de plaats is hier
veel gevaarlyker, maar daarom moet men des
te voorzigtiger zyn. Men zoude kunnen be-
ginnen met inwendige middelen die 1. het water
van het hoofd afleiden. 2. De vaste deelen der
herffenen versterkten, want als men het zoo ver-
zou kunnen brengen, dan neemt men den oor-
sprong van het gezwel wech, en helpt met des
te meêr zekerheid. Uitwendig zoude men ver-
deelende en samentrekkende middelen konnen
gebruiken, tot dat de huid meer sterkte gekree-
gen had. Voornamentlyk zoude men alles moe-
ten vermeiden, dat vast aan de huid kleefde,
als taaije pleisters, zalven, en soortgelyke zaa-
ken, waar door de zwelling of open gaat, of
verzweert, ja in het vuur overgaat, waar van de
uitgang doodelyk is. Eene zagte, langzamer-
hand vermeerderde, drukking met een bekwaam
verband, noodzaakt het water uit den zak in
den rugge - graat te gaan, geeft aan den zak gele-
genheid, om zich samen te trekken, en aan de
opening in het been, om zich te sluiten. De
geheele ruggegraat moet zoo wel, als het hoofd,
met de beste hoofd- en zenuw-middelen, (*cephali-
ca*, *nervina*) besmeert worden.

9. Zoo de oorsprong der ziekte, het zy door
middelen, of door de eige werking der natuur
wechgenomen word, gelyk by den jongen van
agt

agt en het meisje van zeventien jaaren ongetwyfeld gefchied is, dewyl fy alle de ziels-vermogens, gelyk andere menfchen, hadden, dan blyft de fpleet in den rugge-graat, welke te voo- ren een toeval daar van was, uit gebrek van be- hoorlyke oppaffing, als eene byzondere ziekte over. Heeft het water dan niet al te veel tyd, om de goede gefteeldheid van het rugge-merg te veranderen, dan kan de geneezing daar van op gelyke gronden ondernomen worden.

10. By waterzugtige kinderen, welker hoofden aanftonds vol water loopen, geloof ik, zoude deeze proef vrugteloos zyn, doch die, welke niet zoo veel water in het hoofd hebben, en by welke men andere goede tekenen vindt, die in kragten toeneemen, en vrolyk zyn, heeft men veel goeds te hoopen.

11. Kon het kind, waar van RUISCH fpreekt, vyftien maanden, en konden de andere agt en zeventien jaaren leeven, zonder dat fy op- gepaft wierden, waarom zoude men op geene volkome geneezing hoopen by die, welke na be- hooren opgepaf en behandeld worden.





I V.

Proeven omtrent het nut van een Seton tegen eene blindheid, die op eene anderendaagsche koorts volgde. (Abhandl. der K. Schwedische Akademie 1749. XI. Band. pag. 284).

Een Seton noemt men een koord, welk door de gemeene bekleedfelen van het ligchaam op de eene of andere plaats door middel van eene naalde gebragt word. De draad word gemaakt van zyde, een lapje linnen, van menschen- of paarden-hairen. Deszelfs gebruik is zeer oud, en grootendeels met hetzelfde oogmerk, als de fontanellen, aangepreezen, om namentlyk scherpe stilstaande vogten van de eene plaats naar de andere af te leiden, gelyk by aanhoudende jigtpynen noodig is, of om uitgestorte vogten, gelyk in wateragtige gezwellen, te ontlasten, en tot soortgelyke oogmerken meêr. De schynbaare hoop, en het wezenlyke nut, welk men reeds van ouds in het gebruik van deeze middelen gevonden heeft, hebben deszelfs gebruik by menschen en vee algemeen gemaakt, doch dewyl het wreeder schynt te zyn, en pynelyker is, dan een fontanel, hebben de zieken en Geneesheeren liever het zagtste verkoofen, schoon ook daar door maar de helft van het oogmerk bereikt wierd; en dus word

word dit middel meêr by het vee, dan by de Menschen, gebruikt, gelyk ten vollen blykt uit de manier, op welke de Smids de paarden geneezen.

De werking van het zetten en het gebruik van een feton is van tweeërley aart; vooreerst by het zetten zelfs, wanneer de pynelyke drukking der stompe naalde door de taaye huid, eene gevoelige trilling in de zenuwen van het geheele hoofd en den hals verwekt; vervolgens, als de sterke zwelling van eene zoo lange wonde, die onder de bekleedselen tusschen beide de openingen is, en daagelyks door het koord geprikkeld word, de vogten naar het leidende deel aftrekt, en merkelyk ontlast.

In deeze opzigten heb ik dikwils nut gezien van een feton, doch voornamentlyk by eene zeldzaame blindheid, welke gelegenheid tot de volgende waarneeming heeft gegeven.

Van den herfst 1743. tot in den zomer 1744. regeerde eene anderendaagsche koorts in de kwartieren, alwaar de Fransche foldaaten Cantonneerden aan den Rhyn, by *Lauterburg* en *Fort-louis*. Veele zieken wierden gebragt in het Hospitaal te *Lauterburg*, aan myne zorg toe vertrouwt. In September en October 1743. hield deeze koorts volkomen den loop van eene derdendaagsche, wierd ook door geringe middelen gestuit, en grootendeels zonder den koorts-bast.

Som-

Sommige storten in, andere niet, en sy wierden alle gezond, zonder dat 'er andere ziekten op volgden. Doch op het einde van October, en laater in den winter, begon deeze koorts zeer zwaar te worden, en beroofde de zieken, als sy hen verliet, van het gezicht. Het getal der zieken, welke 's winters in het Hospitaal waren, was zeer aanmerkelyk, doch ik weet geen' eenen, die geen letsel aan het gezicht gekreegen had, wanneer de koorts ophield; veele verlooren een oog; veele beide oogen; weinige kwamen daar van af met troebele oogen. Als sy in February na den derden of vierden aanval zonder het gebruik van den koorts-bast ophield, wierden de zieken aan een oog, of aan beide blind. Sy, die den koorts-bast gebruikten, na dat sy negen, tien, of meêr aanvallen uitgestaan hadden, en dus de koorts kwyt raakten, wierden egter ook blind, en kreegen de koorts weder, zonder dat daar door egter de blindheid wechgenomen wierd. Was de een of ander, by gebrek van oppassing, twee of drie maanden by aanhoudenheid met de koorts geplagd, en wierd hy dan uit het kwartier in het Hospitaal gebragt, dan was hy zeer vermagerd, doch had egter het gezicht. De koorts-bast stuitte in voortgelyke lyders de koorts niet, sy gebruikten den geheelen tyd door bittere zouten, en aftreksels, en verlooren de koorts langzamerhand tegen de lente, wanneer sy slegts troebele oogen en een moeyelyk gehoor kreegen, 't geen egter met de vermeerderende kragten ver-

verdween. Men kan gemakkelyk begrypen, dat elk, die door deeze koorts aangetaft wierd, daar van verschrikte, wegens het gevaar om het gezicht te verliezen, en het bekommerde my ook niet weinig, daar ik zoo veele blinde, die ziende in het Hospitaal gekomen waren, moest aantekenen op de lyft der zieken.

Men had geene moeite gefpaard, om hen by te ftaan en te helpen. Dewyl fy aanftonds blind wierden, zoo dra de koorts ophield, zag men duidelyk, dat de vogten, welke deel aan de koorts hadden, zich nu plaatften op de zenuwen van het gezicht of het oog, en derzelver werking verhinderden. Ik tragte deeze vogten door de fterke prikkeling der fpaanfche vliegpleifters in den nek of onder de armen wederom in beweeging te brengen, gelyk ook door vroegtydige buikzuiveringen, aderlatingen op den voet, en uitwendige verdeelende middelen op de oogen, daar van kwam by fommige de koorts weder, doch by niemand het gezicht. Aan eenige liet ik om den anderen dag geeven een zagt braakmiddel uit den *tart. emeticus*, welk met buikzuiverende middelen vereenigt was, doch zonder eenig nut.

Een Dragonder, die agt dagen vry van de koorts, en blindheid was, wierd door my met een gloeiend yzer in den nek gebrand. Hy zeide, op dat oogenblik licht en vonken voor het oog te zien, doch was naderhand wederom

M m

even

even bliud. Deeze begon den vierden dag na de operatie licht te zien, doch dit voordeel had den zevenden dag nog niet toegenomen. Hy ftelde voor, of een nieuw branden, hoe wreed dit ook fchynen mogt, hem fyn gezicht ook zou kunnen herftellen; men volgde fynen raad, doch hy had daar van niet eerder nut, dan den vyfden dag na de operatie, wanneer beide openingen fterk liepen, en hy dagelyks aan fyn gezicht beterschap bemerkte, 't geen hy ook eindelyk volkomen wederkreeg.

In deezen tyd, in December 1743, hadden zeer veele het beklagenswaardige lot, van de koorts verloft te worden met verlies van hun gezicht, niemand, dan deeze Dragonder, had eenige hoop tot beterschap gegeven, en ook met deezen ging het langzaam.

Ik nam eenen aanvang, met aan deeze blinden een feton in den nek te zetten, na dat fy agt of veertien dagen in zulke omftandigheden geweest waren. Terwyl de operatie gefchiede, riepen fy meest alle, gelyk de Dragonder, dat fy licht zagen, ja zelfs de raamen in den muur, doch deeze vreugde verdween wederom aanftonds. Hier uit befloot ik, dat, als men de feton aanftonds zetten kon, zoodra het gezicht verlooren ging, men een dubbeld nut daar van zoude hebben. Met dit inzicht, lette ik nauwkeurig op de tyden van de koorts, en of de aanvallen in vier- en twintig uren voorwaards of

agterwaards gingen, en beval de knechts, welke de wagt hadden, als ook de oppassers, volgens deeze uitrekening nauwkeurig dag en nacht te geeven op alle, die de koorts hadden, en in dezelfde zaal lagen, of de een of ander, die de koorts moest krygen, dezelve niet kreeg. Deeze moesten sy wakker maaken, en vraagen, of sy zagen, dan blind waren. De eerste proef nam ik zelve, en vondt ook twee zulke nieuw geworve foldaaten, die zonder koorts-bast van de koorts bevryd, doch blind waren. Ik zette hun aanstonds een seton met eene stompe naalde en draad van boom-wol. Dit was 's nagts om elf uren, en ten agt uren 's morgens deed ik het gewoone bezoek, en vondt deeze twee tamelyk wel ziende.

By dit bezoek viel de tyd in, op welken een Hufaar de koorts krygen moest; syn gezicht was aan een oog reeds ten zeven uren des morgens wech, schoon de koorts niet eerder, dan ten negen uren komen moest. Ik zette hem aanstonds een seton. Twee uren na de operatie begon hy te zien, en kreeg het gezicht in vier- en twintig uren volkomen weder.

Alle, die nog in de koorts lagen, en met zekerheid den koorts-bast gebruiken konden, maakten daar mede een begin. Ik liet wederom den tyd van de koorts afwagten, vondt hun van koorts vry en blind, gelyk de voorige, die dit middel niet hadden gebruikt. Men zette hun,

zonder vertraagen, een feton, en bezorgde hun in twee of drie dagen het gezicht wederom.

Uit nieuwsgierigheid beproefde ik, om by twee zieken zes of agt uren, eer de koorts komen moest, een feton te zetten, en fy namen intuffchen alle uur twintig greinen vanden koortsbast. De koorts bleef wech, doch de oogen wierden egter duifter; fchoon niet in eenen zoo grooten graad, dan by de andere, en fy overwonnen zulks in den gelyken tyd met de overige.

Deeze omftandigheid was by andere zieken niet zoo algemeen, als by de Soldaaten, gelyk ik in de ftad en de omleggende dorpen bemerkte.

Eenige van deeze lyders kreegen aanhoudende koortfen, en zulke zeldzaame verzweeringen, als ik in de Verhandeling voor het jaar 1746. befchreeven heb: zie pag. 519.


Nu verminderde de fchrik by hen, die de koorts kreegen, dewyl fy wiften, dat de feton hun van de blindheid helpen zoude. De Hr. LAUNAY, onze Krygs-Commiffaris, werd in Maart 1744. overvallen door eene anderendaagfche koorts; na vyf aanvallen bleef de koorts wech, en hy verloor het gezicht aan het linker oog. Hy was bewuft van het nut van een feton in deeze gevallen, doch hy meende, dat ik dit middel flegts uitgevonden had, om de geneesmiddelen en moeite by de foldaaten te fpaaren,
en

en bad my, te beproeven, wat men anders met nut daar tegen gewoon is te gebruiken. Ik deed dit, doch even vrugteloos, als in het begin van dit berigt gezegd is. Na verloop van eene maand onderwierp hy zich aan de operatie, doch 'er waren drie weeken noodig, eer hy in het blinde oog het gezicht weder kreeg. Evenveel tyd hadden ook noodig die geene, welke in den beginne twee of drie weeken vertraagden, eer de seton gezet wierd.

Ik heb ook veel nut gezien van een seton in menschen, die zederd korten tyd gek geworden waren. By twee ben ik alleen ooggetuigen geweest, dewyl de Hr. SCHENBORN dezelve gezet heeft.

Behalven het nut, welk de opgegeeven waarneeming in de geneeskunde geeft, leert dezelve ook, hoe moeyelyk het is voor eenen Geneesheer, in eene uitgestrekte praktyk proeven te doen, waar op hy zich met zekerheid verlaaten kan. In Hospitaalen en Gasthuisen heeft men gelegenheid te zien veele, die alle dezelve ziekte hebben, derzelver toevallen te vergelijken, onderscheide proeven te neemen, en eindelyk de uitkomst aan te tekenen. Een of twee zulke lyders met koortsen, die in een half jaar op onderscheide tyden voorgekomen waren, hadden my nauwelyks daar op gebragt, om de blindheid als een gevolg van de koorts aan te zien, doch het getal benam allen twyfel.

Het was daarom geen wonder, dat kundige geneesheeren klaagden over het nadeel, welk het Vaderland door gebrek aan Hospitaalen leed, dewyl men ziet, en genoegzaam bewysen kan, hoe veel nut aan de kunst en het gemeene welzyn toegebracht word door eene zorgvuldige en medelydende oppassing der zieken, het geen de Heeren ROSEN EN BÄCK in de redenvoeringen, daar over by het afleggen van het *Præsidium* in de Vergadering van de Koninglyke Academie der Weetenſchappen gehouden, ook ten klaaſten getoont hebben.





V.

Beschryving van eenen Boer, die met een been ter waereld is gekomen (Abhandl. der K. Schwedischen Akademie 1750. XII. Band. pag. 18.)

De Boer was zes- en twintig jaaren oud, frisch, en gezond, doch zonder heup, dey, been, en voet, aan de regter zyde gebooren. Het regter heup-been was onkenbaar, zoo dat men niet het minste teken aan de regter zyde vondt. Hy was van jongs af gewoon met krukken onder de armen schieelyk voort te gaan, te loopen, ja hy kon zelfs met de wagen of ploeg reiden, zoo dat hy in dit en ander boerenwerk niet behoefde te wyken voor iemand, die syne leden volmaakt had.

De linker heup, dey, en voet waren natuurlyk, doch deeze ontbraaken aan de regter zyde. De ruggegraat begon met de lenden-wervelen van de linker naar de regter zyde te gaan, en het staartbeentje eindigde, alwaar de regter liefsch moest zyn, digt boven het fundament. Het heiligh-been en het staartbeen namen de plaats van het regter ongenaamde been in. Het fundament was twee vinger-breette van den balzak naar het einde van het staartbeen, hooger, dan gewoonlyk is, op de plaats, welke de regter liefsch

onvolmaakt voorsteld. De bilnaad (*raphe*) ging dus niet van boven naar onderen, maar scheef van de regter naar de linker zyde; de tceldeelen waren op de gewoone plaats, doch in den balzak was maar eene bal, die syne vaten van de linker zyde kreeg. De bal en zaadvaten waren de helft dikker en grooter, dan die geweest zouden zyn, zoo hy twee deyen had gehad. De navel was aan de linker zyde, eene hand-breette meêr naar de zyde en naar beneden, dan gewoonlyk is. Gelyk deruggegraat naar de regter zyde ging, zoo strekte zich de witte streep naar de linker. Dus waren de twee onderste afdeelingen van den buik in eene onnatuurlyke plaatfing. Het voorste gedeelte strekte zich uit naar de linker, en het agterste naar de regter hand; de regter zydelyke deelen naar vooren en de linker naar agteren. Deeze plaatfing maakte, dat de regter ribbe meêr naar vooren stond, dan naar agteren. De linker dey was van boven zeer dik, en zoo wel daar om, als ook uit hoofde van het gewoone gebruik, om het lighaam te ondersteunen, by het eerste aanzien midden onder den buik. Als hy den afgang loofen zoude, moest hy dit been ergens tegen aan drukken, en met een overgeboogen lighaam zulks naar de regter zyde doen, dewyl de endeldarm benevens de spier, die denzelven samentrekt, syne opening niet naar onderen, maar naar de regter zyde had.




V I.

*Waarneeming van eene aanmerkelyke verzwearing
zonder voorafgaande ontsteeking (Abhandl. der K.
Schwedischen Akademie 1752. XIV. B. p. 285).*

In January 1746. wierd ik geroepen by eene Juffrouw van twaalf jaaren. Men berigtte my, dat fy drie maanden zeer ziek was geweest. Eene aanhoudende koorts met verwisselende koude en hitte, slaapeloosheid, sterk nagt-zweet, en soortgelyke toevallen meêr, hadden haar de kragten benomen, en volkomen uitge-teert. Voor drie weeken had fy begonnen pyn in de regter heup te voelen, naderhand had de-zelve dagelyks toegenomen, en daar by was ook gekomen eene zwelling in de dey, en onver-moogen op deezen voet te staan. Eerst wier-den verdeelende, daar na weekmaakende, stoo-vingen gebruikt. Na verloop van drie dagen was het reeds zoo ver gekomen, dat, behalven de aanmerkelyke pyn in het deel, en eene rood-heid in de huid, eene aanmerkelyke, vloeibaa-re, stoffe den heelmeeſter aanzette, om het ge-zwel te openen. De infnyding was drie vinger-breette lang, en voor dit gezwel te klein. Meêr dan zefstien oncen etter is daar uitgelopen, en de laafte dagen is by het verband ook veel te voor-

schyn gekomen, waar by de zwellling en pyn in het been eer toe- dan afnam. De Lyfartz PETERSON was tegenwoordig, wanneer ik deeze zieke voor 't eerst bezogt. Het ongemak bestondt in eene verzwearing, welke na eene langduurige koorts ontstond; de geheele dey was dik en gezwollen. De opening was voor de helft geneezen, de geele etter liep op alle plaatsen rykelyk daar uit, waar men ook op het been drukte. Ik kon met de sonde rondom het been onder de huid komen; en hier uit bemerkte ik, dat het vet-vlies onder de *fascia lata* volkomen verteert was. De eerste insnyding, welke gemaakt was eenen overdwarschen duim aan den buitenkant van den grooten draaijer, wierd naar boven en naar onderen verlengd. De oorzaak, waarom na de eerste insnyding nog een gezwel overgebleeven was, wierd toen aanstonds ontdekt. Onder de *fascia lata* was eene byzondere zak, die met de huid even ver geopend wierd. De quantiteit van de etter, die toen wechliep, was zoo groot, dat men dezelve niet kon meeten. De onderleggende spieren waren van al het vet volkomen gezuiverd, zoo dat de vinger gemakkelyk naar boven en naar onderen tuschen dezelve en de *fascia lata* kon bewoogen worden, doch niet geheel in de rondte van het been. Wegens deeze aanmerkelyke verteeringen, als ook om des te zekerder eene pypzweer voor te komen, maakte men aanstonds de insnyding grooter naar boven en naar on-

onderen. Vervolgens gebruikte men de gewoone middelen met een' versterkenden kruiden-wyn tot eene stooving, en eene uitdryvende zwagtel wierd aangelegd. Het ongemak was geneezen, en de lydereffe in staat, om aan het einde van de volgende maand zonder ongemak te gaan. Het been is naderhand wederom zoo dik geworden, als het andere, en alle spieren beweegen zich vry. Zoude ook het vet-vlies, dat verteert was, weder aangegroeit zyn?





V I I.

*Waarneeming van eenige ongeneeslyke been-beder-
vingen. (Abhandl. der K. Schwedischen Akade-
mie 1754. XVI. Band. pag. 282).*

De Geneesheeren worden van onkundige dikwils beschuldigd, dat sy zoo ligt overgaan tot het afzetten der leden. Ik ontken het misbruik hier in zoo weinig, als in andere menschelyke verrigtingen; de langduurigheid van tyd, en gelukkige doch onverwagte toevallen, verschaften somtyds raad en hulp in gevallen, waar in men zulks het minst zoude verwagten. Kundige lieden zullen egter ook toestaan, dat van een groot getal van ope en verouderde ongemakken aan de beenderen nauwelyks een vyftigste gedeelte kan geneezen worden.

Elk een weet, dat oude, en veele jaaren lang weinig getelde, ongemakken aan de beenderen, by ons in het Noorden, vooral by arme lieden, zeer zwaar, gevaarlyk, of onmogelyk te geneezen zyn; doch sy willen alle de oorzaak niet begrypen, daar de theorie zoo duidelyk van het zuiveren der vogten, en het afschilferen der aangedaane beenderen spreekt. De op de bygevoegde plaat afgebeeld, wechgenomen, en ontbloote beenderen, bewyzen de moeyelykheid,

heid, ja zelfs de onmogelykheid, om dit in het werk te stellen. Kan men ontkennen, dat het afzetten der beenderen het zekerste middel is; en moeten zulke elendige, als menschen, die voor het algemeen onnut zyn, daar toe niet aangespoord, maar niet daar van afschrikt worden.

De derde afbeelding op de eerste plaat ver-
toont beide pypen van het regter-been van een
boer, die eenige jaaren met eene ope beenbe-
derving is geplaagt geweest. Hy was te vooren
uitgeteert, doch, na het wechneemen van het
been, kreeg hy fyne volkome gezondheid weder.
A. Vertoont de groote pyp, die in de midden ge-
boogen is. a. eene plaats, die zagt, en uitgeteert is
tot op het merg en in de holligheid van het been.
b. een gedeelte, dat deels zagt, deels gezwollen
is door het beensap. B. De kleine pyp, overal
deels zagt, en ingevreeten, deels opgezwollen,
en vol beenschilfers. Deeze zyn gevolgen van
eene uitstorting van het beensap, welk om het ge-
heele been als stolt, gelyk men zien kan by a. a. a.
a., en door de scherpe randen den toestand veel
zwaarder en ongeneeslyker maakt.

De afbeeldingen, met vier getkend, vertoo-
nen de bovenste einden van de onderste arm-
py-
pen, en het onderste einde van de bovenste,
van de linker zyde. Derzelver ongeneeslyke
toestand blykt ten klaarsten uit de vergelyking
met de uiteinden van andere gezonde beende-
ren,

ren, die aan deeze in grootte gelyk zyn. A. Het bovenfte gewrigt van de groote arm pyp, ongemeen opgezwollen, aangevreeten, en met fcherpe stukken been bezwaart. B. Hetzelfde gewrigt aan een gezond been. C. Het bovenfte gedeelte van de kleine arm-pyp plat, en als tot een gefmolten. D. Hetzelfde gedeelte aan een gezond been. E. Het onderfte gedeelte van het opperarm-been. Deszelfs toefland blykt uit het onbefchadigde gedeelte van foortgelyk been. F.

Een afgedankte knegt van de Artillerie, die voor verlooren gerekend wierd, wierd door het afzetten geholpen, doch eene zwaare en hardnekkige uitflag over fyn lighaam gaf niet veel hoop tot eene volkome geneezing, blykende daar uit, dat 'er in de vogten eene ongeneeslyke fcherpte was.

De vyfde afbeelding vertoont de pypen van het linker been van eenen matroos. Door de afzetting is hy volkomen weder herfteld. A. De groote pyp. a eene weeke opgezwolle uitzetting. b. b. b. foortgelyke verhevenheden. B. De kleine pyp. a. a. a. plaatsfen, die wechgevreeten, opgezwollen, en door het beenfap wederom fcherp geworden zyn.



V I I I.

Beschryving van eene dubbele Baarmoeder (Abhandl. der K. Schwedischen Akademie 1761. pag. 306).

By eene vrouw van zes- en dertig jaaren, die onlangs in ons Hospitaal stierf, heb ik eene dubbele baarmoeder gevonden, en, dewyl dit een zeldzaam geval is, oordeel ik noodig daar van een berigt te geeven.

Sy had twee kinderen ter waereld gebragt, die nog leefden. De zoon is nu in syn tiende jaar, de dogter in haar zevende. Na den laatsten kraam begon sy te klaagen over eene branding en hitte in de teeldeelen; de stonden wierden van tyd tot tyd rykelyker en pynelyker, waar door sy zeer afgemat wierd. Eindelyk veranderden dezelve volkomen in eene bloedstorting, zoo dat sy van het land naar Stockholm komen moest, en in het Hospitaal hulp zoeken.

By de onderzoeking vondt ik aanstonds, dat sy eene uitzakking van de baarmoeder had, en dat dezelve verhard was. De uitzakking werd gemaakt door het bovenste gedeelte van derzelve hals, welke het digste aan den mond,
hard

hard en zoo groot was, als een hoener-ey. Hetzelve was niet open, maar viel by de geringste persing uit, en vertoonde zich buiten de teeldeelen.

Daarenboven was aan den onderkant van den mond der baarmoeder, tegen over de andere gesteld, nog een gezwel, insgelyks verhard, doch van plaats niet veranderd. Dit kon men met den vinger gewaar worden.

Deeze twee gezwellen gaven, tot groote verwondering, veel bloed, welk als uit dezelveen zweette, doch vooral kwam hetzelve uit het bovenste, welk, aan zich zelve overgelaten, altyd buiten de scheede hing. Dit, door de wryving van het linnen, de scherpte van de pis, die daar tegen dikwils kwam, en door de lugt, aangedaan zynde, had eene paersche, en byna purperagtige, kleur gekreegen, en gaf uit alle plaatsfen dun scherp bloed.

Op dat derhalven deeze deelen, of door de ziekte zelve reeds voor lang gezwollen, of door de gedaane reis beschadigd, eenigzins zouden flinken, liet ik de vrouwen leggen op den rugge met de heupen een weinig hooger.

Verscheide middelen wierden ter hulp genomen, welke het bloed van de verslapte deelen zouden afleiden, en de quantiteit der stonden bepaalen, namentlyk aderlatingen op den arm,
be-

bedaaende en verdoovende middelen, waar by gevoegd wierden plaatselyke ontbindende en versterkende.

Deeze gaaven in den beginne hoop van eene gelukkige uitkomst. Na dat sy zich drie weeken zeer stil gehouden had, en nu vry wel bevondt, stondt sy eindelyk op uit het bed, en droeg tegen de uitzakking een' behoorlyken ring.

Doch deeze vreugde was van geenen langen duur, want, naa dat sy twee dagen het bed verlaaten had, kreeg sy eene aanhoudende ontfteekings-koorts met eene zoo aanmerkelyke traagheid, dat ik voor het vuur vreesde. Ook wierd ik in deeze gedagte niet bedroogen.

Den vierden dag verergerde alles; de zwakke en dikwils tusschenpoozende pols, de spanning van den buik, het koude zweet van aangezicht en handen, gaven te kennen, dat de onoverwinnelyke vyand voor de deur was. Den zesden dag stierf sy.

Ik oordeelde het der moeite waardig, het lyk te openen, en deed dit in tegenwoordigheid van veele. Men meende de baarmoeder ontftooken, en de overige nabuurige deelen ook aangedaan te vinden. Ook zag men geene duistere blyken van eene verettering in den beneden buik. Een stinkend vogt vulde niet alleen het bekken, maar

ook een groot gedeelte der darmen dreef in het zelve. De banden der baarmoeder, vooral de breede, waren daarenboven ook ontaart, zoo dat op de nevensgaande Tweede en Derde Plaat deeze deelen niet volkomen hebben kunnen worden afgebeeld.

Het aanmerkelykste was, dat de baarmoeder dubbeld gevonden wierd, daar in verschillende van die, welke de Straatsburgsche Hoogleeraar, de Heer EISENMANN, in 1752. waargenomen, en op eenige keurige platen zeer nauwkeurig afgebeeld heeft, dat in deeze laatste twee schreeden waren, waar van elk de tekenen van maagdschap hadden, en dat de lighamen der twee baarmoeders evenwydig tegen elkander gelegen waren, mogelyk, om dat sy nooit bevrugt waren geweest; daar in tegendeel de baarmoeders, die hier afgebeeld worden, van elkander verwyderd zyn, hebbende de vrouw, gelyk gezegd is, ook twee kinderen ter waereld gebragt.

Eenige gevolgtrekkingen, schoon sy niet ongepast en onnut zyn zouden, hier uit af te leiden, laat ik over aan de *Physiologi*. Hoe veel gemakkelyker zal eene overbevrugting plaats kunnen hebben in eene vrouw met eene dubbele baarmoeder, dan in eene, die 'er maar eene heeft!

De aanmerkingen van den Hr. EISENMANN over de dubbele baarmoeder, als ook de gedachten

ten van den Hr. WAHLBOM omtrent de overbevrugting, in de Verhandelingen van de Koninklyke Sweedsche Academie voor het jaar 1761. geplaatst (*), verdienen geleezen te worden.

Tweede Plaat.

- A. De regter Baarmoeder.
 - a. Het regter eyerneck.
 - b. b. b. De regter trompet.
 - c. c. c. Een gedeelte van den regter breedenden band, en de *alæ vespertilionis*.
 - d. De franjes van de regter trompet.
 - e. e. Het bovenste gedeelte van den rondenden band.
 - f. f. De zaadvaten van de regter zyde, *corpus pampiniforme* genoemd.
- B. De linker Baarmoeder.
 - g. Het linker eyerneck.
 - l. l. De linker trompet.
 - i. i. i. Een gedeelte van den linker breedenden band, en de *alæ vespertilionis*.
 - k. De franjes van de linker trompet.
 - l. l. De linker ronde band.
 - m. m. De zaadvaten van de linker zyde.
- C. De scheede, door de gemeene bekleetselen en *plexus cavernosus* bedekt.
- D. Het bovenste verharde gezwel, buiten de scheede hangende.

E.

(*) Men vindt deeze in myne Natuur- en Geneeskundige Bibliotheek II. D. 1 St. pag. 12.



- E. De aars.
- F. F. De algemeene bekleetselen.
- G. Een gedeelte van den endeldarm.

Derde Plaat.

Eerste afbeelding.


- A. De mond van de baarmoeder.
- B. Het verharde gezwel opgeligt.
- C. Het onderste verharde gezwel.
- D. De aars.
- E. De bilnaad.
- F. F. F. De uitwendige bekleetselen, en een gedeelte der teeldeelen.
- G. G. G. Rimpels, die zich vertoonen, om dat de scheede naar boven gedrukt is.

Tweede afbeelding.

Deeze vertoont den algemeenen hals en de byzondere te gelyk met de baarmoeders geopend.

- A. De gemeene hals.
 - a. De onderste lip van den mond der baarmoeder.
- B. De regter Baarmoeder.
 - b. De hals van deeze baarmoeder.
- C. De linker Baarmoeder.
 - b. De hals aan deeze eigen.





I X.

Waarneeming omtrent den steen. (Abhandl. der K. Schwedischen Akademie 1766. p. 171.)

In het jaar 1760. sneed ik een jongetje van elf jaaren in het Hospitaal van den steen. Dezelve was scherp, en liet, by het uithaalen, een klein stukje in de blaas te rug. Den vyftienden dag na de operatie was dit stukje zoo zeer in grootte toegenomen, schoon zeer veel gruis van de nieren en blaas uit de wonde liep, dat hy drie dragmaas woog, en eene evenredige grootte had. De nog niet gesloote hals van de blaas, en de verwyderde pisbuis lieten toe, dat de steen met de pis wechging, en tot aan de opening der wonde kwam, doch dewyl deeze reeds was begonnen te geneezen, en de insnyding in de huid zich van de einden naar het midden toegeslooten had, kon de steen niet verder komen. De geheele operatie zoude in korten tyd vrugteloos zyn geweest, zoo men deeze nieuwe steen niet had te voorschyn konnen doen komen. Het scheen my toe, dat, als het litteeken naar de blaas toe wederom geopend wierd, men met een lepeltje agter den steen zoude kunnen komen, en denzelven uit de pisbuis drukken. Doch, na dat het eerste gedaan was, en het tweede zoude verrigt wor-

den, rolde de steen wederom in de blaas. Nu was 'er niets anders overig, dan de wonde nog meêr te verwyderen, en de tang te gebruiken. Men leide den zieken dwars over het bed, bragt de sonde door de pisbuis in de blaas, verwyderde de voorige sneede genoegzaam, voelde met den vinger, dat de hals van de blaas genoeg open was, om de tang daar in te brengen, verzigte dit, en vondt aanstonds den steen, die vry gemakkelyk uitgenomen wierd. Men verbond den zieken, gelyk te vooren, zonder dat hy van dit laatste eenig ongemak had. Op het einde van de vyfde week was hy geneezen, en ging gezond uit het Hospitaal.

Deeze waarneeming bewyft, dat het mogelyk en noodzakelyk is, de uithaaling van den steen te herhaalen, het zy het vroeg of laat na de eerste operatie zy, wanneer overblyffelen of op nieuw gevormeerde steenen zulks vereischen.



REGISTER.

De letter a betekend de Aanmerkingen.

A.

Aderlating, gevolgd door eene valsche slagaderbreuk. 356. Ontsteeking van den arm daar na ontstaan. 398.

Afbinding der gezwollen in de scheede, en op de lippen, voor het afsnyden te verkiesen. 279.

Afzetting van den arm. 321. 324. 350.

———— van de hand. 328.

———— van den vinger. 330.

———— van het dey-been. 426. 434. 439. 448.

———— van het been onder de knie. 450. 453. 456.

Aluin. Uitslag der proeven met de gebrande aluin in de kanker. 34.

Anchylosis van verscheide gewrigten. 415.

B.

Baarmoeder. Beschryving van eene dubbele. 559.

Bal. Aanmerking by het wechneemen van denzelven. 264. 265.

Beenbederving in de onderste Kaak, na zwaare, kwalyk behandelde, tandpyn ontstaan. 117.

———— in de bovenste kaak. 120.

———— in den gehoorweg. 129.

———— der ribben by eene verzameling van etter in de borst. 176. 180.

———— eenige ongeneeslyke. 556.

———— aan het opper-armbeen door eene afschilfering geneezen. 332. 336.

———— van de onderste arm-beenderen, 338.

———— van een deezer beenderen. 340.

———— van het dey-been. 424.

Beenbederving in het gewrigt van de knie. 431.

———— van het scheen-been. 438.

———— van het scheen- en kuit-been. 441.

———— van het hiel-been. 460.

Been-breken. Valsche geleding na eene ongeslyke breuk van het opper-armbeen. 344.

———— van het opper-armbeen, uit eene venerifche oorzaak. 347.

———— van de beenderen der hand. 352.

———— van den middenften en ringvinger met de beenderen van den *metacarpus*. 354.

———— Eene gefpleete breuk van het dey-been. 467.

———— Eene fchuinsche van het deybeen. 470 472.

———— Samengeftelde breuk van beide de fcheen-beenderen. 473.

———— eene famengeftelde breuk van het fcheen-been met afwyking. 476.

Beenderen. Weekwording derzelven. 384. a.

Bekkeneel. Breuk van hetzelve met verlies van een gedeelte der herffenen. 1. Met eene neêrdrucking daar van. 6. 9.

———— houw met eene byl. 14. Slag met een' boots-haak. 22.

———— geweldige van een fcheiding der naaden. 17.

Belladonna. Uitslag der proeven van dit middel in de kanker. 33.

Bilnaad. Pypzweeren in denzelven. 241.

Blaas. Fungus, kaasagtig; gezwel in dezelve. 311.

———— toevallige openberfting van dezelve, door het zetten van een clyfteer veroorzaakt. 316. Ontleding van het lyk des lyders. 318.

Blindheid. Zeldzaame blindheid op eene anderen-daag-

- daagſche koorts gevolgt, en door een ſeton geneezen. 542. ſeq.
- Bloed - oog, van eene uitwendige oorzaak ontſtaan. 100. Na de operatie van den ſtaar verwekt. 103.
- Bloedſtorting, by het ſnyden van eene breuk ontſtaan. 220.
- veele dagen na het wechnemen van eenen bal waargenomen. 264.
- na de afzetting van het been. 429. 439. 450.
- in welke gevallen dezelve na de Operatie op eene ſlagaderbreuk kan ontſtaan. 359. ſeq.
- Boer. Beſchryving van eenen boer, met eenen voet ter waereld gekomen. 551.
- Borſt. Verzamelingen van etter in deſzelfs holligheid. 173.
- Borſten. Knoeſtgezwellen en Verhardingen derzelven. 162.
- Bougies.* Nut derzelven by pypzweeren in den bilnaad. 245. In eene vernauwing van de pibus. 255. a. 257. a. Bereiding. 246. 256. a. Sy ſynd door DARAN niet uitgevonden. 255. a.
- Breuk. Eene geklemde balzaks-breuk. 211. Ontdekking by het openen van het lyk des lyders. 213.
- Darm- en net-breuk in den balzak. 214. 217. met eene vaſtgroeijing der deelen. 226. 230.
- Darmbreuk in de liefch. 215.
- Darm- en waterbreuk in den balzak. 219. Ontleeding van deezen lyder. 221.
- Netbreuk in den balzak. 222.
- Geklemde darmbreuk in den balzak na veele dagen van zelve ingegaan. 225.

Breuk. Geklemde darmbreuk in den balzak, door het vuur opengebrooken, en zonder pyp-zweer geneezen. 233.

——. Aanmerkingen omtrent het geneezen der breuken. 238. *seq.*

Buiks - doorbooring. Dezelve is zelden van nut. 205. *seq.*

Buiks - waterzugt. Hetaftappen van het water brengt zelden meêr, dan verligting aan. 205. Waarneemingen na den dood. 206. *seq.*

C.

C*aruncula lacrymalis* met hair begroeid. 45.

Cryftallyn, in het lyk van een' man, by wien hetzelfde neêrgedrukt was, ontbonden gevonden. 77.

D.

DARAN. Nut van deszelfs *bougies* by pypzweeren in den bilnaad. 245.

—— Is geen uitvinder der *bougies*. 255. *a.* Maar heeft een byzondere compositie, die hy geheim houd. 256. *a.*

Darmen, zeer hard en nauw gevonden in iemand, die eene geklemde balzaks - breuk had gehad. 213

Dey - been. Afschilfering van hetzelfde. 260.

Druipert. Op denzelven volgen veeltids pypzweeren in den bilnaad. 242.

E.

E*ctropium*. Aanmerking omtrent de geneezing van dit ongemak. 60. *ib. a.*

Eiken-zwam. Aanmerkingen omtrent het gebruik daar van in bloedstortingen. 450. *a. seq.*

Ele-

Electriciteit, tegen een ongemak aan den vinger gebruikt. 390. fq.

Etter, door de *futura lambdoidea*, ontlast, na dat een *os triquetrum* was uitgevallen. 149.

—— Verzamelingen van etter in de holligheid van de borst. 173. Met eene pypzweer in de zyde. 173. 175. 179. 182. Met eene opening en beenbederving der ribben. 176. 180. Waar van de gelukkige of ongelukkige uitkomst afhangt. 183

—— Verzamelingen daar van zonder voorafgaande koorts. 190. Onder het regter schouderblad. *ib.* Onder het linker schouderblad. 193.

Etter-oog, na de operatie op den staar ontstaan. 82. 100. Na eene inwendige ontsteeking van het oog, en veeljarige huofdpyn. 98. Door eene uitwendige oorzaak ontstaan. 101.

F.

FERREIN. Aanmerking omtrent deszelfs manier, van den staar te opereeren. 83.

G.

Gehoor-weg. Pyp-zweer in denzelven met beenbederving. 129.

—— Wormen daar in ontdekt. 133.

Geleding. Eene valsche, na eene ongeneeslyke breuk van het opper-armbeen ontstaan. 344.

Gezwel. Verhard, vet, gezwel, het oog uit syne plaats verdryvende. 59.

—— in de scheede, buiten de teeldeelen hangende. 276. *seq.* door afbinding genceezen. 278.

—— uit den hals van de blaas genomen. 312.

—— zonderling aan de kaak. 503.

—— op het hoofd van een eerstgebooren kind
ge-

gezien, ontstaan door eenen val der moeder, na drie weken doodelyk. 526.

Gezwel. Aanmerking omtrent de verharde gezwellen. 166. a.

H.

Haazen-mond. Waarneeming van eenen dubbel. 24. 28. Aanmerking omtrent de geneeswyze. 25. en werktuigen, daar by gebruikt. 29.

Haazen-oog. Waarneemingen daar van. 46.

Hæmalops. Zie Bloed-oog.

Hairen van het oog. Omkeering derzelven. 39. Operatie daar tegen in het werk gesteld. 40. 41. 42. 44. 45.

— op de *caruncula lacrymalis* gegroeid. 45.

Hals. Pypzweer aan denzelven. 140.

— Wonden van dit deel. 151.

— Zakgezwellen aan denzelven. 155.

Herstellen. Verlies van een gedeelte derzelven by eene aanmerkelyke, doch geneeze, hoofdwonde. 3.

Houw met een byl in het hoofd. 14.

Huid (vleeschagtige) over het oog. 66. 69.

Hypopion. Zie Etter-oog.

J.

Jigt. Kwaade gevolgen van dezelve. 259. seq.

Intercostalis nervus. Aanmerking omtrent deszelfs takken, die na het oog gaan. 84.

K.

Kaak. Beenbederving van dezelve. 117. seq. 120. wind-doorn. 119.

Kanker in de lip. 31. Ongelukkige uitkomst der geneezing. 32. 35. Gelukkige geneezing. 38.

Kan.

- Kankeragtige verharding van den bal. 268.
- Klieren. Zwelling der klieren onder de kaak en aan den hals na het uitsnyden van de kanker aan de lippen. 32. 35. 36.
- Knie. Spongieuze zwelling en samengroeiing van dezelve. 480.
- Knoeftgezwollen der borsten. 162. *seq.* De uitpelling derzelven aangeraaden. 170. *a.*
- het is onzeker, of de kwaadaartige in den beginne goedaartig geweest zyn. 167. *a.*
- onder de linker oxel. 185. van eenen goeden aart 186. van eene kwaade natuur. 187.
- Knoeftgezwel, (verzwooren), in den twaalfvingerigen darm gevonden. 273.
- van de Oorklier. 126.
- Koorts. Anderendaagsche, door eene blindheid gevolgd. 544.
- Koorts-bast. Aanmerking omtrent deszelfs gebruik tegen de versterking. 461.
- Krop-ader. (Inwendige) by het openen van een gezwel gekwetst. 158.
- Krop-slag-ader, by het wechneemen van een knoestgezwel, gekwetst. 127.
- Kruid-korrels, in het oog gekomen. 85.
- Kwyl-buifen. Steenen in dezelve gevonden. 123.

L.

- L** *edum palustre*, tegen wormen in den gehoorweg gebruikt. 135.
- Lelletje in de Keel. Verlenging van hetzelfde, door het mes wechgenomen. 113.
- Lever. Verzweering in derzelver holle gedeelte. 208.
- Littekens na het branden van het aangezicht overgebleven. Geneezing van de wanstaltigheid, daar door

door veroorzaakt. 47. seq. Beste middelen, om die, welke na de pokjes overblyven, wech te neemen. 52.

Lugt. Schadelykheid van eene onzuivere. 325. 458. 476.

Lugttyp. Wonden van dezelve. 151.

M.

M*ercurius alcalisatus Edimburgensis*, met vrugt gebruikt. 192.

— *sublimatus corrosivus* in eene beenbederving van de kaak zonder vrugt gebruikt. 122.

N.

Naaden van het bekkeneel. Geweldige van een scheiding derzelven. 17.

Net, zeer verhard gevonden in het lyk van iemand, die eene geklemde balzaks - breuk had gehad. 213.

— onder in den balzak vast gegroeit, en met vrugt afgesneden. 215.

— een groot, uitgezakt, hard gedeelte van hetzelfde in den buik gebragt, en naderhand zagt geworden. 224.

— hard geworden, en naderhand versmolten in den balzak, na het opereeren van eene breuk. 227.

Neus. Vleeschgewas in denzelven. 106.

O.

Ontsteeking. Eene roosagtige en verettering aan den arm, na eene aderlating. 398. Zulks gebeurt dikwils na de beste aderlatingen. 400.

Oog. Omkeering van derzelver haren. 39. Operatie daar tegen in het werk gesteld. 40. 41. 42.

Oog.

- Oog. Utdryving van hetzelfde door een verhard, vet, gezwel. 59.
 — Kankeragtige ontaarting van hetzelfde. 63.
 Wechneeming daar van. 64.
 — Met eene vleeschagtige huid bedekt. 66.
 Oog-holte, door een' wind-doorn aangedaan. 71.
 Oogleden. Omkeering en verkorting derzelven. 46. 52.
 — Samengroeijing, gepaard met eene omkeering der hairen. 55. 56.
 Oorklier. Knoestagtige zwelling van dezelve. 126.
Ophthalmoxyses. Dezelve zyn van weinig nut. 67.

P.

- P**annus oculi. Waarneeming daar van. 66. 69.
 Pees van Achilles. Breuk van dezelve. 492.
 — Afschilfering van dezelve. 499.
 Peesen. Derzelver ongevoeligheid beweezen. 342. 353. 355. 366.
 Pees-knoopen. Verscheide aanmerkelyke aanmerkingen daar omtrent. 373. seq.
 — by tusschenpoozen wederkomende en verdwynende. 378. 380.
Phytolacca Americana. Uitslag der proeven met dit middel in de kanker. 34.
 Pisopstopping, door een fungus gezwel in de blaas ontstaan. 308.
 — voornaamste oorzaaken daar van. 311. a. 316. a. Ontleeding van het lyk des lyders. 310.
 — toevallige openbersting van de blaas, daar op gevolgd. 306. Ontleeding van het lyk. 318.
Polypus narium. 106. seq.
 POT. Deszelfs *Spiritus arthriticus* geroemd. 197.
Pterygium. Waarneeming daar van. 66. 69.

Pyp.

Pypzweer in de gehoorweg met eene beenbederving;
129.

— aan den hals met eene opening in den
gehoorweg. 137.

— samengestelde aan den hals. 140.

— tot in de borst doordringende. 173. 175.

— 179. 182. seq.

— in den bilnaad, waar door de pis ontlaf-
t wierd. 241. aanmerking omtrent de geneezing.

248. a.

— vereelde pypzweer in den hals van de
blaas met eene aflooping van de pis door dezelve.

244.

— in de bilnaad, uit eene venerifche oor-
zaak ontstaan. 249. 254. met verfterving. 251. 252.

— samengestelde in de liefch. 259.

— in den balzak. 288.

— aan de hand, by een' wind-doorn. 328.

— aan den boven-arm, met eene beenbeder-
ving. 336.

— aan den beneden-arm. 339. 341.

— in de lendenen. 415. de heup. 416. in het
gewrigt van de dey. 418. 419. aan de dey. 420.

K.

Ribben. Wechneeming derzelven in eene been-
bederving. 178.

Rosmarinus Sylvestris, tegen wormen in den gehoor-
weg gebruikt. 135.

Ruggegraat (gespleete). Proeven en Aanmerkingen
daar over. 529. 538. Twee waarneemingen daar
van. 533. Met dit ongemak kunnen de kinderen
somsyds veele jaaren leeven. 536. Middelen tegen
deezze ziekte. 540.

S.

S*arcoma polyposum.* 106.

Sacrificationes oculorum. Dezelfen zyn van weinig nut. 67.

Seton. Proeven omtrent het nut van dit middel tegen eene blindheid, die op eene anderendaagfche koorts volgde. 542.

Slagader, by eene valsche slagader-breuk, niet uitgezet, maar dwars afgebrooken. 358.

Slagader-breuk. Eene Valsche op den arm na eene aderlating, ontstaan, en opengeberften. 356. Ongelukkige uitkomst van dit geval. 358. Aanmerking daar over. 359.

Spieren, zonder kwaade gevolgen doorgesneden. 51.

Spons. Derzelver nut in eene bloedstorting, door eene kwetfing van de krop-slagader by het wechneemen van een knoestgezwel, ontstaan. 127. in eene bloedstorting, door het openen van de inwendige krop-ader. 158.

Staar. Melkagtige, vloeibaare. 74. neêrgêdrukt, en na den dood ontbonden gevonden. 76. weeke, en wateragtige. 78. aangeboore, witte, met trekkingen in de spieren van het oog. 80. Door kruid in het oog gesprongen, veroorzaakt. 85. weyagtige. 86. aangeboore, kaasagtige. 88. beenagtige. *ib. a.* aan een draad hangende. 95. Aanmerking omtrent 'de geneezing. 83. de gevallen, waat in zichdoorgaans zwaarer toevallen openbaaren. 96.

Steenen, in de kwylbuifen onder de tong gevonden. 123.

— in de blaas. Aanmerkelyk geval daar van. 290. *a.* 565. Operatie in een meisje, in 't werk gesteld. 292. in eenen jongen. 293. 295. in eenen

- jongenlig. 297. 299. toevallen na dezelve. 296.
 legging by de operatie noodig. 300. *a.* ongelukkige uitflag van eene gelukkig verrigte operatie.
 303. Onderzoek na den dood. *ib.* *seq.*
 Steenen in de pisbuis. 306. geneezing, daar toe noodig. 306. *sq.*
Strabismus oculorum. 78. 81. 91.
 Stuipen in verscheide lyders, na zwaare operatien waargenomen. 325. 327.
Suppiot. Aanmerkelyk geval van deeze vrouw, waar by alle de beenderen week geworden zyn. 384. *a.*
 Ontleeding. 385. *a.*

T.

- T**andpyn, kwalyk behandeld, en door beenbederving gevolgd. 117. *seq.*
Tophus, aan de hand ontstaan. 330.
 — op de dey waargenomen in eene vrouw, welker arm uit eene venerifche oorzaak gebrooken was. 348.
 Trepaan, op onderscheide plaatsfen van het hoofd gesteld. 3. 8. 11. 13.

U.

- U**itflag, over den arm, by eenen wind-doorn van de elleboog. 320.
 Uitwassen van den kaak, naar steenen in de kwylbuisfen gelykende. 125. Onderscheid daar van. *ib.*

V.

- V**al. Schadelyke uitwerking daar van, in eene zwangere vrouw, op het kind. 526.
 Verhardingen der borsten. 162.

Ver-

Verhemelte, by eenen haazen-mond, geheel en al gespleeten. 25. 27.

Verstopping. Dodelyke verstopping der darmen. 258.

Versterving. Zeldzaame geneigtheid daar toe. 461.

Verzweering in de borst, met pypzweeren en beenbederving. 173. 175. 176. 179. 180. 182. Waar van derzelver gelukkige of ongelukkige uitkomst afhangt. 183.

———— in het holle gedeelte van de lever. 208.

———— boven den *Musc. pron. quadr.* digt by den *carpus*. 368.

———— zonder voorafgaande ontfteeking. 551.

———— Aanmerking over Critische verzweeringen, na eene zwaare algemeen heerschende koorts, welke den dood veroorzaakt hebben, als men dezelve geopend heeft, doch door buikzuiverende middelen moesten verdreeven worden. 519.

Vet-gezwel aan den vinger, onder den nagel. 396.

———— Verscheide waarneemingen daarvan. 502. agter op de linker bil. 505. op de regter bil, en tusschen de deyen. 508. op de regter kaak. 513.

Vleesch-gezwel in den palm van de hand. 503.

Vleesch-breuk, met eene pypzweer verzeld. 263. kankeragtig geworden. 265. Ontleeding van het lyk van deezen laatste lyder. 272. seq.

———— in een vrouwerpersoon. 275.

Vleesch-gewas in den neus. 106. seq. Bedenking omtrent derzelver oorzaak. 110. Aanmerking aangående de onderscheide soorten. 111.

Vuur. Heeten koud Vuur. Nut van den Koortsbast daar tegen. 461. a.

Vyt. Byzondere soort daar van zonder ontfteeking. 383.

W.

WARNER. Deszelfs geneeswyze van eene waterbreuk. 286. a.

Waterbreuk. Aanmerking daar omtrent. 203.

———— Ongelukkig uitgevalle geneezing van dezelve, door de onachtzaamheid der lyders. 280. 282. gelukkige herstelling. 284.

———— Geneeswyze van den Hr. WARNER. 286. a.

Weer. Hetzelve, eens gevormoord zynde, gaat dikwils wederom los. 476.

Wind-doorn rondom de regter oog-holte. 71.

———— aan de kaak. 118.

———— in de buiging van den elleboog. 320.

———— kankeragtige aan het opperarmbeen. 323. Kwaade uitslag daar van 325.

———— aan de voorhand. 327.

———— op den ring-vinger van de linkerhand. 329.

Winterhanden worden dikwils door beenbederving gevolgd. 460.

Wonden van den hals en lugt-pyp. 151.

Wormen in den gehoorweg ontdekt. 133.

———— met de pis geloosd. 314.

———— in eene verzwearing aan het been gezien. 449.

Z.

Zakgezwollen aan den hals. 155. Oorzaaken daar van. *ib.* geneezing. 157.

———— versmolten. 196. Aanmerking omtrent voortgelyke gezwollen. 203.

———— aan de voorhand. 361.

Zwel-

- Zwelling. Knoefstagtige van de oorklier. 126.
 ——— Roosagtige, langduurige aan handen en
 voeten. 402.
 ——— Verharde aan de handen. 407. aan de
 voeten. 411.
 ——— Spongieuze zwelling en samengroeijing
 van de knie. 480. 483. 485. Met eene kankerag-
 tige bederving. 487.
 Zweeren aan de beenen met beenbederving. Hoe
 dezelve te behandelen. 441. seq.
-

VERBETERINGEN.

Pag. 142. reg. 11. staat opening, lees, geneezing, P. 164. r. 4.
 los was, l. was los. P. 180. r. 29. afgedante, l. afgedankte,
 P. 273. r. 4. rok, l. zak. P. 297. r. 12. pisbuis, l. pis. P. 336.
 r. 19. waren l. was. P. 364. r. 2. zenuwen, l. peesfen. P. 370.
 r. 19. del. tus-. P. 462. r. 3. del. op. P. 477. r. 18. huid
 l. hand. P. 496. r. 3. van onderen hy, l. fy.



NOTES

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
AND ARE NOT TO BE LOANED OR
REPRODUCED IN ANY MANNER
WITHOUT THE PERMISSION OF THE
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

VERBETTERING

THESE NOTES ARE THE PROPERTY OF THE
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
AND ARE NOT TO BE LOANED OR
REPRODUCED IN ANY MANNER
WITHOUT THE PERMISSION OF THE
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO












Fig. 1.




Fig. 2.

